





BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadillo



Palchetto

Num.° d'ordine

16

5-B-22

NAZIONALE

B. Prov.

I

769

NAPOLI


VITT. EM. III

R. BIBLIOTECA

B. P.

I

769





# CORSO

DI

GEOMETRIA ELEMENTARE

DIVISO IN DUE VOLUMI

VOL. II.

Che contiene i Libri undecimo , e duodecimo degli  
Elementi di EUCLIDE ; ed una nuova esposizione  
de primo Libro di ARCHIMEDE sulla Sfera , e  
sul Cilindro , e dell'altro della Misura del Cerchio :  
con note in fine .



606936  
532

# L' UNDECIMO E DUODECIMO LIBRO

DEGLI ELEMENTI

DI

# EUCLIDE

EMENDATI IN QUE' LUOGHI NE' QUALI UNA VOLTA FU-  
RONO VIZIATI DA TEONE, O DA ALTRI, E RESTITUITE-  
VI ALCUNE DEFINIZIONI, E DIMOSTRAZIONI DELLO  
STESSO EUCLIDE.

DA V. FLAUTI

TERZA EDIZIONE

---

*Optime illi mihi de Geometria meriti esse videntur,  
qui in antiquis auctoribus emendandis, illustrandis-  
que operam posuerunt.*

TOR. Praef. in ARCH.

---

N A P O L I



NELLA STAMPERIA DE' FRATELLI CHIANESE

1813.





## PREFAZIONE

---

**G**LI Elementi di Euclide così detti vengon compresi ordinariamente in XV. libri, de' quali i primi due, come finora si è veduto nel primo volume di questo Corso, han per oggetto la natura e le proprietà de' triangoli e de' parallelogrammi, colle verità che a queste sono correlative, ed i problemi, che ne dipendono: il III<sup>o</sup> si occupa del cerchio; e nel IV<sup>o</sup> si tratta di alcune figure regolari iscrivibili e circoscrivibili ad esso co' metodi della Geometria Elementare. Nel V<sup>o</sup> si esamina la grandezza in generale paragonata ad un'altra; e questo libro, che per incidenza trovasi compreso tra quelli di Geometria Elementare, non appartenendo ad essa esclusivamente, è un' immensa miniera di ripieghi geometrici, onde risolvere infiniti ardui Problemi, e per dimostrar molte verità complicate, che invano si tenterebbero altrimenti. Esso forma in somma la base de' metodi di risoluzione impiegati dagli antichi nello scioglimento de' Problemi, e nella dimostrazione de' Teoremi. Finalmente nel VI<sup>o</sup> libro si trovano applicate le teorie generali esposte nel V<sup>o</sup> a' rapporti speciali, che serbansi tra loro le diverse figure piane rettili-

nee; donde infiniti Problemi riguardanti tali figure possonsi anche facilmente risolvere.

Esaurita in tal modo questa parte di Geometria, che riguardava le figure piane, par ragionevole ch' Euclide avesse dovuto passare ad occuparsi delle stesse ricerche pe' solidi. Intanto queste altre teorie da tutti gli antichi, ed i moderni espositori degli Elementi vengon comprese nell' XI<sup>o</sup>, XII<sup>o</sup>, e XIII<sup>o</sup> libro, e tra quelli e questi vi si trovan frapposti quattro altri libri, de' quali i primi tre, cioè il VII<sup>o</sup>, VIII<sup>o</sup>, e IX<sup>o</sup> trattano di alcune teorie generali ed astratte concernenti la quantità discreta, cioè i numeri. E questi libri che oggi giorno, dopo l' invenzione della volgare Aritmetica, e della speciosa sono poco letti, contengono una profonda dottrina, e delle verità grandi per coloro che si occupano delle ricerche aritmetiche. Si trovano in fatti dimostrate in essi molte verità, e risolti alcuni Problemi in una maniera preferibile a quella che taluni valentissimi Analisti hanno tenuta nelle loro opere, avvalendosi delle immense risorse, che offre per tal argomento l' Analisi moderna. Nel X<sup>o</sup> libro poi si ragiona estesamente delle quantità incommensurabili, ed irrazionali, e con tale profondità, che senza dubbio alcuno può dirsi, che forse con tutti i moderni metodi sarebbe difficile a chiunque il poter con pari precisione, chiarezza e brevità fare altrettanto. Ma eccone

di questi libri un'indicazione un poco più estesa.

Il VII° libro ha 41 proposizioni, delle quali 35 Teoremi, e 6 Problemi. Que' Teoremi espongono la natura de' numeri *primi*, e molte proprietà riguardanti il rapporto de' numeri, analoghe a quelle, che per la grandezza in generale si erano dimostrate nel lib. V°; e nella Prop. 16 vi si dimostra con maggior precisione che non ha fatto qualche moderno Analista, *che non si altera il prodotto di due numeri, se l' un di essi si moltiplichi per l' altro, o pur questo per quello.* I problemi poi di questo libro hanno per oggetto il *rinvenire la massima comune misura di due o più numeri dati non primi tra loro*; la qual ricerca è condotta in un modo analogo a quello di cui ci serviamo nella nostra volgare Aritmetica, e nella speciosa; o pur *la minima comune misura*; il *determinare tra tutti i numeri che hanno un dato rapporto quelli che sono primi tra loro*; e finalmente il *ritrovare un numero minimo che abbia parti date.*

L' VIII° libro contiene 15 Teoremi, e 2 Problemi. Ne' Teoremi Euclide comprende le ricerche su i numeri primi, espone alcune altre singolari proprietà sulla proporzione de' numeri, e quelle de' numeri *piani e solidi*, e de' numeri *quadrati e cubi*, le definizioni de' quali erano state da lui premesse al libro VII°; e tra essa merita principalmente d' es-

ser notato. il 5° , ove si dimostra , che i *numeri piani hanno tra loro una ragione composta dalle ragioni de' lati* ; donde il Simson e noi abbiamo ricavato un sicuro argomento per conchiudere, che non è di Euclide l'ordinaria definizione della ragion composta che trovasi al principio del lib. VI° ( *Veg. la nota alla def. A del lib. V° nel vol. 1* ). Ne' due Problemi poi si propone egli a *rinvenire de' numeri minimi continuamente proporzionali , la ragion de' quali sia data* ; e *de' numeri minimi in continua proporzione , che serbinsi qualunque ragioni date tra numeri anche minimi* .

Continua nel libro IX° , che ha 36 Proposizioni , cioè 34 Teoremi , e 2 Problemi , ne' primi ad esporre la natura de' numeri quadrati , e cubi , ed alcune altre proprietà della proporzion de' numeri , e de' numeri primi . Tra questi è degno di massima avvertenza l'ultimo in cui dimostra , che *se dall' unità in poi si prendano de' numeri continuamente proporzionali in ragion doppia, finchè quel numero che risulta dalla somma di tutti questi termini sia primo; una tal somma moltiplicata nell'ultimo di que' numeri proporzionali darà per prodotto un numero perfetto* , cioè uguale a tutte le sue parti prese insieme (1) ; la qual ricerca, che fa molto onore al geometra antico che ne fu

---

(1) *def. 22. VII.*



l'inventore , trattata anche co'nostri mezzi attuali, dice bene il Sig. Montucla , esige un artificio particolare (2). L' oggetto poi de' due Problemi di questo libro si è il *determinare se possa rinvenirsi dopo due numeri dati il terzo proporzionale , o il quarto dopo tre .*

Finalmente il libro X<sup>o</sup> tiene 117 Proposizioni, e 93 di esse sono Teoremi , ne' quali si espongono le caratteristiche delle quantità *incommensurabili* , e delle *commensurabili* (3); ove tra le altre cose si dimostra , che il rapporto di queste sia esprimibile in numeri , e non così quello delle prime ; e lo stesso pe' quadrati , e cubi , che da tali quantità si formano : donde se ne deduce la bella verità , che *le linee rette commensurabili in lunghezza, lo sono anche in potenza* , cioè ne' quadrati e ne' cubi ; ma che al contrario *quelle linee rette, che sono commensurabili in potenza , non lo sono sempre in lunghezza*: di più che *le linee rette incommensurabili in lunghezza ; non lo sono sempre in potenza ; che*

---

(2) Il Sig. Montucla nel parlar di una tal ricerca la dà come esposta in un Problema : essa però non vien recata da Euclide che in forma di Teorema .

(3) Il concetto di tali graddezze vien da Euclide chiaramente stabilito nelle deff. 1,2 del libro X<sup>o</sup>, e nelle seguenti sono caratterizzate le differenti specie , ed i diversi ordini d' incommensurabili , e le quantità così dette *razionali* , ed *irrazionali* . L'esistenza di queste grandezze in Geometria , che vien da Euclide comprovata nel presente libro , come si dirà nel decorso di questa Prefazione , rende nullo ogni concetto aritmetico per istabilire l' uguaglianza delle ragioni ,

*quelle poi che sono incommensurabili in potenza debbono esserle anche in lunghezza* (4). In seguito passa a trattare delle quantità irrazionali(5), e dalla teoria che su queste stabilisce ne deriva nuove verità per le quantità incommensurabili. In somma son tante le cose ch' Euclide dimostra in questo libro, che sarebbe lo stesso che ecceder di molto i limiti di una semplice indicazione, il volerle qui minutamente notare; che perciò ci restringeremo a far osservare solamente, ch' egli chiude un tal suo libro col dimostrare, che *la diagonale, ed il lato del quadrato sono incommensurabili tra loro*, e ciò vien eseguito con un artificio veramente maraviglioso. Egli fa vedere, che per poter un tal rapporto venir espresso da quello di un numero ad un altro, bisognerebbe che un numero fosse nel tempo stesso pare ed impare; il che è impossibile. Ed a questo proposito con molto giudizio così ragiona il Sig. Montucla; » Io non so » se la dimostrazione diretta, poichè ve ne » ha una, sia tanto convincente quanto il ri- » piego preso da Euclide; e per questa ragione » mi sembra che quelli i quali nelle loro edizio- » ni di Euclide hanno così cambiata una tal dimo- » strazione hanno avuto torto. Che che ne sia, ho » vedute molte persone, anche istruite in Geome- » tria non dar per dimostrazione di quest'incom-

---

(4) Cor. Prop. 9. X. (5) Teor. 17 e segg.

» misurabilità, che l'impossibilità di estrarre la  
» radice quadrata dal 2 per mezzo dell' appros-  
» simazione in decimali . Ma chi è colui che ha  
» ancora provato che quest' approssimazione sia  
» interminabile ? Ed io ho conosciuto un uomo  
» che faceva l' Architetto ostinarsi a continuar-  
» la , sperando sempre di giugnere ad un ri-  
» sultato esatto . Egli era giunto già alla 100<sup>ma</sup>  
» cifra decimale . Quanti stenti si avrebbe ri-  
» sparmiatì se avesse letto e capito Euclide (6) !  
Inoltre una tal dimostrazione è seguita da una  
continuazione , che in taluni codici antichi si  
trova anche esposta come Scolio , ove Eu-  
clide offre altri esempj di quantità incom-  
mensurabili presi tra le figure piane e solide ;  
ma di ciò avremo occasione di parlarne più ap-  
presso . Intanto per non tralasciar di dire qualche  
piccola cosa de' Problemi che risolvonsi in  
questo libro X<sup>o</sup>, farem notare solamente , che tra  
gli altri si cerca la massima comune misura di  
due , di tre , o più quantità commensurabili :  
certe linee incommensurabili in lunghezza ed  
in potenza , con certe condizioni date : le quan-  
tità così dette *medie* commensurabili in potenza  
solamente , le quali contengono un razionale , o  
un medio ec.

Prima di lasciar quest' argomento proporrò per  
digressione una mia non inutile congettura . L'

---

(6) *Histoire des Mathématiques Part. 1. lib. IV. num. II.*

anello di connessione tra l' Aritmetica , e l' Algebra sono state , come tutti sanno , le quistioni indeterminate proposte su i numeri; ed i libri VII<sup>o</sup>, VIII<sup>o</sup>, e IX<sup>o</sup> degli Elementi ci mostrano ad evidenza , che fin da' primi tempi della Geometria molto si era fatto intorno ad esse . Or s'è così, e se noi troviamo in Euclide usate le lettere alfabetiche per dinotare sì le quantità note , che le incognite de' Problemi Aritmetici su numeri indeterminati ; perchè non potrem giustamente dire, che l'introduzione de' simboli nella nostra Aritmetica speciosa abbia avuto un tipo in questi libri Euclidei , ne' quali si trova evidentemente praticata (7)? E s'è così , nè il Francese Vieta, nè alcuno de' nostri Italiani può dirsi a rigore l'autore di quest' importantissima scoperta ; e tutto al più potrà loro attribuirsi il merito di aver stabilita la regola, e fissato il costume di usarne . Ma non è questo il luogo da insistere sulla ragionevolezza di ciò che da noi si è asserito , e di cui ci riserbiamo a parlarne con più estensione nell' Introduzione al primo volume del nostro Corso di Analisi .

Qual sia l'oggetto dell' XI<sup>o</sup> , e del XII<sup>o</sup> libro , si è già detto di sopra : la teoria de' soli-

---

(7) Questa nostra congettura si trova anche indicata nel principio del Vol. 1. dell' Opera elaboratissima del P. Cossali che ha per titolo *Origine , e trasporto dell'Algebra in Italia* . Ma essa vi è piuttosto contraddetta , che sostenuta , come convenivasi .

di si trova in essi saldamente stabilita, ed in modo da non lasciar nulla a desiderare per l'ordine ammirabile con cui è scritta, ch'è certamente pari a quello de' primi sei libri. Intanto non bisogna negare, che in essi non si riconosce quell'istessa precisione nel definire, e rigore nel dimostrare, che il Geometra Græco aveva in questi posto. Ne tal colpa deve a lui attribuirsi; avendo noi già veduto nelle Note al vol. I. quanto avevan maltrattati i primi sei libri gli antichi espositori: e mostreremo inoltre nelle Note a questi due ultimi libri, che debbano a costoro anche attribuirsi queste altre imperfezioni. Le principali di esse consistono nella 9<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup> ed 11<sup>a</sup> definizione del lib. XI<sup>o</sup>, cioè in quella dell'angolo solido, e de' solidi simili, e degli uguali e simili; perchè la prima dovevasi render più chiara, e meno soggetta ad equivoco, e le altre due avevan bisogno di venir confermate prima di essere applicate; come da noi si è fatto (*Vegg. le Note corrispondenti a queste deff.*). Ciò facendosi la teoria de' solidi uguali e simili, anzichè trovarsi fondata su di un principio ruinoso ed atto ad indurre in errore, come sottilmente ha preteso il Simson (8) l'è solidamente stabilita, e con tutto il rigor che si esige in un libro elementare di Geome-

---

(8) Si riscontri la Pref. al suo Euclide latine.

de distinti da quelli di Piana per mezzo del VII<sup>o</sup> , VIII<sup>o</sup> , IX<sup>o</sup> , e X<sup>o</sup> de' quali si è parlato , deve far necessariamente pensare ad ognuno , che tali libri sieno preliminari necessarj alla scienza de' solidi ; ed in fatti questa opinione hanno avuta molti sommi Geometri , tra i quali recheremo quí solamente quelle del Clavio e del Gregory . Il primo di questi nell' introduzione da lui premessa al libro VII<sup>o</sup> , si esprime così: *Hactenus egit Euclides de priori Geometriae parte , ea scilicet quae circa plana versatur ; restabat altera solidorum . Verum ante ei necesse fuit de lineis commensurabilibus , et incommensurabilibus dissere , quod ad proprietates corporum plurimorum , eorumque maxime quae regularia nominantur demonstrandas , atque ut oportet explicandas , harum cognitio linearum requiratur , idque adeo , ut absque eis solidorum tractatio imperfecta sit , neque suis numeris absoluta . Huc accedit , quod absque eisdem lineis , plurima latera tam planorum , quam solidorum , si Geometriae theoria in opus conferatur , atque usum , neque exprimi queant , neque intelligi . . . . .*

*Et quia earundem linearum explicatio ac intelligentia cum numeris est implicata , et conjuncta , ut absque his nullo modo cognoscantur , oportuit eorum numerorum explanationem , ut doctrinae suus ordo , ra-*

*tioque costaret, lineis anteponi. Nel cominciare poi il libro X<sup>o</sup> lo stesso Clavio dice: Absolvit Euclides in antecedentibus tribus libris ea quae ad numeros spectant, quantum satis visum est ad res Geometrieas intelligendas; nunc in hoc X<sup>o</sup> libro aggreditur ad linearum commensurabilium et incommensurabilium disputationem, quarum causa numerorum tractationem ab eo susceptam esse superius diximus. Nam sine cognitione harum linearum, complures magnitudines cum solidae, tum planae, neque perfecte intelligi possunt, neque, cum res tulerit in opus atque usum conferri, propterea quod latera earum incommensurabilia sunt: id quod et de planis ipsis atque solidis dici potest, quippe cum et haec incommensurabilia saepe numero existant; ut ad finem hujus libri demonstrabimus. Ed il Gregory nella Prefazione al suo bellissimo Euclide greco-latino stampato in Oxford l'anno 1703, ch'è uno de' più gran monumenti che l'Inghilterra ha innalzati alle scienze, ragiona su di ciò nel seguente modo: Proprie tamen Geometria haec dividitur in επιπεδων θεωριαν (superficierum contemplationem), et στερεομετριαν (solidorum). Sed στερεομετρια intelligi nequit sine notitia linearum συμμετρων, et συμμετρων: nec hanc scire possumus, nisi notitiam habeamus numerorum. Questi due sommi Geometri, e con essi molti altri, voglion dunque darci chiaramente*

nibus , nimirum superficies incommensurabiles inter se se . Si enim ipsarum  $A$  ,  $B$  , mediam proportionalem sumamus rectam lineam  $C$  ; erit ut  $A$  ad  $B$  , ita figura quae fit ex  $A$  ad eam quae ex  $C$  similem et similiter descriptam , sive quadratam , sive alia rectilinea similia , sive circuli qui circa diametros  $A$  ,  $C$  describantur ; quandoquidem circuli inter se sunt ut diametrorum quadrata . Inventa igitur sunt spatia plana inter se incommensurabilia . Ostensis autem his , ostendemus etiam ex solidorum contemplatione ipsa solida esse commensurabilia et incommensurabilia inter se . Nam si in quadratis ex  $A$  ,  $B$  , vel in rectilineis quae ipsis aequalia sint solida aequae alta constituamus , sive parallelepipedam , sive pyramides , sive prismata , erunt ea inter se uti bases ; et si quidem bases commensurabiles sint , erunt solida commensurabilia , si vero incommensurabiles , et ipsa incommensurabilia erunt . Sed et duobus circulis existentibus  $A$  ,  $B$  , si in ipsis conos aequae altos , sive cylindros constituamus , erunt inter se uti ipsorum bases , hoc est ut  $A$  ,  $B$  circuli , et si quidem circuli commensurabiles sint , commensurabiles erunt et coni inter se se , et cylindri ; si vero incommensurabiles , et coni , et cylindri incommensurabiles erunt . Ex quibus perspicuum est , non solum in lineis et superficiebus esse commensurabilitatem , et incommensurabilitatem .



*bilitatem, sed et in solidis figuris*. Or chi non vede chiaramente da tutto ciò, che il lib. X<sup>o</sup> non possa stare innanzi all' XI<sup>o</sup> e XII<sup>o</sup>; mentre nel citato luogo di esso vi si accenna pressochè l'intera teoria del rapporto delle figure solide: Il Gregory avendo sostenuto nella Prefazione del suo Euclide, come abbiamo fatto di sopra vedere, che questi libri eran posti nel loro luogo, ha dovuto poi necessariamente ricorrere al ripiego di dire, che le cose quassù rapportate nello Scolio, *o non sono di Euclide, o almeno non debbono stare in questo luogo, poichè dipendono dalle cose seguenti* (9). Ma senza derogare al rispetto che si deve ad un Geometra del suo merito, egli si è fortemente ingannato. E primieramente non v'ha ragione da dubitare che queste cose sieno di Euclide, quando si ammette che sia sua la Proposizione colla quale sono strettamente connesse: e poi è ben conseguente e ragionevole, ch' Euclide dopo di aver sì a lungo ragionato delle quantità commensurabili, ed incommensurabili, volesse provare con più esempj geometrici l'esistenza di queste tali grandezze, non solamente tra le figure piane, ma anche tra le solide. Il dir poi che quello Scolio non sia nel suo luogo, è manifestamente un assurdo; poichè se ciò fosse vero, qual al-

---

(9) Si riscontri la notarella da lui inserita a piè della pagina 326 del suo Euclide.

tro luogo potrebbe competerli negli Elementi? Il Gregory dunque si è fatto indurre in equivoco dall'impegno in cui era entrato di sostenere ciò ch' egli aveva asserito nella Prefazione. E quello che si è detto, resterà vieppiù comprovato, allorchè noi in seguito convalideremo con altri argomenti, che non mai Euclide potè interrompere gli Elementi Piani da quelli di Solida coll' intermezzo de' quattro libri de' quali si sta parlando.

Per mostrare la ragionevolezza di questa nostra opinione, basterà ricorrere all' uso che potevano avere questi libri in Geometria. Or è chiaro che gli antichi non dovevano studiar con tanto impegno le cose geometriche per un puro lusso letterario; ma sì bene per l' utilità ch' esse recano agli usi civili, per servirsene cioè in pratica, e ciò vien anche comprovato dall' origine che i più antichi Storici danno a questa scienza (10), e dalla sua stessa denomi-

---

(10) Quantunque da tempi antichissimi si sien fatte delle costruzioni meccaniche sì ben ordinate, che mostrano chiaramente esservi stato il concorso de' lumi geometrici; pur tuttavia bisogna credere, che una tal' epoca ha dovuto precedere di molto quell' altra nella quale questi principj cominciarono ad esser ridotti in regole scientifiche, e che merita di esser chiamata giustamente l' epoca dell' origine della Geometria. L' opinione più ricevuta e più ragionevole si è quella, che molti scrittori antichi, e tra gli altri *Erodoto* ci hanno tramandata, cioè che la Geometria scientifica sia nata in Egitto nel tempo in cui il re *Sesostris*, per consiglio del suo Ministro *Thot*, ordinò che questo regno fosse diviso da moltissimi canali, la quell'ope-

nazione (11). Questi libri adunque dovevano essere senza verun dubbio destinati a ridurre in pratica le teorie geometriche della Piana e della Solida, e ciò vien chiaramente dimostrato dalle teorie che vi si espongono. E se tanto caso si vede in essi fatto della teoria degl'incommensurabili, ciò deve da una parte attribuirsi alla mancanza che avevan gli antichi de' metodi di approssimazione, per cui, prima d'intraprendere un'operazione pratica, dovevano assicurarsi della qualità delle grandezze su cui operavano, e dall'altra al sommo rigore ed esattezza ch'essi mettevano in tutte le loro cose. Che fosse questo l'uso di tali libri lo dice anche il Clavio ne' due luoghi citati.

Or posto ciò, perchè mai un trattato che serviva a ridurre in pratica le teorie di Piana, e di Solida doveva seguire gli Elementi di Piana, e preceder quelli di Solida? Esso avrebbe dovuto certamente seguire, o precedere gli uni e gli altri. Vi è di più, che siccome nel VII<sup>o</sup> libro si ragiona de' numeri *quadrati*, e *cubi*; e

---

razione esigendo de' principj geometrici per esser ben eseguita, e per essere in seguito conservata, quel Ministro gettò a questo proposito le fondamenta di una tale scienza. Ecco dunque che la Geometria è figlia del bisogno, e che fin dalla sua infanzia fu la guida dell'uomo nelle pratiche utili sul terreno.

(11) La voce *Geometria* è tradotta dal Greco γεωμετρία che componesi dalle due parole γη (terra) e μετρεω (misurare). Essa dunque altro non significa, che *misura della terra*.

de' primi se ne ha già un' idea di corrispondenza geometrica , l' istessa conveniva formarsene de' secondi . El in qual maniera poteva ciò effettuarsi facendo precedere questi libri agli Elementi di Solida ? E lo stesso dicasi pe' numeri *piani e solidi* .

Da quanto si è detto par che se ne potrebbe conchiudere, che il VII<sup>o</sup>, VIII<sup>o</sup>, IX<sup>o</sup>, e X<sup>o</sup> libro, anzichè precedere l' XI<sup>o</sup>, XII<sup>o</sup>, e XIII<sup>o</sup>, dovrebbero star dopo questi ; ma noi opiniamo , e non senza ragione fortissima , che tali quattro libri non furono da Euclide compresi in un' Opera sola cogli Elementi Geometrici ; e che formarono un trattato diverso , il qual s' insegnava a' giovani separatamente , e contemporaneamente agli Elementi di Geometria , appunto come noi costumiamo oggigiorno di accoppiare allo studio di questa scienza quello dell' Aritmetica , e dell' Algebra . Questa nostra opinione è fondata sul seguente ragionamento .

Ciò che deve caratterizzare una buona istituzione elementare di Geometria si è certamente il non trovarci alcuna interruzione nella catena delle verità necessarie , che vi si contengono ; senza che però alcuna ve ne sia superflua, o pur due volte esposta ; e non v'ha certamente alcuno il quale conosca questa specie di lavori geometrici , che di ciò non convenga . Or se non v' ha dubbio , ch' Euclide abbia conseguita la perfezione ne' suoi Elementi , come

tutt' i Geometri sì antichi, che moderni ne convengono (12), bisogna dire, ch'egli abbia rigorosamente osservato un tal precetto nell' ordinarli. E bene vi si sarebbe del tutto contravenuto da esso, quando si volesse supporre, che il VII<sup>o</sup> li-

(12) Pappo Alessandrino Geometra del quarto Secolo, che può giustamente averci come il raccoglitore non solamente di molte cose degli antichi Matematici, ma anche delle loro opinioni, parlando di Euclide, nella Prefazione al VII<sup>o</sup> libro delle sue Collezioni Matematiche, si esprime nel seguente modo: *adeo excellentem in mathematicis habitum est assecutus, neque usquam deceptus est.* E l' antico Filosofo Proclo, nel suo immenso comentario che intraprese su di Euclide, e che non ostante al di là del libro 1., esclama: *quis non Euclidis Elementa admiretur, in quibus superiorum Elementa omni genere laudis longissimo superavit.*

Le opinioni de' moderni in favor degli Elementi di Euclide sono poi tante quante i sommi Geometri; e noi non crediamo fuor di proposito di far qui notare le principali. Incominciando da pietro Ramo, diremo ch' egli ebbene sia stato uno de' più gran critici degli antichi, e di Euclide principalmente, de' cui Elementi si permise il primo di mutarne l' ordine infruttuosamente; pure non poté fare a meno di confessare che: *Nullus paralogismus, nulla pseudographia in totis Elementis Euclidis nobis, quamquam severe inquirantibus animadverti potuit* (Schol. Math. lib. 4. pag. 23.). Il Cardano nella sua Opera *de subtilitate* al lib. 13. dice così, *Euclidis sunt duæ præcipue laudes: inconcussa dogmatum firmitas libri Elementorum, perfectioque adeo absoluta, ut nullum opus huic jure comparare audeas. Quibus fit ut adeo lux veritatis in eo refulgeat, ut ei soli in arduis quæstionibus videantur verum a falso dignoscere, qui Euclidem habeant familiarem.* Ed il Gregory nella Prefazione al suo Euclide, oltre a tante altre cose ch' egli dice in favor degli Elementi di questo Geometra, ripete un tal passaggio del Cardano.

Il Wolfio inerendo al sentimento del Leibnitz, dopo aver molto lodati gli Elementi di Euclide, soggiugne: *Opus hoc inter*

bro e gli altri sino all' XI° facessero parte degli Elementi di Euclide; imperocchè in quel libro si trovano dimostrate pe' numeri le stesse verità da Euclide fatte rilevare per le grandezze in generale, e quindi anche pe' numeri nel libro V°

*ea eminet, quæ ex antiquitate ad nos pervenerunt, ita ut providentiæ divinæ attribuendum sit, quod injuria temporum non interierit.* ( De præcipuis scrip. math. Cap. 3. §. 2. )

La Scuola Inglese ha sempre pensato favorevolmente di Euclide, che perciò, dice bene il Sig. Montucla » essi veggono » schiudere meno di quelle opere elementari, che non facilitano la scienza se non snervandola, Euclide è quasi il solo » Autore elementare ch'essi conoscano, e non vi mancano per » ciò Geometri ». Oltre del Gregory che abbiamo già citato, il Barrow, il Keill, e Roberto Simson hanno prodotti con molta esattezza gli Elementi di Euclide. Ed è qui il luogo di ricordare che il Newton, che a giustissimo titolo merita di stare alla testa di questa illustre famiglia di Geometri moderni, soleva dolersi, *quod perlecto non dum Euclide ea diligentia quæ in tanto auctore adhibere debuerat, ad Cartesium, aliosque, propea quadam cura descendisset.*

Il rispetto che ha avuto per gli Elementi di Euclide l' Italia lo mostra evidentemente la folla de' Comentatori, editori, e traduttori ch'essa ha avuti, tra i quali meritano maggior distinzione il Commandini che tradusse gli Elementi dal Greco in Latino, e gli corredò di Scolj brevi e giudiziosi, il Viviani ed il Borelli.

Finalmente anche in Francia, ove da Pietro Ramo in poi si è sempre avuto il sistema di travestire Euclide, ha però questo Geometra incontrati presso i migliori Matematici di tal nazione di coloro che gli hanno resa giustizia; leggasi a tal proposito ciò che dice il Montucla all' Articolo di Euclide nella sua dotta Storia delle Matematiche Part. 1. Lib. IV: ed anche il Bossut nel suo Saggio sulla Storia delle Matematiche non ha potuto fare a meno di dire » Mai libro di Scienza ha avuto » un successo paragonabile, a quello degli Elementi di Eucli-

In fatti qual necessità v' era di dimostrare, che *se un numero sta ad un altro, come una parte del primo ad una parte del secondo, stia pure il rimanente del primo al rimanente del secondo, come quel numero a questo*, se ciò contenevasi nella Prop. 5. del libro V<sup>o</sup>; che *se quattro numeri sono proporzionali, permutando sono anche proporzionali*, la qual verità vien dimostrata generalmente nella 16 del libro citato. In una parola le Proposizioni 11, 12, 13, 14, e 22 del libro VII<sup>o</sup> non sono che ripetizioni particolarizzate delle altre 19, 12, 16, 22, 23 del libro V<sup>o</sup>.

Si potrebbe anche provare facilmente, che negli altri libri, e principalmente nel X<sup>o</sup> ci sieno delle altre verità, che affatto non avrebbero dovuto dimostrarsi in questo libro, se esso avesse formata una continuazione di teorie col libro VI<sup>o</sup>

Ma concediamo anche che convenga dimo-

---

» de . Essi sono stati insegnati esclusivamente per più secoli in  
 » tutte le Scuole di Matematica, tradotti e comentati in tutte  
 » le lingue, prova certa della loro eccellenza » E l'insigne Sig.  
 la Grange, ed il Delambre in un loro rapporto alla Classe di  
 Matematica dell' Istituto di Francia sulla versione dell' Eucli-  
 de fatta da Peyrard si esprimon così » Poche opere sono sta-  
 » così spesso comentate e prodotte, come gli Elementi di Eu-  
 » clide; ma non v' è autore col quale i suoi traduttori si ab-  
 » biano prese delle sì strane libertà » e poco dopo soggiungono;  
 » ma malgrado tutte le loro cure, e le loro pretensioni, es-  
 » si non hanno fatto obbliare il vero Euclide ». Dopo tutte  
 queste testimonianze di uomini sommi, alle quali se ne potreb-  
 bero aggiungere moltissime altre, sarebbe strano il trovar  
 Euclide inconsequente !

strar nuovamente i casi particolari di una teoria generalmente esposta, quando specialmente si tratta di essa: e bene Euclide il quale ha posto tanto sistema, ed uniformità nelle sue cose, come mai avrebbe fatta questa eccezione per la teoria de' numeri, che non entrava che accidentalmente nel piano de' suoi Elementi, ed avrebbe poi tralasciato di ciò fare per le grandezze continue nel libro VI°. Se si vuol dunque riconoscere in Euclide il carattere di esattezza ch'è chiaramente marcato in tutte le sue cose, e se non si vuol distruggere male a proposito l'opinione di tutti i Geometri antichi, e moderni a suo riguardo, bisogna convenire, che senz'altro questi quattro libri formavano, come noi abbiamo detto, un'opera separata interamente dagli Elementi di Geometria, e che s'insegnava forse nelle Scuole Greche contemporaneamente ad essi. Ciò posto questi tali libri non solamente non debbono esser compresi nell'ordinaria istituzione; poichè, per le teorie che contengono, sono superflui per noi che possediamo l'Aritmetica volgare, e la speciosa; ma senza di questo nè anche vi dovrebbero esser compresi, per le ragioni poc' anzi dette,

Adunque l'XI°, XII°, e XIII° libro non sono a rigore, che il VII°, VIII°, e IX° degli Elementi di Euclide, che forse da Teone Alessandrino, o pur da altro antico espositore furon



trasportati nel luogo ove si trovano, ed intermezzati da libri non di Geometria. Noi intanto continueremo a nominarli XI<sup>o</sup>, XII<sup>o</sup>, e XIII<sup>o</sup>, essendosi quest'uso inveterato, e trovandosi essi così citati da tutti.

---

N O T A A L L A P A G. 18.

Da' libri di Solida di cui si parla in questa pagina ne abbiamo escluso il XIII<sup>o</sup>, per le ragioni addotte di sopra. E' vero che in questo si trova fatta una certa applicazione delle teorie del lib. X<sup>o</sup>; ma le cose che hanno bisogno di un tal ajuto non formano l'essenziale delle ricerche del libro XIII<sup>o</sup>: e poi quest'applicazione, ed in questo luogo non si oppone affatto all'opinione che noi ci abbiamo formata de' libri VII<sup>o</sup>, VIII<sup>o</sup>, IX<sup>o</sup>, e X<sup>o</sup>, e che qui appresso indicheremo,

# L' UNDECIMO LIBRO

## DEGLI

### ELEMENTI DI EUCLIDE.



#### DEFINIZIONI.

I. **IL solido** è ciò, che ha lunghezza, larghezza, e profondità.

II. Il termine del solido è la superficie.

III. Una linea retta è *perpendicolare* ad un piano, quando forma angoli retti con tutte le linee rette, che sono nel sottoposto piano, e la toccano.

IV. Un piano è *perpendicolare* ad un altro, quando ciascuna linea retta, che si conduce in uno di essi perpendicolare alla comune sezione loro, è anche perpendicolare all' altro piano.

V. Se da un qualunque punto di una linea retta inclinata ad un piano si abbassi su questo la perpendicolare, e poi si uniscano gli estremi dell' inclinata, e della perpendicolare, che sono nel piano; l' angolo acuto compreso da questa congiungente, e dall' inclinata stessa si dirà *inclinazione* di tal linea retta al piano.

VI. L' *inclinazione* di un piano ad un altro è quell' angolo acuto, ch' è compreso da due perpendicolari alla comune sezione de' piani, elevate da uno

stesso punto di essa, una in un piano, e l'altra nell'altro.

VII. Se sono uguali gli angoli d'inclinazione di due piani a due altri, quelli si dicono *similmente inclinati* a questi.

VIII. Piani *paralleli* sono quelli, che tra loro non possono mai convenire.

IX. L'*angolo solido* è quell'inclinazione, che si costituisce ad un punto sublime da più linee rette, che da questo si tirano agli angoli di un rettilineo sottoposto.

X. Figure solide simili sono quelle, che hanno i loro angoli solidi rispettivamente uguali, e che sono contenute da piani simili, ed uguali in numero.

XI. Si è tralasciata (*Veggasi la Nota* ad essa).

XII. Se i vertici degli angoli di un poligono si congiungano con un punto sublime; il solido racchiuso dagli emergenti triangoli, e dal sottoposto poligono, si dirà *piramide*.

XIII. Il *prisma* è una figura solida compresa da piani, de' quali due, che sono sempre opposti, sono paralleli, uguali e simili; ed i rimanenti sono parallelogrammi.

XIV. La *sfera* è quella figura descritta da un semicerchio, il qual si rivolga intorno al suo diametro fisso, finchè ritorni al luogo dove cominciò il suo moto.

XV. Questo diametro fisso dicesi *asse* della sfera.

XVI. Ed il centro del semicerchio è anche centro della sfera.

XVII. È poi *diametro* della sfera ogni linea retta, che passando per lo centro di essa, si arre-

sta da ambe le parti alla superficie sferica.

XVIII. Il *cono* è la figura descritta da un triangolo rettangolo, il qual si rivolga intorno ad un lato immobile, che comprende l'angolo retto, finchè ritorni nel luogo donde cominciò il suo moto.

XIX. Questo lato immobile intorno al quale si rivolge il triangolo, chiamasi *asse* del cono.

XX. La *base* del cono è poi quel cerchio, che si descrive dall'altro lato, ch'è intorno all'angolo retto.

XXI. Il *cilindro* è la figura descritta da un parallelogrammo rettangolo, il qual si rivolga intorno ad un suo lato immobile, finchè ritorni donde aveva cominciato a muoversi.

N. B. Per questa defin., e per la XVIII., veggasi la NOTA ad esse.

XXII. Questo lato immobile intorno al quale si rivolge il rettangolo, si dice *asse* del cilindro.

XXIII. E si chiama *base* ciascuno de' due cerchi che si descrive dai lati opposti, che sono ad angolo coll'asse.

XXIV. Coni *simili*, e cilindri *simili* sono quelli, i cui assi sono proporzionali ai diametri delle basi.

XXV. Il *cubo* è una figura solida contenuta da sei quadrati uguali.

XXVI. Il *tetraedo* è una figura solida compresa da quattro triangoli equilateri uguali.

XXVII. L' *ottaedro* è una figura solida contenuta da otto triangoli equilateri uguali.

XXXVIII. Il *dodecaedro* è una figura solida contenuta da dodici pentagoni uguali, equilateri, ed equiangoli.

XXIX. L' *icosaedro* è una figura solida compresa da venti triangoli equilateri uguali.

## PROPOSIZIONE I.

## TEOREMA.

*\* Una linea retta non può avere una qualche sua parte in un piano, ed un'altra in sublime.*

*fig. 1.* Se ciò può succedere, la linea retta ABC abbia la sua parte qualunque AB nel piano LM, e l'altra BC in sublime. Vi dovrà certamente essere nel piano LM una linea retta per dritto colla AB: sia questa la BD. Adunque le due linee rette ABC, ABD avrebbero comune il segmento AB; la qual cosa non  
\* c. 13. I. può succedere \*.

Quindi una linea retta non può avere, ec. C.B.D.

## PROPOSIZIONE II.

## TEOREMA.

*Tre punti, che non stieno per dritto, sono in un medesimo piano. E due linee rette, che s'intersecano consistono anche in un piano.*

*fig. 2.* Sieno i tre punti E, C, B, i quali non stieno per dritto: dico ch'essi sieno in un medesimo piano.

Si uniscano due di essi E, B per la EB, e s'intenda per questa passare un piano, il quale si concepisca poi rivolgersi intorno ad EB; dovrà un tal piano necessariamente passare per lo

punto C; e perciò i tre punti E, C, B consistono in un piano. Laonde anche le linee rette EC, EB che congiungono questi punti consistono nel piano stesso. Ma nel piano in cui sono le CE, EB vi stanno anche le ED, AE\*: dunque le linee rette CD, AB, che s'intersecano sono anche in uno stesso piano.

E perciò tre punti ec. C. B. D.

### PROPOSIZIONE III.

#### TEOREMA.

*La comune sezione di due piani, che s'intersecano è una linea retta.*

S'interseghino i due piani AK, LM: dico che *fig. 3.* la loro comune sezione sia una linea retta.

Imperocchè presi i punti B, e D in questa comune sezione; è chiaro, che se congiungasi la linea retta BD, questa unendo due punti, che esistono in ciascuno di essi piani, debba cadere nel tempo stesso sì nell'uno, che nell'altro; e che perciò debba essere la loro comune sezione.

Laonde la comune sezione ec. C. B. D.

## PROPOSIZIONE IV.

## TEOREMA.

*Se una linea retta è perpendicolare a due altre che s' intersecano , nel punto della loro intersezione ; sarà anche perpendicolare a quel piano che passa per esse .*

*fig. 4.* Sieno  $AB, CD$  due linee rette che s' intersecano in  $E$ , e la  $FE$  sia perpendicolare ad esse in questo punto  $E$ : dico che una tal linea retta  $FE$  debba essere anche perpendicolare al piano  $LM$ , che passa per le  $AB, CD$ .

Prendansi nelle  $AB, CD$  le  $EA, EC, EB, ED$  uguali tra loro; poi per  $E$  si tiri comunque la linea retta  $GEH$ , e si congiungano le  $DA, BC$ : finalmente preso un qualsivoglia punto  $F$  nella  $EF$ , si uniscano le  $FA, FC, FB, FD$ .

E poichè le due linee rette  $AE, ED$  sono uguali alle due altre  $CE, EB$ , e contengono angoli uguali; sarà anche la base  $AD$  uguale alla base  $BC$ , e l'angolo  $DAE$  uguale all'angolo  $EBC$ . Ma è pure l'angolo  $AEG$  uguale all'angolo  $BEH$ ; dunque i due triangoli  $AEG, BEH$  avendo due angoli uguali a due angoli, ciascuno a ciascuno, ed uguali anche i lati  $AE, EB$ , che sottendono angoli uguali; avranno i rimanenti lati uguali a' rimanenti lati: per lo che sarà  $GE$  uguale ad  $EH$ , ed  $AG$  a  $BH$ . Or essendo  $AE$  uguale ad  $EB$ , ed  $FE$  comune, e perpendicolare ad esse; sarà la

base FA uguale alla base FB; e nel modo stesso si dimostrerà essere FD uguale ad FC. Adunque i due triangoli DFA, CFB avendo i lati DF, FA uguali ai lati CF, FB, ciascuno a ciascuno, e la base AD uguale alla base BC; avranno l'angolo FAD uguale all'angolo FBC; e quindi i due altri triangoli FAG, FBH, avendo pur essi i lati FA, AG uguali ai lati FB, BH, e l'angolo FAG uguale all'angolo FBH, come si è dimostrato; avranno la base FG uguale alla base FH. Finalmente i due triangoli FEG, FEH avendo il lato GE uguale al lato EH, il lato EF comune, e la base FG uguale alla base FH; avranno l'angolo FEG uguale all'angolo FEH: e perciò FE sarà perpendicolare alla linea retta GEH. Similmente si dimostra, che FE sia perpendicolare ad ogn'altra linea retta tirata per E nel sottoposto piano: quindi dovrà tal linea retta FE esser perpendicolare al piano nel quale giacciono le AB, DC \* C. B. D.

\* d. 3. .

## P R O P O S I Z I O N E V.

## T E O R E M A.

*Se quattro linee rette partono da un medesimo punto, ed una di esse è perpendicolare a ciascuna delle tre altre; queste tre consisteranno in un piano.*

Dal punto A partano le quattro linee rette BA fig. 5. BC, BD, BE, ed una di esse BA sia perpendicolare alle altre tre BC, BD, BE: dico che que-



ste tre linee rette debbano consistere in un piano.

Poichè se è possibile, una di esse  $BC$  non consista colle altre due in un piano; ma il piano  $ABF$ , che passa per  $BC$ , e per  $BA$  intersecchi il piano  $LM$ , in cui giacciono le altre due  $BD$ ,  $BE$ ; lo dovrà intersegare in una linea

- \* 3. XI. retta\*, che sia  $BF$ . E poichè  $AB$  è perpendicolare a ciascuna delle due  $BD$ ,  $BE$ , dovrà essere anche perpendicolare al piano  $LM$ , che passa per
- \* 4. XI. esse\*; e quindi alla  $BF$ , che giace in questo piano
- \* d. 3. no\*. Dunque è retto l'angolo  $ABF$ : ma si è supposto esser anche retto l'angolo  $ABC$ ; quindi l'angolo  $ABF$  è uguale all'angolo  $ABC$ . La qual cosa è impossibile; mentre essi esistono in un medesimo piano. E perciò le tre linee rette  $BC$ ,  $BD$ ,  $BE$  dovranno consistere in un piano. C.B.D.

## PROPOSIZIONE VI.

### TEOREMA.

*Se due linee rette sieno perpendicolari ad un piano stesso, saranno parallele tra loro.*

- fig. 6. Sieno  $AB$ ,  $CD$  due linee rette perpendicolari allo stesso piano  $LM$ : dico ch' esse sieno parallele tra loro.

Imperocchè incontrino il piano  $LM$  ne' punti  $B$ ,  $D$ , che si uniscano colla  $BD$ , sulla quale si elevi da  $D$ , e nel piano  $LM$ , la perpendicolare  $DE$ , e tagliate le  $BA$ ,  $DE$  nguali, si congiungano le  $BE$ ,  $AD$ ,  $AE$ .

E poichè ne' triangoli ABD, BDE sono uguali i lati AB, DE, l'altro BD è comune, e l'angolo ABD è retto, al pari dell'altro BDE; mentre AB si è supposta perpendicolare al piano LM\*: sarà BE uguale ad AD; e perciò i\* d. 3. due altri triangoli ABE, ADE avendo i lati AB, BE uguali agli altri lati DE, DA, ciascuno a ciascuno, e la base AE comune, avranno gli angoli ABE, ADE uguali; e l'angolo di questi sarà retto al pari del primo. Dunque la linea retta ED, che per costruzione era perpendicolare alla DB, e per ipotesi alla DC, lo è anche alla DA; e perciò queste tre linee consisteranno in un piano\*. Ma nel piano delle BD, DA è pure\* 5. XI. BA; poichè consistendo i tre punti A, B, D in un piano\*; le tre linee rette AB, BD, DA, che\* 2. XI. gli uniscono, dovranno giacere in un tal piano. Laonde sulle linee rette BA, DC esistenti in un piano stesso, cadendovi la BD, e formando gli angoli interiori ABD, BDC retti, esse BA, DC saranno parallele.

E perciò se due linee rette, ec. C. B. D.

N. B. La Prop. VII. si è tralasciata. (Veggasi la Nota su di essa)

## PROPOSIZIONE VIII.

### TEOREMA.

*Se due linee rette sieno parallele, ed una di esse sia perpendicolare ad un piano, anche l'altra sarà perpendicolare al piano stesso.*

Le due linee rette AB, CD sieno parallele, ed *fig. 6.*

— AB sia perpendicolare al piano LM: dico che anche CD debba esser perpendicolare allo stesso piano.

- Si uniscano i punti B, D, ove le AB, CD incontrano il piano LM, cadrà la BD nel piano delle parallele AB, CD; e perciò saranno le AB, CD, BD in un solo piano: indi dal punto D si tiri DE perpendicolare a DB, e nel piano LM; si ponga DE uguale ad AB, e si uniscano le BE, AE, AD. E poichè AB è perpendicolare al piano LM, dovrà esser perpendicolare sì alla BD, che alla BE, che sono in questo piano, e la toccano in B\*; e perciò ciascuno degli angoli ABD, ABE è retto. Or essendo AB uguale a DE, e BD comune; saranno le due AB, BD uguali alle due ED, DB, ciascuna a ciascuna: ma è anche l'angolo ABD uguale all'angolo EDB, perchè ciascuno di essi è retto; quindi la base AD è uguale alla base BE. Similmente essendo AB uguale a DE, e BE ad AD, saranno le due AB, BE uguali alle due ED, DA; è poi la base AE comune; dunque sarà l'angolo ABE uguale all'altro EDA. Laonde essendo retto ABE, sarà anche EDA retto; e quindi ED è perpendicolare a DA. Ma ED è anche perpendicolare a DB; dovrà perciò ED essere perpendicolare al piano che passa per le BD, DA\*, e quindi a DB, che si trova in questo piano\*;
- \* d. 3. poichè tutte tre le BD, DA, DC sono nel piano nel quale esistono le parallele AB, CD: dunque l'angolo CDE è retto. Ma è anche retto l'altro CDB. Quindi CD essendo perpendicolare alle due DB, DE nel punto D ove s'intersecano;
- \* 4. XI.

sarà anche perpendicolare al piano LM che passa per esse \*.

\* 4. XI.

E perciò se una linea retta ec. C. B. D.

## PROPOSIZIONE IX.

### TEOREMA.

*Due linee rette che sono parallele ad una terza, sono anche parallele tra loro, ancorchè non stieno in un medesimo piano.*

Sia ciascuna delle linee rette AB, CD parallela ad EF, e non stieno esse tre linee rette nel piano stesso: dico che AB sia parallela a CD.

Imperocchè si prenda nella EF un qualsivoglia punto G, dal quale si tirino ad essa EF le due perpendicolari GH, GK, la prima nel piano della parallela EF, AB, l'altra in quello delle altre parallele EF, CD. E poichè EF è perpendicolare alle due GH, GK, sarà anche perpendicolare al piano in cui queste consistono \*; e ciascuna delle altre linee rette AB, CD, perchè parallela alla EF, dovrà esser perpendicolare al piano stesso \*; quindi le AB, CD saranno tra loro parallele.

\* 4. XI.

\* 8. XI.

Laonde due linee rette ec. C. B. D.

## PROPOSIZIONE X.

## TEOREMA.

*Se i lati di un angolo, ch'è in un piano, sieno rispettivamente paralleli ai lati di un altro angolo, che si trova in un piano diverso; cotesti angoli saranno uguali.*

*fig. 8.* I lati dell'angolo BAC, che è in un piano sieno rispettivamente paralleli ai lati dell'altro angolo EDF, che sta in un altro piano, cioè AB a DE, ed AC a DF: dico che l'angolo BAC sia uguale all'altro EDF.

Imperocchè si prendano ne' lati di uno degli angoli BAC due punti B, C ad arbitrio; e poi si taglino dai lati dell'altro angolo EDF le parti DE, DF uguali rispettivamente alle AB, AC, e si uniscano le AD, BE, CF, BC, EF. E poichè BA è uguale, e parallela a DE, sarà anche AD uguale, e parallela a BE. Per la stessa ragione anche CF è uguale, e parallela ad AD: quindi CF è uguale, e parallela a BE \*. Laonde anche uguali, e parallele saranno le BC, EF, che congiungono gli estremi di quelle: e perciò i due triangoli BAC, EDF, che per costruzione hanno uguali rispettivamente i lati intorno agli angoli in A, ed in D, hanno per dimostrazione basi uguali; quindi l'angolo in A dovrà essere uguale all'altro in D.

Adunque se i lati di un angolo ec. C. B. D.

\* 9. XI.

## PROPOSIZIONE XI.

## PROBLEMA.

*Tirare da un punto dato in sublime una perpendicolare sopra un piano dato.*

Sia dato il punto  $A$  in sublime, e sia poi dato *fig. 9.* il sottoposto piano  $LM$ ; fa d'uopo tirare dal punto  $A$  una perpendicolare al piano  $LM$ .

Si tiri nel dato piano  $LM$  una linea retta  $BC$ , sulla quale si abbassi dal dato punto  $A$  la perpendicolare  $AD$  \*; se questa sarà anche perpendicolare al sottoposto piano  $LM$ , si sarà fatto quello, che si cercava. Che se poi non lo sia; dal punto  $D$  si elevi sulla  $BC$ , e nel piano  $LM$ , la perpendicolare  $DF$  \*, e su di questa si abbassi dal punto  $A$  la perpendicolare  $AF$ ; sarà tal linea retta la perpendicolare al piano  $LM$ . \* 12. I. \* 11. I.

Per  $F$  si tiri  $FE$  parallela a  $BC$ . Ed essendo retti i due angoli  $BDF$ ,  $BDA$ ; sarà  $BD$  perpendicolare al piano, che passa per le  $DF$ ,  $DA$ , al quale sarà anche perpendicolare la  $EF$ , ch'è parallela alla  $BD$  \*: dunque l'angolo  $AFE$  è retto. Ma \* 8. XI. è anche retto l'altro  $AFD$ : quindi  $AF$  è perpendicolare alle due  $FE$ ,  $FD$  nel punto  $F$  della loro intersezione, e perciò è anche perpendicolare al piano  $LM$  in cui queste consistono \*. Adunque \* 4. XI. essa è la perpendicolare che doveasi abbassare dal dato punto  $A$  sul piano  $LM$ .

Quindi da un dato punto ec.  $C. B. F.$

PROPOSIZIONE XII.

PROBLEMA.

*Tirare una linea retta perpendicolare ad un piano da un punto dato in esso.*

fig. 10. Sia A il punto dato nel piano LM: fa d' uopo da questo punto A elevare una perpendicolare sul piano LM.

Si concepisca un altro punto B subline, dal quale si abbassi sul piano LM la perpendicolare

\* 11. XI. BC \*, ed a questa si tiri per A la parallela AD, che sarà perpendicolare al piano LM, al pari

\* 6. XI. dell' altra BC \*.

E perciò si è tirata una linea retta ec. C.B.F.

PROPOSIZIONE XIII.

TEOREMA.

*Da uno stesso punto non si possono elevare sopra un piano, e dalla medesima parte di esso, due perpendicolari.*

fig. 11. S' è possibile sieno BA, AC due perpendicolari elevate sul piano LM dallo stesso punto A, e dalla medesima parte di esso. Si tiri per queste un piano, la cui comune sezione coll' altro LM

\* 3. XI. sia la linea retta DE \*.

Ed essendo sì BA, che CA perpendicolare a

piano LM, sarà retto ciascuno degli angoli BAE, CAE; e quindi l'un di essi uguale all'altro: il maggiore al minore: il che è impossibile. E perciò è impossibile di elevare dallo stesso punto A due perpendicolari sul piano LM, dalla medesima parte di esso. C. B. D.

### PROPOSIZIONE XIV.

#### TEOREMA.

*Se una stessa linea retta è perpendicolare a due piani; questi saranno paralleli tra loro.*

Sia la stessa linea retta AB perpendicolare sì al piano EF, che all' altro CD: dico che questi piani sieno paralleli tra loro. fig. 12.

Poichè se non sono paralleli, prodotti per un verso converranno: si producano, e conveughano nella linea retta HG; e preso in questa un qualsivoglia punto K, si tirino da esso ai punti A, B le AK, BK, che esisteranno, com' è chiaro, rispettivamente ne' piani EFHG, CDHG, e costituiranno colla AB un triangolo. Or la AB, essendo perpendicolare ai piani DC, FE, lo deve essere anche alle linee rette AK, BK, che sono tirate in essi; e perciò gli angoli KAB, KBA sono retti. Adunque il triangolo AKB avrebbe due angoli retti: il che è impossibile. E perciò i piani EF, CD non possono convenire, e sono per conseguenza paralleli.

Laonde se una linea retta ec. C. B. D.



## PROPOSIZIONE XV.

## TEOREMA.

*Se in un piano vi sia un angolo rettilineo , che abbia i lati paralleli a quelli di un altro angolo rettilineo , ch'è in un piano diverso; essi piani saranno anche paralleli .*

fig. 13. Nel piano LM vi sia l'angolo ABC , i cui lati AB , BC sieno rispettivamente paralleli ai lati DE , EF dell'altro angolo DEF , ch'è nel piano PQ : dico che i piani LM , PQ sieno paralleli .

Dal vertice B dell'angolo ABC si abbassi sul piano PQ , dove sta l'altro angolo DEF , la perpendicolare BG , e per G si tirino le GH , GK parallele rispettivamente alle ED , EF .

- E poichè BA è parallela ad ED per supposizione , ed ED è parallela a GH ; dovrà BA esser parallela a GH \* . Per lo che essendo BG perpendicolare al piano PQ , e perciò retto l'angolo BGH , sarà anche retto l'altro GBA . E dimostrandosi in simil modo , che sia retto l'angolo GBC , sarà la linea retta FG perpendicolare alle due BA , BC nel punto B della loro intersezione , e per conseguenza al piano LM , in cui queste esistono \* . Ma una tal linea retta è per costruzione perpendicolare al piano PQ ; quindi questi due
- \* 9. XI. piani saranno paralleli \* .
- \* 4. XI. \* .
- \* 14. XI. piani saranno paralleli \* .

Per la qual cosa se in un piano ec. C. B. D.

## PROPOSIZIONE XVI.

## {TEOREMA.

*Se due piani paralleli sieno segati da un terzo piano; le intersezioni di questo con ciascuno di quelli saranno parallele.*

I due piani paralleli  $AB$ ,  $CD$  sieno segati dal *fig. 14* terzo  $EFGH$ : dico che le comuni sezioni  $EF$ ,  $GH$  di questo piano con ciascuno di quelli sieno anche parallele.

Imperocchè se le  $EF$ ,  $GH$  non sono parallele, prolungate da una delle due parti converranno. Si prolunghino dalla parte  $FH$ , e convengano in  $K$ . E poichè la linea retta  $GHK$  è nel piano  $AB$ ; dovrà il punto  $K$  esistere in questo stesso piano prolungato: e per la stessa ragione un tal punto dovrà anche trovarsi nel piano  $CD$  prolungato. L'onde i piani  $AB$ ,  $CD$ , se si prolunghino, converranno. Ma non possono convenire, poichè paralleli. Dunque nè pure potranno incontrarsi le linee rette  $EF$ ,  $GH$  dalla parte  $FH$ . Così pure si dimostra, che non possono incontrarsi dall'altra parte  $EG$ : perciò le due linee rette  $EF$ ,  $GH$ , ch' esistono nello stesso piano  $EFGH$ , e che non possono incontrarsi, se si prolunghino dall'una parte, o dell'altra, saranno parallele.

Adunque se due piani paralleli cc.  $C. B. D.$

## PROPOSIZIONE XVII.

## TEOREMA.

*Se due linee rette sieno segate da piani paralleli, saranno da questi proporzionalmente divise.*

fig. 15. Le due linee rette  $AB$ ,  $CD$  sieno segate dai piani paralleli  $GH$ ,  $KL$ ,  $MN$  nei punti  $B$ ,  $E$ ,  $A$ ;  $D$ ,  $F$ ,  $C$ : dico che come la linea retta  $AE$  all'altra  $EB$ , così stia  $CF$  ad  $FD$ .

Imperocchè si uniscano le  $AC$ ,  $BD$ ,  $CB$ , e questa  $CB$  incontri il piano  $KL$  nel punto  $X$ , dal quale si tirino ai punti  $E$ , ed  $F$  le  $EX$ ,  $XF$ .

E poichè i due piani paralleli  $MN$ ,  $KL$  sono segati dal piano  $BAC$ , le intersezioni  $AC$ ,  $EX$  di  
 \* 16.XI. questo con quelli, saranno parallele\*; e perciò, essendosi condotta la parallela  $EX$  al lato  $AC$  del triangolo  $ABC$ , dovrà stare  $BE$  ad.  $EA$ , come  $BX$  ad  $XC$ : e dimostrando similmente, che stia  $BX$  ad  $XC$ , come  $DF$  ad  $FC$ , per essersi tirata nell'altro triangolo  $BCD$  la  $XF$  parallela alla  $BD$ ; sarà  $BE$  ad  $EA$ , come  $DF$  ad  $FC$ .

Adunque se due linee rette ec.  $C$ .  $B$ .  $D$ .

## PROPOSIZIONE XVIII.

## TEOREMA.

*Se una linea retta sia perpendicolare ad un piano; ogni altro piano, che passa per essa, sarà*

*anche perpendicolare a quello stesso piano.* —

La linea retta AB sia perpendicolare al sotto-fig. 16.  
posto piano LE : dico che ogni altro piano , che  
passa per la AB, sia perpendicolare al piano LE.

Imperocchè si faccia passare per la AB il piano  
CH, e sia CE la comune sezione di questo piano  
col sottoposto LE ; indi si prenda nella CE un  
qualunque punto F, dal quale si tiri nel piano  
CH la FG perpendicolare alla CE . E poichè BA  
è perpendicolare al piano LE , sarà perpendico-  
lare alla linea retta CE che esiste in un tal pia-  
no \* ; dunque l'angolo BAF è retto : ma è an- \* d.3.XI  
che retto l'altro GFA ; quindi la AB è parallela  
alla FG . Per lo che essendo AB perpendicolare  
al piano LE ; sarà anche FG perpendicolare ad  
un tal piano \* . Ma un piano è perpendicolare  
ad un' altro , allorchè ciascuna linea retta , che si  
tira in uno di essi piani perpendicolarmente alla  
comune sezione loro , è anche perpendicolare all'  
altro piano \* : ed essendosi tirata da F nel pia- \* 8. XI  
no CH la FG perpendicolare alla comune sezione  
CE , si è dimostrato che questa è anche perpen-  
dicolare al piano EL ; adunque il piano CH, che  
si è supposto passare ad arbitrio per la AB , è  
perpendicolare all' altro EL .

E quindi se una linea ec. C. B. D.

## PROPOSIZIONE XIX.

## TEOREMA.

*Se due piani che s'intersecano sono perpendicolari ad un altro piano; la loro comune sezione sarà anche perpendicolare a questo stesso piano.*

*fig. 17.* Sieno AB, CB due piani, che s'intersecano, ciascun de' quali è perpendicolare al piano AC; e sia BD la loro intersezione: dico che questa BD debba essere anche perpendicolare al piano AC.

Poichè se non lo è, non potrà nè pure esser perpendicolare all'una, o all'altra delle linee rette DA, DC che sono nel piano CA, e la toccano in D\*; e perciò si potranno da un tal punto tirar due linee rette, una DE nel piano BA, la quale sia perpendicolare ad AD, e l'altra DF nel piano BC, che sia perpendicolare a DC. E poichè nel piano AB, ch'è perpendicolare all'altro AC, si è tirata DE perpendicolare alla AD comune sezione di essi piani; sarà \*d.4.XI. DE perpendicolare al sottoposto piano AC\*: e similmente si dimostra, che anche DF è perpendicolare allo stesso piano AC. Quindi dal medesimo punto D si sarebbero elevate sul piano AC, e dalla stessa parte, due perpendicolari; il che non \*13.XI. può essere\*. Laonde non si potrà elevare dal punto D al piano AC altra perpendicolare, oltre la DB, ch'è l'intersezione dei piani AB, BC.

E perciò se due piani ec. C. B. D.

## PROPOSIZIONE XX.

## TEOREMA.

*Se un angolo solido sia contenuto da tre angoli piani; due di essi, comunque presi, sono maggiori del terzo.*

L'angolo solido in  $A$  sia contenuto dai tre angoli piani  $BAC$ ,  $CAD$ ,  $DAB$ : dico che due di questi angoli, comunque presi, sieno maggiori del terzo. fig. 18;

Imperocchè se i tre angoli  $BAC$ ,  $CAD$ ,  $DAB$  sono uguali, è manifesto che due, comunque presi, sieno maggiori del terzo. Ma se non è così, ve ne sarà uno  $BAC$  non minore di ciascuno dei rimanenti; ma però maggiore di un di essi  $DAB$ ; e perciò si costituisca alla linea retta  $AB$ , al punto  $A$  in essa, e nel piano dell'angolo  $BAC$  l'angolo  $BAE$  uguale all'altro  $BAD$ ; poi pongasi  $AE$  uguale ad  $AD$ , e tirata per  $E$  la  $BEC$ , che incontri le  $AB$ ,  $AC$  nei punti  $B$ ,  $C$ , si uniscano le  $BD$ ,  $DC$ . E poichè  $DA$  è uguale ad  $AE$ , ed  $AB$  è comune; perciò sono le due  $DA$ ,  $AB$  uguali alle due  $EA$ ,  $AB$ ; è pure l'angolo  $DAB$  uguale all'angolo  $EAB$ : dunque la base  $BD$  è uguale alla base  $BE$ . Laonde essendo le due  $BD$ ,  $DC$  maggiori di  $BC$ , e  $DB$  uguale a  $BE$ ; dovrà la rimanente  $DC$  esser maggiore della rimanente  $CE$ . Or poichè  $DA$  è uguale ad  $AE$ ,  $AC$  è comune; e la base  $DC$  è maggiore della base  $EC$ ; sarà l'angolo  $DAC$  maggiore dell'altro  $EAC$ . Ma per

costruzione l'angolo  $DAB$  è uguale all'altro  $BAE$ ; quindi gli angoli  $DAB$ ,  $DAC$ , insieme presi, sono maggiori dell'angolo  $BAC$ : è poi l'angolo  $BAC$  non minore di ciascuno degli altri  $DAB$ ,  $DAC$ ; perciò un di questi insieme con  $BAC$  dovrà esser maggiore del rimanente.

Per la qual cosa se un angolo solido ec. C.B.D.

## PROPOSIZIONE XXI.

### TEOREMA.

*Tutti gli angoli piani, che comprendono un angolo solido, sono minori di quattro retti.*

fig. 19. Sia l'angolo solido in  $A$  contenuto dagli angoli piani  $BAC$ ,  $CAD$ ,  $DAB$ : dico che questi sieno minori di quattro retti.

Si concepisca un piano incontrare quegli altri piani ne' quali esistono gli angoli  $BAC$ ,  $CAD$ ,  $DAB$ , e sieno  $BC$ ,  $CD$ ,  $DB$  le comuni sezioni di quel piano con questi. E poichè l'angolo solido in  $B$  è compreso da tre angoli piani  $ABD$ ,  $ABC$ ,  $CBD$ ; dovranno due qualunque di questi  $ABD$ ,  $ABC$  esser maggiori del terzo  $CBD$ : così anche si dimostra, che i due angoli  $ACD$   $ACB$  sono maggiori dell'angolo  $DCB$ ; e che i due  $ADB$ ,  $ADC$  sono maggiori di  $BDC$ ; dunque i sei angoli  $ABD$ ,  $ABC$ ,  $ACB$ ,  $ACD$ ,  $ADC$ ,  $ADB$ , insieme presi, sono maggiori dei tre angoli del triangolo  $BDC$ , cioè di due retti. Or questi sei angoli insieme co' tre altri, che comprendono

l'angolo solido in A compongono gl' angoli de' tre triangoli BAD , DAC , CAB, e fan perciò sei retti; e sono que' sei angoli maggiori di due retti, come si è dimostrato: dovranno dunque quelli che comprendono l'angolo solido in A esser minori di quattro retti. Similmente si dimostrerebbe, che sieno minori di quattro retti gli angoli piani, che comprendono un angolo solido, se essi sieno quattro, o più.

Dunque in generale tutti gli angoli piani ec. C. B. D.

## PROPOSIZIONE XXII.

### LEMMA.

*Dal centro di un cerchio sieno tirati quattro raggi, che comprendano tre angoli capaci a costituire un angolo solido, de' quali il primo, ed il terzo sieno acuti; e poi pe' termini dei raggi estremi si conducano al cerchio le tangenti, che incontrino i raggi medj prolungati: si potrà costituire un triangolo dalla congiungente questi punti d'incontro, e da quelle tangenti.*

Dal centro A del cerchio BEG sieno tirati *fig. 20.* quattro raggi AB, AF, AG, AE, che comprendano i tre angoli BAF, FAG, GAE capaci a costituire un angolo solido, dei quali il primo, ed il terzo sieno acuti; e poi dai punti B, E si tirino al cerchio le tangenti BC, ED, e congiungasi la CD: dico che dalle tre linee rette BC,



CD, DE se ne potrà costituire un triangolo.

Si supponga esser l'angolo BAC quello de' due acuti, che non è minore dell'altro DAE, e dal punto C si tiri al cerchio BEG l'altra tangente Cb, e si congiunga la bA; sarà Cb uguale a CB, e l'angolo CAB uguale all'altro

- \* 12. IV. CAB\*: si unisca Db. E perchè due dei tre angoli proposti sono maggiori del terzo; dovrà l'angolo DAb, ch'è la differenza dei due DAC, CAB, cioè DAC, CAB, esser minore dell'altro DAE; per lo che i due triangoli DAE, DAb avendo il lato DA comune, gli altri lati AE, Ab uguali, e l'angolo DAE maggiore dell'altro DAb; avranno la base DE maggiore della base Db. E perciò essendo DC e Db maggiori di Cb, o di CB, saranno anche DC e DE maggiori di CB: e similmente dall'essere Cb e Db, o pure CB e Db, maggiori di DC, se ne rileva, che CB e DE debbano anche esser maggiori di CD. Finalmente se l'angolo BAC è uguale all'altro EAD, è chiaro che BC sarà uguale ad ED; e perciò che DE sia minore di BC, CD, prese insieme. Che se poi tali angoli si suppongano disuguali, e BAC il maggiore: si costituisca al punto A della linea retta AB l'angolo BAe uguale all'altro EAD; è chiaro che la DE, al pari della sua uguale Be, debba esser minore della BC; e quindi anche minore delle BC, CD, insieme prese. Adunque dalle tre linee rette BC, CD, DE se ne potrà costituire un triangolo.

E perciò dal centro di un cerchio ec. C. B. D.

## PROPOSIZIONE XXIII.

## PROBLEMA.

*Costituire un angolo solido con tre angoli piani minori di quattro retti, e tali che due, comunque presi, sieno maggiori del terzo.*

Sien dati i tre angoli piani  $HLK$ ,  $Q$ ,  $PRS$  minori di quattro retti, e tali che due, comunque presi, sieno maggiori del terzo: bisogna costituire con essi un angolo solido. fig. 21.

Caso 1. Se almen due degli angoli dati  $HLK$ ,  $PRS$  sono retti; allora dal vertice dell'angolo  $CAB$  uguale al terzo angolo  $Q$ , si elevi la perpendicolare  $AD$  al piano di esso angolo  $CAB$  \*, e sarà \* 12. XI. chiaro che questa, e le due  $AB$ ,  $AC$  costituiranno al punto  $A$  un angolo solido contenuto da tre angoli piani rispettivamente uguali ai tre dati  $HLK$ ,  $Q$ , e  $PRS$ .

Caso 2. Che se due di essi angoli  $HLK$ ,  $PRS$  sieno acuti, e l'altro comunque: allora preso in un piano un punto  $A$ , si tirino da questo nel piano stesso le quattro linee rette  $AB$ ,  $AC$ ,  $AD$ ,  $AE$ , che comprendano gli angoli  $BAC$ ,  $CAD$ ,  $DAE$  uguali rispettivamente ai tre dati  $HLK$ ,  $Q$ , e  $PRS$ , ed in modo, che il primo  $BAC$ , e l'ultimo  $DAE$  sieno gli acuti; e poi descritto col centro  $A$  intervallo qualunque  $AB$  il cerchio  $BEG$ , si faccia la stessa costruzione del Lemma precedente: si potrà costituire un triangolo dalle tre linee rette  $BC$ ,  $CD$ ,

*c fig. 21.*  
*n. 2.* DE ; sia questo il triangolo  $bcd$  , ed innalzata sul piano di esso , dal vertice del suo angolo compreso dalle  $bc$  ,  $bd$  , uguali rispettivamente alle  $BC$  ,  $DE$  , la perpendicolare  $ba$  uguale alla  $BA$  , o alla  $AE$  , si congiungano le  $ac$  ,  $ad$  ; sarà l'angolo solido in  $a$  , ch'è compreso dagli angoli piani  $cab$  ,  $bad$  ,  $dac$  quello che si cerca .

Imperocchè i due triangoli rettangoli  $CBA$  ,  $cba$  avendo rispettivamente uguali i lati intorno agli angoli retti  $CBA$  ,  $cba$  , dovranno avere anche uguali le ipotenuse  $CA$  ,  $ca$  , e dovrà di più essere l'angolo  $cab$  uguale all' altro  $CAB$  , cioè ad  $HKL$  . Similmente si dimostrerà esser  $DA$  uguale a  $da$  , e l'angolo  $dab$  uguale a  $DAE$  , cioè a  $PRS$  . Laonde i due triangoli  $CAD$  ,  $cad$  avendo i lati rispettivamente uguali , dovranno avere anche l'angolo  $cad$  uguale all' altro  $CAD$  , cioè a  $Q$  : e perciò i tre angoli  $bac$  ,  $bad$  ,  $cad$  , che comprendono l'angolo solido in  $a$  pareggiano rispettivamente i tre dati .

*fig. 21.*  
*n. 2.* CASO 3. Sieno ora ottusi due degli angoli dati  $IKH$  ,  $sRP$  . Si prolunghino i lati  $IK$  ,  $sR$  degli angoli  $IKH$  ,  $sRP$  in  $L$  , ed  $S$  , e poi cogli angoli  $HKL$  ,  $PRS$  , che sono acuti , e col terzo angolo  $Q$  si costituisca , come nel caso precedente , l'angolo solido in  $a$  . Indi il lato  $ba$  di quest'angolo solido , ch'è adjacente ai due angoli  $bac$  ,  $bad$  , che sono uguali ad  $HKL$  ,  $PRS$  , si prolunghi al di sopra del vertice  $a$  in  $h$  ; sarà l'angolo solido cercato quello , che si costituisce al punto  $a$  dagli angoli  $cad$  ,  $cah$  ,  $dah$  .

Poichè si vede chiaramente , che essendo i due angoli  $bac$  ,  $cah$  uguali a due retti , saranno essi

uguali ai due  $LKH$ ,  $HKL$ ; e che perciò toltine gli uguali  $bac$ ,  $HKL$  debba il rimanente angolo  $HKL$  pareggiare il rimanente  $hac$ : e similmente si dimostra, che  $dah$  sia quanto l'altro  $PRs$ . Ma è poi  $cad$  uguale al terzo angolo dato  $Q$ : dunque l'angolo solido costituito in  $a$  dai tre angoli piani  $cah$ ,  $dah$ ,  $cad$  sarà quello, che si cerca.

Caso 4. Finalmente sia l'angolo  $Q$  acuto, l'altro  $HKL$  retto, ed il terzo  $PRs$  ottuso. Si prolunghi similmente la  $sR$  in  $S$ ; e poi si costituisca l'angolo solido in  $a$  contenuto dai tre angoli piani  $cab$  uguale ad  $HKL$ ,  $cad$  uguale a  $Q$ , e  $dab$  uguale a  $PRs$  \*; e si prolunghi il lato  $ad$  adja- \* cas. 2. cente ai due angoli  $cab$ ,  $dab$  in  $h$ ; sarà l'angolo solido in  $a$ , compreso dai tre angoli piani  $cah$ ,  $cad$ ,  $dah$ , quello che si cerca. Imperocchè essendo l'angolo  $cab$  retto, sarà il suo conseguente  $cah$  anche retto; e perciò uguale all'angolo  $HKL$ : ed essendo i due angoli  $dab$ ,  $dah$  uguali a due retti, e quindi uguali ai due  $sRP$ ,  $PRs$ ; toltine gli angoli uguali  $dab$ ,  $PRs$ , resterà l'angolo  $dah$  uguale all'altro  $PRs$ . È poi l'angolo  $cad$  uguale all'angolo  $Q$ ; quindi il sopraindicato angolo solido in  $a$  sarà il cercato.

Laonde si è costituito un angolo solido ec.C.B.D.

## PROPOSIZIONE A.

### TEOREMA.

*Se ai vertici di due angoli piani uguali si udatino in sublime due linee rette, le quali compren-*

*dano angoli uguali coi lati degli angoli proposti , ciascuno a ciascuno : gli angoli solidi , che si verranno in tal modo a costituire in quei punti , saranno uguali .*

*fig. 22.* Sieno i due angoli piani uguali BAC, EDF, ed ai punti A, D si adattino in sublime le linee rette AG, DP, le quali comprendano angoli uguali, ciascuno a ciascuno, coi lati degli angoli proposti, cioè sia l'angolo GAB uguale a PDE, e l'angolo GAC a PDF: dico che gli angoli solidi, che si verranno in tal modo a costituire nei punti A, D sieno uguali.

Si prendano le AH, e DM uguali, e dai punti H, M si abbassino le HK, MN rispettivamente perpendicolari ai piani BAC, EDF: poi si tirino da questi punti K, ed N alle linee rette AB, AC, DE, DF le perpendicolari KB, KC, NE, NF; e finalmente si uniscano le HB, BC, ME, EF. E poichè HK è perpendicolare al piano BAC; sarà anche il piano HBK, che passa per la HK, perpen-

\* 18.XI. dicolare allo stesso piano BAC\*: ma in questo piano BAC si è tirata la AB perpendicolare alla comune sezione BK dei piani BAC, BHK; perciò AB è

\* p.4.XI perpendicolare al piano HBK\*, e quindi alla

\* d.3.XI BH, che giace in questo piano\*. Adunque l'angolo ABH è retto: e similmente si dimostra, che sia retto l'angolo DEM. Laonde i due triangoli HAB, MDE avendo uguali gli angoli ABH, DEM, perchè retti; gli altri loro angoli HAB, MDE essendo pure uguali per supposizione, e pareggiandosi anche i loro lati AH, DM; do-

vrà essere  $AB$  uguale  $DE$ . E similmente, se congiungansi le  $HC$ ,  $MF$ , si dimostrerà che  $AC$  sia uguale a  $DF$ . Or essendo  $AB$  uguale a  $DE$ , ed  $AC$  a  $DF$ ; saranno le due  $BA$ ,  $AC$  uguali alle due  $DE$ ,  $DF$ , ciascuna a ciascuna; di più queste linee rette uguali comprendono gli angoli uguali  $BAC$ ,  $EDF$ ; sarà perciò  $BC$  uguale ad  $EF$ , e l'angolo  $ABC$  uguale all'angolo  $DEF$ . Ma era l'angolo retto  $ABK$  uguale all'angolo retto  $DEN$ ; quindi il rimanente angolo  $CBK$  sarà uguale al rimanente  $FEN$ : e così pure si dimostra, che l'angolo  $BCK$  sia uguale all'altro  $EFN$ . Per lo che i due triangoli  $BCK$ ,  $EFN$  avendo due angoli uguali a due angoli, ciascuno a ciascuno, ed il lato  $BC$  uguale all'altro  $EF$ ; avranno anche il lato  $BK$  uguale al lato  $EN$ : è poi  $AB$  uguale a  $DE$ ; perciò le due  $AB$ ,  $BK$  sono uguali alle altre due  $DE$ ,  $EN$ , e comprendono angoli retti; dunque  $AK$  sarà uguale a  $DN$ . Ciò posto il quadrato di  $AH$  è uguale ai quadrati di  $AK$ ,  $KH$ , perchè l'angolo  $AKH$  è retto; e similmente il quadrato di  $DM$  pareggia quelli di  $DN$ ,  $NM$ : sono poi uguali non solamente i quadrati di  $AH$ , e di  $DM$ , ma anche gli altri di  $AK$ , e di  $DN$ ; dunque dovrà il quadrato di  $HK$  pareggiar quello di  $MN$ ; e perciò  $HK$  essere uguale ad  $MN$ .

Or se si concepisca applicarsi l'angolo solido in  $A$  all'altro in  $B$  in modo, che l'angolo  $BAC$  combaci col suo uguale  $EDF$ , cadranno i punti  $B$ ,  $C$ , ne' punti  $E$ ,  $F$ ; e quindi l'angolo  $ABK$  combacerà coll'angolo  $DEN$ , perchè l'uno, e l'altro è retto; e l'angolo  $ACK$  coll'angolo  $DFN$ , per la

stessa ragione: e perciò il punto K cadrà in N, e le KH, NM, come perpendicolari ai piani BAC, EDF, che coincidono, dovranno pur cadere l'una nell'altra, e quindi essendo esse uguali, cadrà il punto H nel punto M, e la HA combacerà colla MD. Adunque i due angoli solidi in A, ed in D combaceranno anch' essi, e perciò saranno uguali.

COR. Da ciò si rileva, che se gli angoli solidi in A, ed in D sieno contenuti ciascuno da tre angoli piani, i quali sieno rispettivamente uguali, e similmente posti, cioè l'angolo BAC uguale all'angolo EDF; l'angolo BAG uguale all'angolo EDP, e l'angolo GAC all'angolo PDF; e che in due loro lati corrispondenti AG, DP si prendano le parti uguali AH, DM, donde si abbassino ai piani in cui esistono gli angoli opposti ad essi lati, le perpendicolari HK, MN; queste saranno uguali; e se congiungansi le AK, DN l'angolo HAK pareggerà l'angolo MDN.

## PROPOSIZIONE B.

### TEOREMA.

*Le figure solide contenute dallo stesso numero di piani simili, uguali, e similmente posti, e delle quali ciascun angolo solido non sia compreso da più di tre angoli piani, sono uguali, e simili tra loro.*

fig. 23. Sieno le figure solide AG, KQ contenute dallo stesso numero di piani simili, uguali, e similmente posti; cioè sia il piano AC uguale e simile al piano KM, il piano AF a KP, BG ad

LQ, GD a QN, DE ad NO, e finalmente FH a PR; e che di più ciascun loro angolo solido non costi di più di tre angoli piani: dico che la figura solida AG sia uguale, e simile all'altra KQ.

Poichè ai vertici A, e K degli angoli piani uguali BAE, LKO si sono adattate in sublime le linee rette AD, KN, le quali comprendono co' lati degli angoli proposti uguali angoli, ciascuno a ciascuno, cioè l'angolo EAD all'angolo OKN, e l'altro DAB uguale ad NKL; sarà l'angolo solido in A uguale a quello in K \* : e similmente si \* A.XI. dimostreranno uguali tra loro i rimanenti angoli solidi delle figure proposte. Adunque se la figura solida AG si applichi alla figura solida KQ, in modo, che la linea retta AB combaci colla KL; dovrà la figura piana AC combaciare coll'altra KM, che gli è uguale, e simile. e perciò le linee rette AD, DC, CB combaceranno colle KN, NM, ML; i punti A, D, C, B cadranno ne' punti K, N, M, L; e l'angolo solido in A combacerà coll'angolo solido in K. Laonde il piano AF combacerà col piano KP, e la figura AF colla figura KP, per esser queste uguali, e simili tra di loro. Quindi le linee rette AE, EF, FB combaceranno colle KO, OP, PL; ed i punti E ed F cadranno in O, e P: e similmente si dimostrerà, che la figura AH combaci colla KR; la linea retta DH colla NR; e che il punto H cada in R. Or poichè l'angolo solido in B è uguale a quello in L, si potrà dimostrare nel modo stesso di poc'anzi, che la figura BG combaci colla LQ; la linea retta CG colla MQ; e che il punto G cada in Q. Adunque tutti i piani, e



tutti i lati della figura solida  $AG$  combaciano coi piani, e coi lati dell'altra figura solida  $KQ$ ; e perciò la figura solida  $AG$  sarà uguale, e simile all'altra  $KQ$ .

Quindi sè due figure solide ec.  $C. B. D.$

## PROPOSIZIONE XXIV.

### TEOREMA.

*Se un solido sia contenuto da piani paralleli, gli opposti tra questi saranno parallelogrammi uguali, e simili.*

*fig. 24.* Il solido  $BGEC$  sia contenuto dai piani paralleli  $AC$ ,  $GF$ ;  $BG$ ,  $CE$ ;  $BF$ ,  $AE$ : dico che i suoi piani opposti sieno parallelogrammi uguali, e simili.

Poichè i due piani paralleli  $BG$ ,  $CE$  sono segati dal piano  $AC$ ; saranno anche parallele le loro comuni sezioni  $AB$ ,  $CD$  \*. Similmente essendo paralleli i piani  $BF$ ,  $AE$ , le intersezioni loro  $BC$ ,  $AD$  col piano  $AC$  dovranno pure essere parallele; quindi la figura quadrilatera  $ABCD$  è un parallelogrammo. E nel modo stesso si dimostrerà, ch'è un parallelogrammo ciascuna delle altre figure  $AH$ ,  $HE$ ,  $EC$ ,  $DG$ ,  $CH$ . Ciò posto si congiungano le  $AH$ ,  $DF$ : è poichè  $AB$  è parallela a  $DC$ , e  $BH$  a  $CF$ ; i due angoli  $ABH$ ,  $DCF$  avendo paralleli i loro lati, dovranno essere uguali \*; e quindi i due triangoli  $ABH$ ,  $DCF$  avendo i lati intorno agli angoli uguali in  $B$ , ed in  $C$  rispettivamente ugua-

21; avranno la base  $AH$  uguale alla base  $DF$ , e sarà pure il triangolo  $ABH$  uguale al triangolo  $DCF$ . Quindi il doppio del primo triangolo, cioè il parallelogrammo  $ABHG$ , sarà uguale e simile all'altro parallelogrammo  $DCFE$ , ch'è doppio dell'altro triangolo. Similmente si dimostrerà che il parallelogrammo  $DB$  sia uguale e simile all'altro  $EH$ , e che  $CH$  lo sia a  $DG$ .

Dunque se un solido ec. C. B. D.

## PROPOSIZIONE XXV.

### TEOREMA.

*Se un solido parallelepipedo si seghi con un piano parallelo a' piani opposti; sarà come la base alla base, così il solido al solido.*

N. B. Euclide chiama specialmente *parallelepipedo* quel solido ch'è terminato da sei piani, gli opposti de' quali sono paralleli, e che perciò sono parallelogrammi \*.

•• 24. XI.

Sia il solido parallelepipedo  $ABDC$  segato dal piano  $FG$  parallelo ai piani opposti  $AR$ ,  $HD$ : dico che stia la base  $AF$  alla base  $FH$ , come il solido  $ABEF$  al solido  $EGDC$ .

Imperocchè si prolunghi  $AH$  dall'una parte e dall'altra, e si pongano uguali alla  $EH$  quante si vogliano  $HM$ ,  $MN$ ; uguali poi alla  $EA$  quante altre si vogliano  $AK$ ,  $KL$ , e si compiscano i parallelogrammi  $LO$ ,  $KY$ ,  $HQ$ ,  $MS$ , ed i solidi  $LP$ .

- KR, HV, MT. E poichè le linee rette LK, KA, AE sono uguali tra di loro, i parallelogrammi LO, KY, AF saranno anche tra di loro uguali. Similmente sono tra loro uguali i parallelogrammi KX, KB, AG; come pure tra loro
- \* 24. XI. uguali sono gli altri parallelogrammi LZ, KP, AR, che sono opposti \*. E similmente si dimostra che non solo sieno tra loro uguali i parallelogrammi EC, HQ, MS; ma che lo sien pure tra loro gli altri parallelogrammi HG, HI, IN; e finalmente che anche i parallelogrammi HD, MV, NT sieno tra loro uguali. Dunque tre piani del solido LP sono uguali e simili a tre piani del solido KR, ed a tre piani del solido AV ciascuno a ciascuno. Ma i rimanenti tre che sono opposti a questi, sono uguali e simili rispettivamente ad essi; e quindi tra loro: e ciascun angolo solido di tali figure solide è contenuto da tre angoli piani. Dunque i tre solidi
- \* B. XI. LP, KR, AU saranno tra di loro uguali \*. Per la stessa ragione anche i tre solidi ED, HV, MT sono uguali tra loro: e perciò quanto è multiplice la base LF della base AF, tant' è multiplice il solido LU del solido AU. Così anche si dimostra che quant' è multiplice la base NF della base HF altrettanto il solido NU l' è del solido ED. Or se la base LF è uguale alla base NF, il solido LU è uguale al solido NU \*; se la base LF supera l'altra NF, il solido LU supererà il solido NU; e se minore, minore. Laonde avendo quattro grandezze, cioè le due basi AF, FH, ed i due solidi AU, ED; ed essendosi presi della base AF e del solido AU qualunque ugualmente moltiplici, cioè la base

LF, ed il solido LU; come anche della base FH e del solido ED essendosene presi altri ugualmente multipli qualunque, cioè la base FN, ed il solido NU: si è dimostrato che se la base LF supera la base FN, anche il solido LU superi l'altro NU; se uguale, uguale; e se minore, minore: perciò come la base AF alla base FH così sta il solido AU al solido ED.

Per la qual cosa se un solido etc. C. B. D.

## PROPOSIZIONE XXVI.

### PROBLEMA.

*Ad una data linea retta, e ad un punto dato in essa costituire un angolo solido uguale ad un angolo solido dato il qual sia contenuto da tre angoli piani.*

Sia data la linea retta AB, ed in essa il punto A, e sia anche dato l'angolo solido in *a* il quale è contenuto da tre angoli piani *bac*, *bad*, *dac*; fa d'uopo costituire alla data linea retta BA, e nel punto A dato in essa un angolo solido uguale al dato in *a*.

Si prenda in uno de' lati *ad* del dato angolo solido in *a* un punto *d*, dal quale si abbassi la perpendicolare *de* sul piano dell'angolo *bac*, che tra quelli che comprendono l'angolo solido dato è l'opposto alla *ad*; e poi per lo punto dell'incontro *e* si tiri comunque nel piano dell'angolo *bac* la linea retta *bec* che incontri i lati *ak*, *ac* di

— un tal angolo ne' punti  $b$ ,  $c$ . Ciò posto si costituisca al punto dato  $A$  nella linea retta  $AB$  l'angolo  $BAC$  uguale al dato  $bac$ , si taglino le  $BA$ ,  $AC$  rispettivamente uguali alle  $ba$ ,  $ac$ , e si congiunga  $BC$ . E perchè i due triangoli  $BAC$ ,  $bac$  hanno i lati  $BA$ ,  $AC$  uguali ai lati  $ba$ ,  $ac$ , ciascuno a ciascuno, e l'angolo  $BAC$  è pure uguale all'altro  $bac$ ; dovrà essere la base  $BC$  uguale alla base  $bc$ , l'angolo  $ABC$  uguale all'angolo  $abc$ , e l'angolo  $ACB$  all'altro  $acb$ . Ciò posto si tagli dalla  $BC$  la  $BE$  uguale alla  $be$ ; ed elevata dal punto  $E$  la  $ED$  perpendicolare al piano  $ABC$  ed uguale ad  $ed$ , si congiunga  $AD$ : dico che l'angolo solido che si costituisce in  $A$  dai tre angoli piani  $BAC$ ,  $BAD$ ,  $DAC$  sia il cercato:

Si uniscano le  $AE$ ,  $BD$ ;  $ae$ ,  $bd$ . E poichè i triangoli  $ABE$ ,  $abe$  hanno il lato  $AB$  uguale al lato  $ab$ , il lato  $BE$  uguale a  $be$ , e gli angoli  $ABE$ ,  $abe$  compresi da questi lati uguali sono anche uguali; dovranno avere uguali le loro basi  $AE$ ,  $ae$ : e quindi ne' triangoli  $AED$ ,  $aed$  rettangoli in  $E$ ,  $e$ , essendo rispettivamente uguali i lati intorno agli angoli retti in  $E$  ed  $e$ , saranno pure uguali le loro basi  $AD$ ,  $ad$ . E così pure essendo i lati  $BE$ ,  $ED$  intorno all'angolo retto del triangolo  $BED$  uguali rispettivamente ai lati  $be$ ,  $ed$  intorno all'angolo retto dell'altro triangolo  $bed$  saranno uguali le loro basi  $BD$ ,  $bd$ . Laonde i due triangoli  $BAD$ ,  $bad$  avendo i lati  $BA$ ,  $AD$  uguali a' lati  $ba$ ,  $ad$ , ciascuno a ciascuno, e la base  $BD$  uguale alla  $bd$ ; avranno anche l'angolo  $BAD$  uguale all'altro  $bad$ . E nel modo stesso si di-

mostrerà l'angolo DAC uguale all'altro *dac*.  
 Quindi essendosi a' vertici A, *a* de' due angoli  
 piani BAC, *bac* adattate in sublime le linee rette,  
 AD, *ad* che comprendono angoli uguali co' lati BA,  
 AC, *ba*, *ac* di essi angoli BAC, *bac*, cioè BAD a  
*bad*, e DAC a *dac*; gli angoli solidi che si sono in  
 tal modo costituiti ne' punti A, *a* saranno uguali.

E perciò ad una data linea retta, ec. C. B. F.

## PROPOSIZIONE XXVII,

### PROBLEMA,

*Descrivere un parallelepipedo simile e similmente posto ad un altro dato, e che abbia per uno de' suoi lati una data linea retta.*

Sia data la linea retta AB, ed il parallelepipedo CD: fa d' uopo descrivere un parallelepipedo simile e similmente posto al dato CD, e che abbia per uno de' suoi lati la linea retta AB, *fig. 27.*

Si costituisca alla linea retta AB e nel punto A dato in essa un angolo solido uguale all'altro in C del parallelepipedo CD, e tale che sia l'angolo KAB uguale a GCE, l'altro HBK ad FCG, ed il rimanente HAB ad FCE. Di poi si faccia come CE a CG, così BA ad AK, e come GC a CF, così KA ad AH: finalmente si compisca il parallelogrammo BK, ed il solido AL; sarà questo il parallelepipedo cercato.

E poichè EC sta a CG, come BA ad AK; perciò i due parallelogrammi EG, BK

avendo proporzionali i lati intorno agli angoli uguali  $ECG$ ,  $BAK$  saranno simili: e per la stessa ragione è anche il parallelogrammo  $KHI$  simile all'altro  $GF$ , ed il parallelogrammo  $HIB$  simile ad  $FE$ . Quindi tre parallelogrammi del solido  $AL$  sono rispettivamente simili a tre altri parallelogrammi del solido  $CD$ . Ma sono poi questi tre piani in ciascun parallelepipedo uguali e simili agli opposti: e di più gli angoli piani da' quali comprendonsi gli angoli solidi di tali parallelepipedi sono tra loro uguali e similmente disposti; \* A. XI. che perciò essi angoli solidi sono rispettivamente uguali \*. Laonde il solido  $AL$  sarà simile all'altro  $CD$ .  
E quindi alla data linea retta  $AB$  ec.  $C. B. D.$

## PROPOSIZIONE XXVIII.

## TEOREMA.

*Per le diagonali corrispondenti di due piani opposti di un parallelepipedo vi passa un piano, e questo divide un tal solido per metà.*

*fig. 24.* Sia il parallelepipedo  $AF$ , e sieno  $AH$ ,  $DF$  le diagonali dei piani opposti  $BG$ ,  $CE$ , le quali sot-tendono gli uguali angoli di questi parallelogrammi: dico che per esse  $AH$ ,  $DF$  vi passa un piano, e che questo divide il parallelepipedo  $AB$  per metà.

Poichè  $BC$  è parallela ed uguale sì a  $DA$  che ad  $FH$ , sarà  $DA$  uguale e parallela ad  $FH$ : sono poi esse congiunte ne' loro estremi dalle  $AH$ ,  $DF$ ; quindi queste congiungenti saranno ancora uguali

e parallele; perciò esse consisteranno in un piano, e la figura DAHF sarà un parallelogrammo. Ma è poi il parallelogrammo DB simile ed uguale all' altro, EH, come pure il parallelogrammo CH a DG, ed il triangolo ABH al triangolo AGH, e l' altro DCF a DEF. Dunque i due prismi ABHFCD, AGHFED ne' quali resta diviso il parallelepipedo DH dal piano DAHF essendo terminati da piani uguali in numero, ed uguali e simili tra loro, e di più avendo ciascun angolo solido contenuto da tre angoli piani solamente, saranno uguali e simili tra loro\*.

\* B. XI.

Laonde per le diagonali ec. C. B. D.

## PROPOSIZIONE XXIX

### TEOREMA.

*I parallelepipedi i quali hanno la medesima base e l' altezza stessa, ed i di cui lati insistenti alla base vanno a costituirsi nelle stesse linee rette, sono uguali tra loro.*

Nella stessa base AB vi sieno i parallelepipedi *fig. 28.* ugualmente alti AH, AK, i di cui lati AF, AG, LM; LN; CD, CE, BH, BK che insistono alla base comune vadano a costituirsi nelle stesse linee rette FN, DK: dico che il solido AH sia uguale all' altro AK.

Imperocchè essendo un parallelogrammo sì CH che CK, sarà CB uguale sì a DH che ad EK: adunque DH è uguale ad EK; e quindi dovrà esser pure



DE uguale ad HK. Per lo che il triangolo CDE è uguale al triangolo BHK. Ma è poi il parallelogrammo DG uguale al parallelogrammo HN; e per la stessa ragione di poc'anzi il triangolo AFG è uguale al triangolo LMN; ed è il parallelogrammo CF uguale al parallelogrammo BM, ed il parallelogrammo CG all'altro BN; poichè sono opposti. Dunque il prisma contenuto dai due triangoli AFG, CDE, e dai tre parallelogrammi AD, DG, GC è uguale al prisma che si contiene dai due triangoli LMN, BHK, e dai tre parallelogrammi BM, MK, KL. Laonde togliendo dal solido ALBCDFNK il prisma LMNBHK, e poi dallo stesso solido toltone un'altra volta l'altro prisma AFGCDE; sarà il rimanente solido, cioè il parallelepipedo, AH uguale all'altro rimanente solido, cioè al parallelepipedo AK.

Adunque i parallelepipedi ec. C. B. D.

### PROPOSIZIONE XXX.

#### TEOREMA.

*I parallelepipedi che hanno la base stessa e la medesima altezza, sebbene i lati insistenti alla base non vadano a costituirsi nelle stesse linee rette, sono pure uguali tra loro.*

*fig. 29.* Sieno nella stessa base AB i parallelepipedi ugualmente alti BF, AK, ed i loro lati AF, AG, LM, LN, CD, CE, BH, BK non si vadano a costituire nelle stesse linee rette: dico che anche il

solido AH sia uguale all' altro AK .

Si prolunghino le FD , MH , e le NG , KE finchè convengano ne' punti O , P , Q , R ; e si uniscano le AO , LP , BQ , CR . E poichè il piano LBHM è parallelo all' opposto ACDF ; e che il piano LBHM è quello in cui esistono le parallele LB , MHPQ , e quindi la figura BLPQ : e l' altro piano ACDF è quello nel quale si trovano le parallele AC , FDOR , e quindi anche la figura CAOR ; sarauno perciò le figure BLPQ , CAOR in piani paralleli tra loro . E nel modo stesso , essendo il piano ALNG parallelo al piano opposto CBKE ; ed il piano ALNG quello in cui esistono le parallele AL , OPGN , e quindi la figura ALPO ; il piano poi CBKE quell' altro nel quale sono le parallele CB , RQEK , e quindi la figura CBQR ; anche le figure ALPO , CBQR saranno in piani tra loro paralleli . Ma sono anche paralleli tra loro i piani ACBL , ORQP ; per conseguenza il solido AQ è un parallelepipedo . Ma il parallelepipedo AH è uguale al parallelepipedo AQ ; poichè sono sopra la stessa base , ugualmente alti , ed hanno le linee rette AF , AO , CD , CR ; LM , LP , BH , BQ insistenti alla base che vanno a costituirsi nelle stesse linee rette FR , MQ : ed è poi lo stesso solido AQ uguale all' altro AK ; perchè anch' essi hanno la medesima base ACBL , sono ugualmente alti , e le linee rette AO , AG , LP , LN ; CR , CE , BL , BQ che insistono alla base vanno a costituirsi nelle stesse linee rette ON , RK . Dunque il parallelepipedo AH sarà uguale all' altro AK .

Laonde i parallelepipedi ec. C, B, D.

COR. Quindi se nel parallelepipedo AH i lati FA, DC, HB, ML insistenti alla base AB sieno a questa inclinati: dai punti A, C, B, L si elevino ad essa le perpendicolari AO, CR, BQ, LP, le quali incontrino in piano FH opposto ad essa base AB ne' punti O, R, Q, P, e si uniscano le OR, RQ, QP, PO. E poichè le AO, LP sono perpendicolari allo stesso piano ACBL, sono an-

- \* 6. XI. che parallele \*: ma è pure AC parallela ad LB; quindi il piano CAON, che passa per le AC, AO sarà parallelo all' altro piano BLPQ che passa per le LB, LN. Similmente si dimostra essere il piano CQ parallelo all'altro AP; ed i piani AB, OQ sono già paralleli. Dunque il solido AP è un parallelepipedo, ed è uguale all' altro, LD \*. E perciò.

*Ogni parallelepipedo i di cui lati insistenti alla base sieno a questa obliqui è uguale a quel parallelepipedo ugualmente alto, che ha la stessa base, ed i lati insistenti alla base perpendicolari ad essa.*

## PROPOSIZIONE XXXI.

### TEOREMA.

*I parallelepipedi che hanno basi uguali e la stessa altezza sono uguali tra loro.*

- fig. 30. Sieno i parallelepipedi LK, LP posti nelle uguali basi AB, CD, e che abbiano la stessa altezza: dico che il solido LK sia uguale all' altro LP.

In primo luogo si supponga che i lati di questi tali solidi che insistono alle basi  $AB$ ,  $CD$  sieno perpendicolari ad esse; e si dispongano i solidi in tal modo, che le basi si trovino in un medesimo piano, ed i lati  $CL$ ,  $LA$  di questo stieno per dritto; dovrà la linea retta  $LM$ , che insiste ad esse basi nel punto  $L$  esser comune ai due solidi  $LK$ ,  $LP$ . Sieno inoltre  $AG$ ,  $HK$ ,  $BE$ ;  $DF$ ,  $OP$ ,  $CN$  que' rimanenti lati de' due parallelepipedo che insistono alle basi; e se mai l'angolo  $BLA$  non è uguale all' altro  $DLC$ , si prolunghino le  $BL$ ,  $OD$  finchè s' incontrino in  $I$ , e per  $C$  si tiri  $QCR$  parallela a  $BLI$ , che prolungata incontri in  $R$  la  $HB$  anche prolungata. Finalmente si compiscano i solidi  $LS$ ,  $LT$ . Ciò posto il solido  $LT$  il quale ha per base il parallelogrammo  $LN$ , e per piano opposto a questa l'altro parallelogrammo  $IT$  è uguale al solido  $LP$ , la cui base è lo stesso parallelogrammo  $LN$ , e  $DP$  è il piano opposto; poichè essi hanno anche la medesima altezza, ed i loro lati  $MV$ ,  $MF$ ,  $NT$ ,  $NP$ ;  $LI$ ,  $LD$ ,  $CQ$ ,  $CO$  insistenti alla comune base cadono nelle stesse linee rette parallele  $PV$ ,  $OI$ \*. Or il pa- \* 29.XI.  
rallelogrammo  $CD$  è uguale al parallelogrammo  $CI$ , perchè sono posti sopra la stessa base  $LC$ , e tra le medesime parallele  $LC$ ,  $OI$ ; ed il parallelogrammo  $DC$  si è supposto uguale all' altro  $AB$ ; quindi sarà il parallelogrammo  $IC$  uguale ad esso  $AB$ ; e perciò questi due parallelogrammi  $IC$ ,  $AB$  serberanno uguali ragioni al terzo parallelogrammo  $LR$ , cioè sarà  $IC$  ad  $LR$ , come  $AB$  ad  $LR$ . Ma  $IC$  sta ad  $LR$  come il parallelepipedo  $IN$  all' altro  $LS$ ; poichè l' intero parallelepipedo  $IS$  si è diviso col

\* 25. XI. piano MLCN parallelo a' piani opposti IT, ES \*. E similmente essendosi il parallelepipedo AS diviso col piano LBEM parallelo a' piani opposti AK, CS sta il parallelepipedo LK all' altro LS, come la base AB all' altra LR. Quindi sta il parallelepipedo IN al parallelepipedo LS, come l' altro LK allo stesso LS: e perciò i due parallelepipedi IN ed LK sono uguali. Ma il parallelepipedo IN si è dimostrato uguale all' altro IP; laonde sarà anche questo parallelepipedo OM uguale all' altro LK.

Che se i lati insistenti alle basi de' due parallelepipedi proposti si suppongano ad esse obliqui: siccome ciascun di questi parallelepipedi prereggia quell' altro ch' è ugualmente alto, è posto sulla stessa base, ed ha i lati insistenti a questa \* 30. XI. perpendicolari ad essa\*; e che tali solidi si sono poc' anzi dimostrati uguali: perciò anche i proposti saranno tra loro uguali.

Adunque i parallelepipedi etc. C. B. D.

## PROPOSIZIONE XXXII.

### TEOREMA.

*I parallelepipedi della medesima altezza hanno tra loro la stessa ragione delle basi.*

fig. 31. Sieno AB, CD i parallelepipedi proposti della stessa altezza: dico che stia l' un solido all' altro, come la base AE all' altra CF.

Si applichi al lato FG della base di uno di essi

solidi CF un parallelogrammo FH uguale all' altro AE, in modo che l' angolo FGH sia uguale all' angolo LCG; e poi si compia il parallelepipedo GK, la di cui base sia FH, ed una delle linee rette ad essa insistenti sia FD: sarà un tal solido GK uguale al proposto AB; poichè sono posti nelle uguali basi AE, FH, e sono ugualmente alti \*. \* 31. XI. Ed essendo tutto il parallelepipedo CK diviso dal piano GD parallelo a' suoi piani opposti CP, HK, dovrà stare il solido GK, o il suo uguale AB, all' altro CD, come la base FH, o l' altra uguale AE, alla base CF.

E perciò i parallelepìpedi ec. C. B. D. .

### PROPOSIZIONE XXXIII.

#### TEOREMA.

*I parallelepìpedi simili sono tra loro in ragion triplicata de' lati omologhi.*

Sieno i parallelepìpedi simili AB, CD, e sia il fig. 32. lato AE dell' uno omologo al lato CF dell' altro: dico che il solido AB stia all' altro CD in triplicata ragione di AE a CF.

Imperocchè si prolunghino i lati AE, GE, HE in K L, ed M, e si ponga EK uguale a CF, EL ad FN, ed EM ad FR; poi si compia il parallelogrammo KL, ed il solido KO. E poichè le due KE, EL sono uguali rispettivamente alle CF, FN, e l' angolo KEL è uguale all' angolo NFC, mentre il primo di essi

- è uguale all'angolo GEA con cui sta al vertice, e l'altro è pure uguale a questo stesso angolo GEA per  
 \*d. 10. XI. la similitudine de' solidi AB, CD\*; sarà quindi il parallelogrammo KL uguale e simile all'altro CN: e dimostrandosi similmente che il parallelogrammo KM sia uguale e simile all'altro CR, ed il parallelogrammo LM all'altro FD; saranno tre parallelogrammi del solido KO uguali e simili, ciascuno a ciascuno, a tre altri del solido CD. Ma i tre rimanenti opposti a questi sono anche uguali e simili rispettivamente ad essi; perciò il solido KO è uguale  
 \* B. XI. e simile all'altro CD\*. Ciò posto, compiasi l'altro parallelogrammo GK, e poi sulle basi GK, LK si costituiscano i solidi EX ed LP della stessa altezza che il proposto AB, ed in modo, che la linea EH sia un loro lato comune. E poichè per la similitudine de' solidi AB, CD, e permutando sta AE a CF, come EG ad FN e come EH ad FR; ed FC è uguale ad EK, FN ad EL, ed FR ad EM; sarà perciò come AE ad EK, così EG ad EL, ed HE ad EM. Ma come AE ad EK, così sta il parallelogrammo AG all'altro GK; come GE ad EL, così sta GK a KL; e come HE ad EM, così è pure PE a KM. Dunque come il parallelogrammo AG all'altro GK, così sta GK a KL e PE a KM. Ma come AG ad GK, così sta il parallelepipedo AB all'altro EX\*; come GK a KL, così sta il parallelepipedo EX all'altro LP; e come PE a KM, così sta il parallelepipedo PL all'altro KO. Laonde come il solido AB al solido EX così starà questo stesso EX al terzo LP; ed il terzo LP al

quarto OK. Or se ci sono quattro grandezze in continua proporzione; la prima si dice avere alla quarta triplicata ragione di quella che ha alla seconda \*; dunque il solido AB serberà al solido KO, o al suo uguale CD, triplicata ragione dello stesso AB ad EX. Ma la ragione del solido AB all' altro EX, poc' anzi si è mostrato pareggiar quella di AE ad EK; quindi il solido AB starà all' altro CD in triplicata ragione del lato AE del primo al suo omologo CE dell' altro. C. B. D.

COR. Da ciò è manifesto, che se vi sieno quattro linee rette continuamente proporzionali, la prima di esse starà alla quarta, come il parallelepipedo che ha per lato la prima all' altro simile e similmente posto che ha per lato omologo la seconda. Imperocchè la prima sta alla quarta in triplicata ragione della prima alla seconda.

### PROPOSIZIONE XXXIV.

#### TEOREMA.

*I parallelepipedi che sono contenuti da paral-  
lelogrammi equiangoli tra loro, ciascuno a ciascu-  
no, cioè quelli i di cui angoli solidi sono tra loro u-  
guali, sono tra loro in ragion composta dalle ra-  
gioni de' lati intorno a questi angoli.*

Sieno i parallelepipedi AB, CD de' quali AB è contenuto da' parallelogrammi AE, AF, AG, che sono equiangoli, ciascuno a ciascuno, ai pa-



rallelogrammi  $KL$ ,  $HL$ ,  $HK$  da' quali è contenuto il solido  $CD$ : dico che la ragione che ha il solido  $AB$  al solido  $CD$  sia composta dalle ragioni di  $AM$  a  $DL$ , di  $AN$  a  $DK$ , e di  $AO$  a  $DH$ .

Si prolunghino le  $MA$ ,  $NA$ ,  $OA$  in  $P$ ,  $Q$ ,  $R$ , in modo tale che  $AP$  sia uguale a  $DL$ ,  $AQ$  a  $DK$  ed  $AR$  a  $DH$ ; e poi si compia il parallelepipedo  $AX$  contenuto dai parallelogrammi  $AS$ ,  $AT$ ,  $AV$  uguali e simili, ciascuno a ciascuno, agli altri parallelogrammi  $KL$ ,  $HL$ ,  $HK$ ; che perciò un tal solido

\* B. XI.  $AX$  è uguale e simile al solido  $CD$ \*. Si compisca anche il solido  $AY$  la di cui base è  $AS$ , ed  $AO$  è una delle linee rette insistenti alla base: indi si esponga una qualunque linea retta  $a$ , e si faccia come  $AM$  ad  $AP$ , così  $a$  ad un'altra linea retta  $b$ , come  $NA$  ad  $AQ$ , così  $b$  a  $c$ , e come  $OA$  ad  $AR$ , così  $c$  a  $d$ . E poichè il parallelogrammo  $AE$  è equiangolo all'altro  $AS$ , sarà  $AE$  ad  $AS$ , co-

\* 23. VI. me  $a$  a  $c$ \*. Ma i solidi  $AB$ ,  $AY$  essendo costituiti tra gli stessi piani paralleli  $BOY$ ,  $EAS$ , e perciò avendo la stessa altezza, sono l'uno all'altro come la base  $AE$  alla base  $AS$ , cioè come  $a$  a  $c$ . Ed il solido  $AY$  sta al solido  $AX$ , come la base

\* 25. XI.  $OQ$  alla base  $QR$ \*, cioè come  $OA$  ad  $AR$ , o sia come  $c$  a  $d$ . Per la qual cosa essendo il solido  $AB$  al solido  $AY$  come la retta  $a$  all'altra  $c$ , ed il solido  $AY$  al solido  $AX$ , come  $c$  a  $d$ , sarà per equalità il solido  $AB$  al solido  $AX$ , o sia  $CD$ , come  $a$  a  $d$ . Ma la ragione di  $a$  a  $d$  è composta dalle ragioni di  $a$  a  $b$ , di  $b$  a  $c$ , e di  $c$  a  $d$ , le quali sono le stesse, ciascuna a ciascuna, colle ragioni di  $MA$  ad  $AP$ , di  $NA$  ad  $AQ$  e di  $OA$  ad  $AR$ , ed

i lati  $AP$ ,  $AQ$ ,  $AR$  sono uguali ai lati  $DL$ ,  $DK$ ,  $DH$ , ciascuno a ciascuno. Dunque il solido  $AB$  sta al solido  $CD$  in ragion composta dalle ragioni dei lati intorno agli angoli uguali: cioè di  $AM$  a  $DL$ , di  $AN$  a  $DK$ , e di  $AO$  a  $DH$ .

E perciò i parallelepipedi ec.  $C$ .  $B$ .  $D$ .

### PROPOSIZIONE XXXIV.

#### TEOREMA.

*Le basi de' parallelepipedi uguali si reciprocano colle altezze: e sono uguali que' parallelepipedi che hanno le basi reciproche alle altezze.*

Sieno i parallelepipedi uguali  $AB$ ,  $CD$ : dico che *fig. 34.* le di loro basi sieno reciproche alle altezze, cioè che stia come la base  $AL$  alla base  $CQ$ , così l'altezza del solido  $CD$  a quella dell' altro  $AB$ .

Sieno primieramente i loro lati  $AG$ ,  $EF$ ,  $LB$ ,  $HK$ ;  $CM$ ,  $NX$ ,  $OD$ ,  $PR$  che insistono alle basi  $AL$ ,  $CO$ , perpendicolari a queste; e si supponga di più che tali basi non sieno uguali; poichè nel caso che esse fossero uguali, per l'uguaglianza de' parallelepipedi, anche le altezze  $AG$ ,  $CM$  si dovrebbero pareggiare, e quindi se ne potrebbe conchiudere  $AL$  a  $CO$ , come  $CM$  ad  $AG$ . Adunque sia  $AL$  la maggiore di esse; è chiaro che essendo il parallelepipedo  $CD$  uguale all'altro  $AB$ , e la base di questo minore della base di quello, debba la sua altezza  $CM$  esser maggiore di  $AG$  altezza dell' altro. Si tagli perciò dalla  $CM$  la  $CT$  uguale alla

- AG, e si compisca il solido CQ: serberà a questo ugual ragione ciascun de' dati, perchè uguali; e quindi starà AB a CQ, come CD a CQ. Ma sta il solido AB all' altro CQ, come la base AL alla
- \* 32. XI. base CO; poichè essi sono ugualmente alti \*: ed è poi il solido CD allo stesso CQ, come la base
- \* 25. XI. PM alla base PT \*, cioè come CM a CT, o ad AG; dunque starà AL a CO, come CM ad AG. E perciò le basi de' parallelepipedi AB, CD si reciprocano colle altezze.

Sieno ora le basi de' proposti parallelepipedi AB, CD reciprocamente proporzionali alle altezze; cioè sia la base AL alla base CO, come l'altezza CM del solido CD all'altezza AG del solido AB: dico che il solido AB sia uguale all' altro CD.

- Poichè essendo AL a CO, come CM ad AG, è chiaro che se le basi AL e CO sono uguali, debbano anche pareggiarsi le altezze CM ed AG, ed esser quindi uguali i parallelepipedi proposti \*. Che
- \* 31. XI. se poi si supponga essere AL maggiore di CO; dovendo per conseguenza anche CM superare AG, si tagli da CM la CT uguale ad AG, e si compisca il solido CQ. E poichè sta il solido AB all' altro CQ, come la base AL alla base CO \*; ed è
- \* 32. XI. poi l' altro solido CD allo stesso CQ, come la base PM alla base PT \*, e quindi come CM a
- \* 25. XI. CT, o ad AG: le prime ragioni di queste due proporzioni saranno uguali del pari che le seconde; e sarà perciò AB a CQ, come CD a CQ: laonde i solidi AB e CD serbando ragioni uguali allo stesso solido CQ, saranno uguali.

Che se poi quei lati de' parallelepipedi proposti

che insistono alle basi non sieno a queste perpendicolari: siccome tali parallelepipedi ne pareggiano rispettivamente due altri, che hanno con essi le stesse basi, le medesime altezze, ed i lati insistenti alle basi perpendicolari ad esse \*; \*c.30.XI. ne segue che siccome si è dimostrato per questi secondi, che essendo essi uguali, le loro basi sieno reciprocamente proporzionali alle altezze; e che al contrario se le basi sieno reciprocamente proporzionali alle altezze, tali solidi sieno uguali; lo stesso debba anche verificarsi pe' primi, cioè per quelli i di cui lati insistenti alle basi, gli sono obbliqui.

E perciò i parallelepipedi ec. C. B. D.

N. B. Ciò che si dimostra da Euclide nella Proposizione 35 e nel suo Corollario, si è da noi recato nel Corollario della Proposizione A di questo Libro. (Vegg. le NOTE).

## PROPOSIZIONE XXXVI.

### TEOREMA.

*Se da tre linee rette proporzionali si formi un parallelepipedo, sarà questo solido uguale all' altro equiangolo ad esso. che si faccia dalla media, e ch' è perciò equilatero.*

Sieno A, B, C tre linee rette proporzionali, cioè *fig. 35.* stia A a B, come B a C; dico che il parallelepipedo che si forma da esse A, B, C sia uguale al paral-  
\*

— lelepipedo equiangolo al primo, che si forma da B, è ch'è perciò equilatero.

Si esponga l'angolo solido in L contenuto dai tre angoli piani MLN, MLX, XLN, e prese ne' suoi lati le parti LM, LX ed LN uguali rispettivamente alle tre linee rette date A, B, C, si compia il parallelepipedo LH; e poi ad una linea retta FE uguale alla B, in un suo estremo. E, si costituisca un angolo solido uguale all'al-

\* 26. XI. tro ch'è in L \*, e prese negli altri due lati di questo angolo le parti EG, ED uguali alla EF, si compia l'altro parallelepipedo EK.

E poichè A sta a B, come B a C; starà pure ML ad FE, come ED ad LN: e perciò i parallelogrammi MN, FD che hanno, per costruzione, uguali gli angoli in L ed E, avendo reciprocamente proporzionali i lati intorno a questi angoli, saranno uguali. Or essendosi adattate a' vertici L ed E de' due angoli piani uguali MLN, FED, le due linee rette sublimi ed uguali LX ed EG, le quali comprendono colle LM, LN; FE, ED angoli uguali, ciascuno a ciascuno, e similmente posti; le perpendicolari che da' punti X e G si abbassano su i piani MN ed FD debbono esse-

\* c. A. XI. re uguali \*. Dunque i parallelepipedi LH ed EK costituiti dalle tre linee rette A, B, C nel modo già detto, avendo uguali le loro basi MN ed FD,

\* 31. XI. ed uguali anche le loro altezze, saranno uguali \*.

E perciò se da tre linee proporzionali ec. C.B.D.

## PROPOSIZIONE XXXVII.

## TEOREMA.

*\* Se quattro linee rette sono proporzionali; i parallelepipedi simili e similmente posti che da esse descrivonsi, saranno anche proporzionali. E se i parallelepipedi simili e similmente posti che descrivonsi da quattro linee rette sono proporzionali; anch'esse linee rette saranno proporzionali.*

Sieno  $AB$ ,  $CD$ ,  $EF$ ,  $GH$  quattro linee rette *fig. 36.* proporzionali, cioè stia  $AB$  a  $CD$ , come  $EF$  a  $GH$ , e si descrivano dalle due  $AB$ ,  $CD$  i parallelepipedi simili e similmente posti  $AK$ ,  $CL$ ; e dalle altre due  $EF$ ,  $GH$  gli altri parallelepipedi anche simili e similmente posti  $EM$ ,  $GN$ : dico che stia il parallelepipedo  $AK$  all'altro  $CL$ , come il parallelepipedo  $EM$  all'altro  $GN$ .

Si facciano continuamente proporzionali le  $AB$ ,  $CD$ ,  $O$  e  $P$ ; come pure le  $EF$ ,  $GH$ ,  $Q$  ed  $R$ . E poichè  $AB$  sta a  $CD$  come  $EF$  a  $GH$ ; sarà anche  $CD$  ad  $O$ , come  $GH$  a  $Q$ ; ed  $O$  a  $P$ , come  $Q$  ad  $R$ : quindi le tre grandezze  $AB$ ,  $CD$ ,  $O$  saranno in ordinata ragione colle altre tre  $EF$ ,  $GH$ ,  $Q$ ; e perciò essendo  $AB$  ad  $O$ , come  $EF$  a  $Q$ , di nuovo le tre grandezze  $AB$ ,  $O$ , e  $P$  saranno in ordinata ragione colle altre tre  $EF$ ,  $Q$  ed  $R$ : e quindi starà  $AB$  a  $P$ , come  $EF$  ad  $R$ . Ma come  $AB$  a  $P$ , così sta il solido  $AK$  all'altro  $CL$ \*; e come  $EF$  ad  $R$ , così è pure il solido  $EM$  al solido  $GN$ : adunque come il solido \*c.33.XI.

AK al solido CL, così sta il solido EM al solido GN.

Sia adesso il solido AK al solido CL, come il solido EM al solido GN: dico che stia anche la linea retta AB all'altra CD, come la EF alla GH.

Imperocchè si faccia come AB a CD, così EF ad ST; e poi si descriva dalla ST un parallelepipedo simile e similmente posto ad EM, o pure a GN\*.

E poichè come AB a CD, così sta EF ad ST, e si sono descritti dalle AB, CD i parallelepipedi AK, CL simili e similmente posti; come pure dalle EF, ST gli altri EM, SV anche simili e similmente posti; sarà quindi AK a CL, come EM ad SV. Ma si è supposto essere AK a CL, come EM a GN; laonde il solido GN è uguale al solido SV: gli è anche simile e similmente posto; perciò i piani da' quali essi sono contenuti sono uguali e simili; e quindi saranno uguali i loro lati omologhi GH, ST. Per lo che essendo AB a CD, come EF ad ST, ed ST uguale a GH; sarà AB a CD, come EF a GH.

Adunque se quattro linee rette cc. C. B. D.

## PROPOSIZIONE XXXVIII.

## TEOREMA.

*Se un piano sia perpendicolare ad un altro ,  
e da un punto preso in un de' piani , si abbassi  
la perpendicolare sull' altro ; questa cadrà nella  
loro comune sezione ,*

Sia il piano CD perpendicolare all'altro AB, ed *fig. 37.*  
AD sia la loro comune sezione, e da un qualun-  
que punto E preso nel piano CD si abbassi sul  
piano AB la perpendicolare: dico che questa deb-  
ba cadere nella AD .

S' è possibile cada fuori della AD , come la  
EF, ed incontri in F il piano AB: dal pun-  
to F ch' è nel piano AB si abbassi sulla AD la  
perpendicolare FG , la quale sarà anche per-  
pendicolare al piano CD \*, e si unisca EG. E d. 4. XI.  
poichè la FG è perpendicolare al piano CD , ed  
è toccata nel punto G dalla EG, che si trova in  
questo piano; perciò l'angolo FGE sarà retto .  
Ma la EF è perpendicolare al piano AB, e quindi  
è anche retto l'angolo EFG . Laonde nel trian-  
golo EFG vi sarebbero due angoli retti ; il che  
è assurdo . Adunque la perpendicolare abbassata  
dal punto E sul piano AB non cadrà al di fuori  
della AD ; ma bensì in questa .

E perciò se un piano ec. C. B. D.

N. B. Per la Prop. XXXIX, che si è da noi tra-  
lasciata, veggasi la Nota ad essa .



## PROPOSIZIONE XL.

## TEOREMA.

*Se vi sieno due prismi triangolari ugualmente alti, uno de' quali abbia per base un parallelogrammo e l'altro un triangolo, e quel parallelogrammo sia doppio di questo triangolo; essi prismi saranno uguali.*

**Fig. 38.** Sieno ABECDF, GHKLMN due prismi triangolari ugualmente alti, il primo de' quali è contenuto dai due triangoli ABE, CDF, e dai tre parallelogrammi AD, DE, EC; e l'altro contenuti dai due triangoli GHK, LMN, e dai tre parallelogrammi LH, HN, NG; e di più per lo primo di essi si prenda per base il parallelogrammo AF, e per l'altro il triangolo GHK, e quel parallelogrammo sia doppio di questo triangolo: dico che il prisma ABECDF sia uguale al prisma GHKLMN.

Si compiscano i solidi AX, GO. E poichè il parallelogrammo AF è doppio del triangolo GHK, e che di questo triangolo n'è anche doppio il parallelogrammo HK; sarà il parallelogrammo AF uguale al parallelogrammo HK. Laonde i due parallelepipedi ED, GO avendo basi uguali AF, HK e la medesima altezza, saranno uguali; e perciò dovranno anche essere uguali i prismi proposti ABECDF, HGKNLM, che sono rispettivamente

\* 28.XI. la metà di que' parallelepipedi\*.

Quindi se vi sieno due prismi ec. C. B. D.  
FINE DELL' XI. LIBRO.

## IL DUODECIMO LIBRO

DEGLI

ELEMENTI DI EUCLIDE,



## LEMMA I.

**S**E vi sieno due grandezze disuguali, e si tolga dalla maggiore più che la metà, poi dal residuo si tolga anche più che la metà, e così continuamente si faccia; vi dovrà finalmente rimanere una grandezza che sarà più piccola della minore delle proposte.

Sieno le due grandezze disuguali  $AB, C$ , delle quali  $AB$  sia la maggiore: dico che se si tolga da  $AB$  più che la metà, e dal residuo si tolga anche più che la metà, e ciò si continui sempre a fare; vi dovrà finalmente rimanere una grandezza minore di  $C$ . Fig. 39.

Imperocchè essendo  $C$  omogenea ad  $AB$ , presa più volte dovrà superarla. Sia dunque  $ED$  quel multiplo di  $C$  ch'è il primo a superare  $BA$ , ed esso sia diviso nelle parti  $EG, GF, FD$  ciascuna uguale a  $C$ ; e poi si tolga da  $BA$  più che

la metà  $BH$ , dal residuo  $HA$  più che la metà  $HK$ , e ciò si continui a fare finchè  $BA$  resti divisa nello stesso numero di parti della  $ED$ . Ciò fatto, essendo  $ED$  maggiore di  $BA$ , se da  $ED$  si tolga  $EG$  ch'è meno della metà di essa, e da  $BA$  se ne tolga più che la metà  $BH$ ; dovrà il residuo  $GD$  esser maggiore dell'altro  $HA$ : e similmente togliendo da  $GD$  la sua metà  $GF$ , e da  $HA$  più che la metà sua  $HK$ ; dovrà il residuo  $FD$  esser maggiore di  $KA$ . Ma  $FD$  è uguale a  $C$ ; dunque  $C$  sarà maggiore di  $KA$ . C. B. D.

## L E M M A II.

*Dati due cerchi concentrici, iscrivere nel maggiore un poligono di lati uguali, ed in numero pare, il qual non tocchi il cerchio minore.*

*fig. 40.* Sieno  $ABDC$ ,  $abd$  i due cerchi proposti, che sian descritti intorno al comune centro  $O$ : bisogna iscrivere nel maggiore di essi  $ABDC$  un poligono di lati uguali ed in numero pare, il qual non tocchi il cerchio minore  $abd$ .

Per lo centro comune  $O$  si tiri la linea retta  $BD$ , e poi dal suo estremo  $D$  si tiri al cerchio  $bad$  la tangente  $DaA$ : indi si divida continuamente per metà la semicirconferenza  $BAD$ , si dovrà finalmente pervenire ad un arco minore dell'altro \*11 .XII.  $ACD$  \*; suppongasi esser questo  $CD$ , e si congiunga la linea retta  $CD$ , sarà questa il lato del poligono cercato.

Imperocchè essendo l'arco  $DCA$  maggiore dell'ar-

co CD, la corda DC di questo dovrà cadere al di là della corda AD di quello, per rispetto, alla circonferenza *bad*; e quindi siccome la linea retta DA tocca il cerchio *bad*, l'altra BD non dovrà nemmeno toccarla. E perciò se si vada adattando successivamente nel cerchio ABCD questa DC, si verrà a descrivere in esso un poligono di lati uguali, ed in numero pare, che non toccherà il cerchio minore *abd*. C. B. F.

COR. Che se fossero dati i due archi di cerchio DCE, *dae* descritti intorno al comune centro O, e si volesse dividere l'esteriore di essi DCE in tal numero di parti uguali, sicchè alcuna delle linee rette tirate per due punti prossimi di tali divisioni non potesse toccare l'altro arco *dae*. È chiaro che si otterrebbe ciò che si dimanda tirando per un estremo D dell'arco DE la tangente DaA all'altro arco *dae*, o al cerchio della di cui circonferenza quest'arco n'è parte, e poi dividendo sempre per metà l'arco DE, finche si giunga ad un arco DC minore di DA.

## PROPOSIZIONE I.

### TEOREMA.

*I poligoni simili iscritti ne' cerchi sono tra loro come i quadrati de' diametri.*

Sieno i cerchi ABCDE, FGHLK, ed in es- *fig. 41.*  
si ci sieno iscritti i poligoni simili ABCDE,  
FGHLK: dico che stia il quadrato di BM a

quello di GN, come il poligono ABCDE all'altro FGHL.

Si congiungano le BE, AM; GL, FN. E perchè il poligono ABCDE è simile al poligono FGHL; sarà anche il triangolo BAE simile al

- \* 20. VI. triangolo GFL \*: e perciò l'angolo BEA uguale all'altro GLF. Or i due angoli BEA, GLF pareggiano rispettivamente gli altri BMA, GNF; dunque saranno anche tra loro uguali questi due altri angoli BMA, GNF: e perciò i due triangoli BAM, GFN rettangoli in A ed F avendo anche uguali gli angoli AMB, FNG saranno simili; e starà BA a GF, come BM a GN, ed il quadrato di BA a quello di GF, come il quadrato di BM all'altro di GN. Ma il quadrato di BA sta all'altro di GF, come il poligono ABCDE all'altro FGHL; perchè si quei quadrati, che questi poligoni sono tra loro in duplicata ragione di BA a GF\*; dunque starà pure quel poligono a questo come il quadrato di BM a quello di GN.

È perciò i poligoni simili ec. C. B. D.

## PROPOSIZIONE II.

### TEOREMA.

*I cerchi sono tra loro come i quadrati de' diametri.*

- fig. 42. Sieno i cerchi ABCD, EFGH, e BD, FH i loro diametri: dico che il quadrato di BD sta

al quadrato di  $FH$ , come il cerchio  $ABCD$  al cerchio  $EFGH$ .

Imperocchè se ciò non è, il quadrato di  $BD$  avrà a quello di  $FH$  la stessa ragione del cerchio  $ABCD$  ad un' altro cerchio minore di  $EFGH$ , o pur maggiore. L'abbia primieramente ad un minore che sia  $efgh$ , e s'intenda esser questo descritto intorno allo stesso centro dell' altro  $EFGH$ . Ciò posto s'isciva nel cerchio maggiore  $EFGH$  un poligono  $ENFPG$  ec. di lati uguali ed in numero pare, il quale non tocchi il cerchio minore  $efgh$  \*; e poi un<sup>1.2.</sup>  $XII$ , altro poligono  $AIBKC$  ec. simile a questo s'isciva nel cerchio  $ABCD$ ; sarà il poligono  $AIBKC$  ec. al poligono  $ENFPG$  ec., come il quadrato di  $BD$  all' altro di  $FH$  \*. Ma quel quadrato si è sup- \*  $1. XII$ , posto essere a questo, come il cerchio  $ABCD$  all' altro  $EFGH$ ; quindi starà il cerchio  $ABCD$  al cerchio  $EFGH$ , come il poligono  $AIBKC$  ec. all' altro  $ENFPG$  ec.. Per lo che essendo il cerchio  $ABCD$  maggiore del poligono  $AIBKC$  ec. in esso iscritto, sarà anche l' altro cerchio  $efgh$  maggiore del poligono  $ENFPG$  ec. in cui è compreso. Ma n' è minore; perciò non sta il quadrato di  $BD$  a quello di  $FH$ , come il cerchio  $ABCD$  ad un altro  $efgh$  minore di  $EFGH$ . E similmente si dimostrerebbe che non possa stare il quadrato di  $FH$  a quello di  $BD$  come il cerchio  $EFGH$  ad un altro cerchio minore di  $ABCD$ .

Che se si supponga essere il quadrato di  $BD$  a quello di  $FH$ , come il cerchio  $ABCD$  ad un altro cerchio  $SVT$  maggiore di  $EFGH$ ; sarà intervenendo il cerchio  $SVT$  all' altro  $ABCD$ , come il qua-

drato di FH a quello di BD. Ma il cerchio SVT deve stare all' altro ABCD, come il cerchio EFGH ad un altro cerchio che sarà minore di ABCD; poichè il cerchio SVT è maggiore dell' altro EFGH; quindi starebbe il quadrato di FH a quello di BD, come il cerchio EFGH ad un altro minore di ABCD. Lo che si è già dimostrato impossibile.

Laonde non potendo il quadrato di BD serbare a quello di FH la stessa ragione che il cerchio ABCD ad un altro cerchio minore di EFGH, o pur maggiore; dovrà stare il quadrato di BD a quello di FH, come il cerchio ABCD al cerchio EFGH.

E perciò i cerchi ec.

### PROPOSIZIONE III.

#### TEOREMA.

*Ogni piramide a base triangolare si divide in due piramidi, anche a basi triangolari, simili ed uguali tra loro, e simili alla tutta; ed in due prismi uguali, i quali sono maggiori della metà dell' intera piramide.*

fig. 43. Sia la piramide che ha per base il triangolo ABC, e per vertice il punto D: dico che una tal piramide ABCD si divide in due piramidi, che hanno anche per base de' triangoli, e che sono uguali e simili tra loro, e simili alla tutta; ed in due prismi uguali, i quali sono maggiori della metà dell' intera piramide.

Si dividano per metà i lati  $AB$ ,  $BC$ ,  $CA$ ,  $AD$ ,  $DB$ ,  $DC$  de' triangoli che terminano la piramide triangolare  $ABCD$  in  $E$ ,  $F$ ,  $G$ ,  $H$ ,  $K$ ,  $L$ , e poi si uniscano le  $EH$ ,  $EG$ ,  $GH$ ,  $HK$ ,  $KL$ ,  $LH$ ,  $EK$ ,  $KF$ ,  $FG$ . E poichè  $AE$  è uguale ad  $EB$ , ed  $AH$  ad  $HD$ ; sarà  $EH$  parallela a  $DB$ . Per la stessa ragione anche  $HK$  è parallela ad  $AB$ : dunque la figura  $HEBK$  è un parallelogrammo; e perciò  $HK$  è uguale ad  $EB$ , e quindi ad  $AE$ , ed  $EH$  è uguale a  $BK$ , ossia a  $KD$ . Laonde i due triangoli  $EAH$ ,  $KHD$ , avendo i lati  $EA$ ,  $AH$  uguali ai lati  $KH$ ,  $HD$ , ciascuno a ciascuno, e la base  $EH$  uguale alla base  $KD$ , saranno uguali e simili: e per la stessa ragione il triangolo  $AHG$  è pure uguale e simile al triangolo  $HLD$ . Or perchè i lati  $EH$ ,  $HG$  dell'angolo  $EHG$  sono rispettivamente paralleli ai lati  $KD$ ,  $DL$  dell'altro angolo  $KDL$ , ch'è in un piano diverso da quello in cui si trova il primo; perciò l'angolo  $EHG$  è uguale all'altro  $KDL$  \*: ma sono anche uguali, ciascuno a ciascuno, i \* 10. XI. lati che comprendono questi angoli; quindi i triangoli  $EHG$ ,  $KDL$  saranno uguali e simili; e perciò la base  $EG$  sarà uguale alla base  $KL$ . Inoltre i tre lati  $EA$ ,  $AG$ ,  $GE$  del triangolo  $EAG$ , essendo uguali, ciascuno a ciascuno, a' lati  $KH$ ,  $HL$ ,  $LK$  dell'altro triangolo  $KHL$ ; dovrà anche il triangolo  $EAG$  essere uguale e simile all'altro  $KHL$ . È dunque la piramide a base triangolare  $EAGH$  uguale e simile all'altra anche a base triangolare  $KHLD$  \*.

\* B. XI.

Or essendosi dimostrata  $KH$  parallela a  $BA$ , è chiaro che il triangolo  $KDH$  sia equiangolo, e



- perciò simile all' altro  $BDA$  ; e similmente si rileva che il triangolo  $DKL$  sia simile a  $DBC$ , ed il triangolo  $DHL$  all' altro  $ADC$ . Ma è poi il triangolo  $BAC$  simile all' altro  $EAG$ , e questo si è dimostrato simile al triangolo  $KHL$  ; laonde sarà il triangolo  $BAC$  anche simile al triangolo  $KHL$  : e quindi
- \* A. XI e) la piramide  $BACD$  è simile all' altra  $HKLD$  \*  
 d. 10. XI) Per lo che essendosi dimostrata questa piramide  $HKLD$  simile all' altra  $AEGH$  ; dovrà anche la piramide  $AEGH$  esser simile alla piramide  $ABCD$  ; e perciò ciascuna delle due piramidi  $AEGH$  ,  $HKLD$  sarà simile all' intera piramide  $ABCD$  . E poichè  $BF$  è uguale ad  $FC$  , sarà il parallelogrammo  $EBFG$  doppio del triangolo  $GFC$  ; e quindi il prisma contenuto dai due triangoli  $BKF$  ,  $EHG$  , e dai tre parallelogrammi  $EBFG$  ,  $EBKH$  ,  $KHGF$  sarà uguale all' altro che si contiene dai due triangoli  $GFC$  ,  $HKL$  , e dai tre parallelogrammi  $KFCL$  ,  $LCGH$  ,  $HKFG$  ; poichè se si prende per base del primo prisma il parallelogrammo  $EBFG$  , e per base dell' altro il triangolo  $GFC$  il primo di essi avrà per base un parallelogrammo doppio del triangolo ch'è base dell' altro , e saranno di più ugualmente alti \* . Ed è poi manifesto che ciascuno di questi due prismi  $BKFEHG$  , e  $GFCHKL$  sia maggiore di ciascuna delle piramidi  $AEGH$  ,  $HKLD$  : poichè se si unisca  $EF$  , si vede che il prisma  $BKFEHG$  è maggiore della piramide  $EBFK$  . Ma questa piramide è uguale all' altra  $AEGH$  ; poichè sono con-
- \* B. XI. tenute da piani uguali e simili \* : perciò anche il prisma  $BKFEHG$  è maggiore della piramide  $AEGH$  . E

l'altro prisma GFCHKL, perchè uguale al prisma KBFHEG, è anche maggiore della piramide HKLD, ch'è uguale all'altra AEGH. Adunque i due prismi dei quali si è parlato sono maggiori di queste due piramidi. E perciò l'intera piramide ABCD a base triangolare si è divisa in due piramidi uguali e simili tra loro, ed alla tutta; ed in due prismi uguali, che sono maggiori della metà della piramide intera. C. B. D.

# PROPOSIZIONE IV.

## TEOREMA.

*Se una piramide triangolare si divida in due piramidi triangolari uguali e simili tra loro, e simili alla tutta, ed in due prismi uguali; poi ciascuna delle piramidi che si ottiene da questa prima divisione si divida nel modo stesso, e così in seguito; e la medesima divisione si pratichi in un'altra piramide triangolare di uguale altezza alla prima: sarà come la base della prima piramide alla base dell'altra, così tutt' i prismi che si contengono nell'una a tutt' i prismi che contengono nell'altra, e che sono uguali in numero.*

Sia la piramide triangolare ABCD, ed essa si divida in due piramidi uguali tra loro e simili alla tutta, ed in due prismi uguali; poi si divida ciascuna delle piramidi che si ottengono da questa divisione nel modo stesso, e così si continui successivamente; e la medesima divisione si pra-

tichi anche nell'altra piramide MNOX di uguale altezza alla prima: dico che come la base ABC alla base MNO, così stiano tutt' i prismi che si contengono nella piramide ABCD a tutti gli altri, uguali in numero, che si contengono nella piramide MNOX.

Si faccia per ciascuna delle piramidi ABCD, MNOX la stessa costruzione che nella precedente proposizione. E poichè BF è uguale ad FC, ed AG a GC, sarà FG parallela a BA; e perciò il triangolo BCA è simile al triangolo FCG: e così pure si dimostrerà essere il triangolo NOM simile all'altro QOR. Or poichè BC è doppia di CF, ed NO di OQ; sarà BC a CF, come NO ad OQ; ed essendosi descritti sulla prima e seconda di queste linee rette i due rettilinei simili e similmente posti BCA ed FCG, e sulle altre due NO ed OQ gli altri rettilinei simili e similmente posti NOM, QOR; dovrà stare il triangolo BCA al triangolo FCG, come il triangolo NOM all'altro QOR, e permutando starà il triangolo BCA al triangolo NOM, come il triangolo FCG al triangolo QOR. Or poichè i piani ABC, HKL sono paralleli, come anche gli altri MNO, STY; le perpendicolari che dai punti D, X si abbassano su i piani ABC, MNO, le quali sono tra loro uguali, dovranno restar divise per metà dagli altri piani HKL, STY; poichè anche le altre linee rette DC, XO son  
 \* 17. XI. divise per metà dai piani stessi ne' punti L, Y\*. Laonde i due prismi GFCHKL, RQOSTY saranno ugualmente alti: e perciò starà il prisma FGCKHL al prisma QROTSY, come la base FCG

alla base QOR; cioè come il triangolo BCA all'altro NOM. E poichè i due prismi che esistono nella piramide BCAD sono tra loro uguali, come anche tra loro uguali sono gli altri due che contengono nella piramide MNOX\*; sarà perciò la somma de' \* 3. XII. due primi a quella de' due altri, come un di quelli FGCKHL ad un di questi QORTYS\*, cioè, secondo \* 15. V. si è dimostrato, come BCA ad NOM. Similmente si dimostra che, divise le piramidi KHL D, TSYX nel modo stesso che le proposte, sta la somma de' due prismi contenuti nella prima a quella degli altri due che contengono nella seconda, come la base HKL alla base STY, e quindi come FGC a QRO, o finalmente come BAC ad NMO. Dunque come BAC ad NMO, così starà la somma de' due prismi compresi nella piramide BCAD e degli altri due compresi nella piramide KHL D, alla somma de' quattro altri prismi, due compresi nella piramide MNOX, e due altri nella piramide TSYX. E continuando a dimostrare lo stesso per gli prismi che si ottengono dalla divisione delle piramidi EAGH, PMRS, e di tutte le altre che risultano dividendo queste e le precedenti KHL D, TSYX continuamente, nel modo indicato nell'enunciazione; si concluderà in fine, che la somma di tutti i prismi contenuti nella piramide BACD stia alla somma di tutti quelli che contengono nell'altra MNOX, e che sono in numero uguale ai primi, come la base dell'una piramide BAC alla base NMO dell'altra. C. B. D.

## PROPOSIZIONE V.

## TEOREMA.

*Le piramidi triangolari di uguali altezze sono tra loro come le basi.*

*fig. 43.* Sieno le piramidi triangolari ugualmente alte  
e 44.  $ABCD$ ,  $MNOX$ : dico che stia la base  $ABC$  alla base  $MNO$ , come la piramide  $ABCD$  alla piramide  $MNOX$ .

Poichè se non è così, starà il triangolo  $ABC$  al triangolo  $MNO$ , come la piramide  $BACD$  ad un solido minore che la piramide  $MNOX$ , o pur maggiore. Sia primieramente ad un solido minore  $V$ ; e dividasi la piramide  $MNOX$  in due piramidi tra loro uguali, e simili alla tutta, ed in due prismi uguali, i quali nella somma sono maggiori della

\* 3. XII. metà della piramide \*; indi si dividano similmente le piramidi che ottengono da una tal divisione; e così si continui a fare, finchè vi restino alcune piramidi nella piramide  $MNOX$ , le quali sieno minori dell'eccesso della piramide  $MNOX$  sul so-

\* 1. XII. lido  $V$  \*. Dinotino, per esempio, un tal residuo le piramidi  $PMRS$ ,  $TSYX$ ; che perciò i prismi che in tal modo resteranno assegnati nella piramide  $MNOX$  dovranno esser maggiori del solido  $V$ . Ciò fatto si divida la piramide  $BACD$  similmente alla piramide  $MNOX$ , ed in tante parti, in quante si è divisa questa; sarà come la base  $ABC$  alla base  $MNO$ , così la somma dei prismi contenuti nel-

la piramide BACD alla somma di quelli altri che contengonsi nella piramide MNOX \*. Ma come la base ABC alla base MNO, così sta pure la piramide ABCD al solido V. Dunque la piramide ABCD starà al solido V, come tutt'i prismi contenuti nella piramide ABCD a tutti quelli che contengonsi nella piramide MNOX; e quindi essendo la piramide ABCD maggiore dei prismi in essa contenuti, sarebbe anche il solido V maggiore di quelli che si contengono nella piramide MNOX. Ma n'è minore; il che non può essere. Adunque non può stare la base ABC alla base MNO, come la piramide ABCD ad un solido minore della piramide MNOX. E similmente si dimostrerà che non possa star la base MNO alla base ABC, come la piramide MNOX ad un solido minore della piramide ABCD.

Dico ora, che neppure possa la base BAC serbare alla base NMO, la stessa ragione che la piramide ABCD ad un solido Z maggiore della piramide MNOX. Poichè si avrebbe in tal caso, invertendo, la base MNO all'altra ABC, come il solido Z alla piramide ABCD; ma come il solido Z alla piramide ABCD, così deve stare la piramide MNOX ad un solido minore della piramide ABCD; poichè quel solido Z è maggiore di questa piramide MNOX; sarebbe dunque come la base MNO alla base ABC, così la piramide MNOX ad un solido minore della piramide ABCD. Il che, come si è poc' anzi dimostrato, è un assurdo. Laonde neppur può stare la base ABC alla base MNO, come la piramide ABCD

\* 4.XII.

ad un solido  $Z$  maggiore della piramide  $MNOX$ .  
Si è poi dimostrato, che ne tampoco poteva quella piramide serbar tal ragione ad un solido minore di questa. Adunque dovrà stare la base  $ABC$  alla base  $MNO$ , come la piramide  $ABCD$  all'altra  $MNOX$ .

E quindi le piramidi ec.  $C. B. D.$

## PROPOSIZIONE VI.

### TEOREMA.

*Le piramidi della stessa altezza, ed a basi poligone, sono tra loro nella ragione delle basi.*

- fig. 45.* Sieno le piramidi a basi poligone  $ABCDEM$  ed  $FGHKLN$ , le quali abbiano la stessa altezza: dico che come la base  $ABCDE$  alla base  $FGHKL$ , così stia la piramide  $ABCDEM$  all'altra  $FGHKLN$ .  
Dividasi la base  $ABCDE$  ne' triangoli  $ABC$ ,  $ACD$ ,  $ADE$ , e la base  $FGHKL$  ne' triangoli  $FGH$ ,  $FHK$ ,  $FLK$ ; e s' intendan questi triangoli esser le basi di altrettante piramidi ugualmente alte che le proposte, delle quali le tre prime abbiano per vertice il punto  $M$ , e le altre tre il punto  $N$ . E poichè sta il triangolo  $ABC$  al triangolo  $FGH$ , come la piramide  $ABCM$  alla piramide  $FGHN$ ; e che come il triangolo  $ACD$  allo stesso triangolo  $FGH$ , così sta la piramide  $ACDM$  alla piramide  $FGHN$ ; sarà il trapezio  $ABCD$  al triangolo  $FGH$ , come la piramide  $ABCDM$  all'altra  $FGHN$  \*. Ma è di nuovo come il triangolo  $ADE$  al triangolo
- \* 24. V.

FGH, così la piramide ADEM alla stessa FGHN; quindi starà il poligono ABCDE al triangolo FGH, come la piramide ABCDEM alla piramide FGHN. \* 24. V. Similmente, paragonando i triangoli FLK, FKH, ed FGH con questo stesso triangolo FGH, e le piramidi FLKN, FKHN, FHGN con quest' ultima piramide FHGN, si dimostrerà essere la base FGHKL alla base FGH, come la piramide FGHKLM alla piramide FGHN; ed invertendo la base FGH alla base FGHKL, come la piramide FGHN alla piramide FGHKLN. Laonde essendo la base ABCDE alla base FGH, come la piramide ABCDEM alla piramide FGHN, e la base FGH alla base FGHKL, come la piramide FGHN all' altra FGHKLN; sarà, per equalità, la base ABCDE alla base FGHKL, come la piramide ABCDEM all' altra FGHKLN.

E perciò le piramidi ec. C. B. D.

## PROPOSIZIONE VII.

### TEOREMA.

*Ogni prisma a base triangolare si divide in tre piramidi uguali tra loro, le quali hanno le basi triangolari.*

Sia il prisma che ha per base il triangolo ABC, fig. 46. e per piano opposto a questa l' altro triangolo DEF: dico che il prisma ABCDEF si divide in tre piramidi triangolari tra loro uguali.



Si trino le diagonali  $CE$ ,  $CD$ ,  $DB$ . E poichè la diagonale  $DB$  divide il parallelogrammo  $ADEB$  ne' due triangoli uguali  $ABD$ ,  $EDB$ ; perciò le due piramidi  $ABDC$ ,  $EDBC$  che hanno rispettivamente per basi que' triangoli, e'l vertice comune in  $C$  saranno tra loro uguali \*. Ma la piramide che ha per base il triangolo  $EDB$ , e per vertice il punto  $C$ , è la stessa che l'altra la cui base è il triangolo  $EBC$ , ed il punto  $D$  n'è il vertice; poichè l'una e l'altra è contenuta dagli stessi triangoli. Dunque anche la piramide che ha per base il triangolo  $ABD$ , e per vertice il punto  $C$  è uguale a quell'altra, che ha per base il triangolo  $EBC$ , e per vertice il punto  $D$ . Similmente poichè il parallelogrammo  $FCBE$  è diviso dalla diagonale  $CE$ , il triangolo  $ECF$  è uguale al triangolo  $ECB$ ; e quindi anche la piramide che ha per base il triangolo  $ECB$ , e per vertice il punto  $D$  è uguale alla piramide la cui base è il triangolo  $ECF$ , e lo stesso punto  $D$  n'è il vertice. Ma questa piramide si è dimostrata uguale a quell'altra che ha per base il triangolo  $ABD$ , e per vertice il punto  $C$ ; adunque anche la piramide che ha per base il triangolo  $ECF$ , e per vertice il punto  $D$  è uguale a quella che ha per base il triangolo  $ABD$ , e per vertice il punto  $C$ . Quindi il prisma  $ABCDEF$  si divide in tre piramidi uguali, le quali hanno per basi dei triangoli, cioè nelle  $ABDC$ ,  $EDBC$ ,  $ECFD$ . E poichè la piramide che ha per base il triangolo  $ABD$ , e per vertice il punto  $C$  è la stessa che la piramide che ha per base il triangolo  $ABC$ , e per vertice il punto  $D$ ; poichè sono con-

tenute dagli stessi piani: e che la piramide che ha per base il triangolo ABD, e per vertice il punto C si è dimostrata esser la terza parte del prisma la cui base è il triangolo ABC, ed il piano opposto è DEF; perciò anche la piramide che ha per base il triangolo ABC, e per vertice il punto D è la terza parte di un tal prisma. C. B. D.

COR. E' chiaro da ciò che ogni piramide sia la terza parte del prisma che ha la medesima base, e l'altezza stessa. Poichè se la base comune a questi due solidi sia un'altra qualsivoglia figura rettilinea; potendosi sì il prisma che la piramide concepir divisi rispettivamente in tanti prismi e piramidi, che abbiano per basi dei triangoli, quanti di questi si possono assegnare in essa figura rettilinea: e ciascuno di questi prismi essendo triplo della piramide corrispondente; sarà la somma di essi, cioè il prisma proposto, anche triplo della somma delle piramidi, cioè della piramide che ha la medesima base, e l'altezza stessa di esso prisma.

COR. 2. Di più i prismi ugualmente alti sono tra loro come le basi; poichè le piramidi che hanno le stesse loro basi, e la medesima altezza sono tra loro come le basi \*.

\* 6. XII.

## PROPOSIZIONE VIII.

### TEOREMA.

*Le piramidi simili che hanno le basi*

*triangolari , sono tra loro in triplicata ragione de' lati omologhi .*

*fig. 47.* Sieno le piramidi simili e similmente poste  $ABCG$  ,  $DEFH$  , le quali abbiano per basi i triangoli  $BCA$  ,  $EFD$  , e per vertici i punti  $G$  ed  $H$  : dico che la piramide  $ABCG$  serbi alla piramide  $DEFH$  ragion triplicata di quella che il lato  $BC$  ha all' omologo  $EF$  .

Imperocchè si compiscano i \* parallelogrammi  $ABCM$  ,  $GBCN$  ,  $ABGK$  ; ed indi poi il parallelepipedo  $BGML$  , ch' è contenuto da questi piani e dagli opposti ad essi . Similmente si compisca il parallelepipedo  $EHPO$  contenuto dai parallelogrammi  $DEFP$  ,  $HEFR$  ,  $DEHX$  e dagli opposti a questi. E poichè le piramidi  $ABCG$  ,  $DEFH$  sono simili , dovrà il triangolo  $ABC$  esser simile all' altro  $DEF$  ; e quindi i due angoli  $ABC$  ,  $DEF$  saranno uguali , ed i lati  $AB$  ,  $BC$  del primo saranno proporzionali ai lati  $DE$  ,  $EF$  dell' altro . Laonde i due parallelogrammi  $EP$  ,  $BM$  avendo un angolo uguale ad un angolo , e proporzionali i lati intorno a questi angoli , dovranno esser simili . E così pure si dimostrerà che il parallelogrammo  $BN$  sia simile all' altro  $ER$  , e  $BX$  ad  $EK$  . Ma i tre parallelogrammi  $BM$  ,  $BN$  ,  $BK$  sono rispettivamente uguali e simili agli opposti ; ed i tre altri  $EP$  ,  $ER$  ,  $EX$  sono anche simili ed uguali ai loro opposti ; quindi i due parallelepipedi  $BL$  ,  $EO$  , essendo terminati dallo stesso numero di piani si-

\* A. XI. mili , ed avendo perciò uguali i loro angoli solidi \* ,

\*d.10.XI, saranno simili tra loro \*. Per lo che essendo i pa-

rellelepipedi simili in triplicata ragione de' loro lati omologhi \* ; i solidi BL , EO saranno in triplicata ragione di quella che il lato BC serba al suo omologo EF . Or come il solido BL al solido EG , così sta la piramide ABCG all'altra DEFH , essendo queste piramidi le seste parti di que' solidi ; mentre i prismi che sono le metà di essi , sono tripli delle corrispondenti piramidi \* . \* 7.XII. Dunque sarà pure la piramide ABCG all'altra DEFH in triplicata ragione di BC ad EF .

Scol. Da ciò si può rilevare facilmente che anche le piramidi simili che hanno per basi de' rettilinei , sono tra loro in triplicata ragione de' lati omologhi .

Imperocchè sieno ABCDEM , FGHKLN le fig. 45. piramidi simili e similmente poste, le quali hanno per basi i rettilinei ABCDE , FGHKL . Si dividano quei rettilinei ne' triangoli ABC, ACD, ADE; FGH, FHK, FKL, i quali saranno simili tra loro, ciascuno a ciascuno \* . E poichè le piramidi proposte \* 20.VI. sono simili , sarà il triangolo ABM simile al triangolo FGN , ed il triangolo BCM simile a GHN ; quindi come MA ad AB, così sta NF ad FG ; ed è inoltre come AB ad AC , così FG ad FH , per esser simili i triangoli ABC , FGH ; quindi , per equalità , come MA ad AC, così sta NF ad FH . Similmente si dimostrerà che AC sta a CM , come FH ad HN ; laonde sarà di nuovo per equalità , come AM ad MC , così FN ad NH : e perciò i triangoli AMC , FNH , avendo proporzionali i lati , saranno simili . Per lo che le piramidi triangolari ABCM , FGHN essendo contenute da piani

- simili ed uguali in numero , ed avendo uguali i
- \* A.XI. loro angoli solidi \*, saranno simili tra loro . E nel modo stesso si dimostrerà che la piramide ACDM sia simile alla piramide FHK N, e la piramide ADEM all' altra FKL N. Or essendo simili le piramidi triangolari ABCM, FGHN, sarà l' una all' altra in triplicata ragione del lato AC all' omologo FH ; e per la stessa ragione la piramide ACDM sta alla piramide FHK N in triplicata ragione di AC ad FH ; quindi come sta la piramide ACDM alla piramide FHK N, così starà la piramide ABCM all' altra FGHN . E similmente si dimostra che come la piramide ADEM alla piramide FKL N, così stia la piramide ACDM all' altra FHK N . Laonde dovendo stare un antecedente ad un conseguente , come tutti gli antecedenti a tutti i conseguenti \* ; sarà la piramide ABCM alla piramide FGHN , come tutta la piramide ABCDEM a tutta l' altra FGHKLN . Ma la piramide ABCM sta alla piramide FGHN in triplicata ragione del lato AB all' omologo FG \* ; perciò anche tutta la piramide ABCDEM serba a tutta l' altra piramide FGHKLN triplicata ragione del lato AB all' omologo FG . C. B. D.

## P R O P O S I Z I O N E IX.

## T E O R E M A .

*Le basi triangolari di due piramidi uguali si reciprocano colle altezze : e reciprocandosi le basi triangolari di due piramidi colle altezze , esse sono uguali .*

Sieno le piramidi uguali che abbiano le basi triangolari  $ABC$ ,  $DEF$ , e per vertici i punti  $G$ ,  $H$ : dico che le basi e le altezze di queste piramidi  $ABCG$ ,  $DEFH$  sieno reciprocamente proporzionali, cioè che come la base  $ABC$  alla base  $DEF$ , così stia l'altezza della piramide  $DEFH$  a quella della piramide  $ABCG$ . fig. 48.

Imperocchè si compiano i parallelogrammi  $AC$ ,  $AG$ ,  $GC$ , come anche gli altri  $DF$ ,  $DH$ ,  $HF$ ; ed indi si compiscano anche i parallelepipedi  $BGML$ ,  $EHPO$ , i quali sono compresi rispettivamente da quei piani, e dagli opposti ad essi. E poichè le piramidi  $ABCG$ ,  $DEFH$  sono uguali; e che della piramide  $ABCG$  n'è sestuplo il parallelepipedo  $BL$ , e dell'altra  $DEFH$  n'è anche sestuplo l'altro parallelepipedo  $EO$ : perciò questi parallelepipedi  $BL$ ,  $EO$  saranno uguali; e quindi le loro basi  $BM$  ed  $EP$  si reciprocheranno colle altezze. Ma come la base  $BM$  alla base  $EP$ , così sta il triangolo  $ABC$  all'altro  $DEF$ ; dunque starà il triangolo  $ABC$  al triangolo  $DEF$ , come l'altezza del solido  $EO$  a quella del solido  $BL$ . Laonde poichè l'altezza del solido  $BL$  è la stessa di quella della piramide  $ABCG$ , e l'altezza del solido  $EO$  è anche la stessa che quella dell'altra piramide  $DEFH$ ; ne segue che starà pure come la base  $ABC$  alla base  $DEF$ , così l'altezza della piramide  $DEFH$  all'altezza della piramide  $ABCG$ . E perciò le basi e le altezze delle piramidi uguali  $ABCG$ ,  $DEFH$  sono reciprocamente proporzionali.

Che se i triangoli  $ABC$ ,  $DEF$  si reciprochino

colle altezze delle piramidi  $ABCG$ ,  $DEFH$ , cioè che stia la base  $ABC$  alla base  $DEF$ , come l'altezza della piramide  $DEFH$  all'altezza della piramide  $ABCG$ : dico che la piramide  $ABCG$  sia uguale all'altra  $DEFH$ .

Imperocchè fatta la medesima costruzione: poichè sta la base  $ABC$  alla base  $DEF$ , come l'altezza della piramide  $DEFH$  a quella della piramide  $ABCG$ ; ed è poi la base  $ABC$  alla base  $DEF$ , come il parallelogrammo  $BM$  al parallelogrammo  $EP$ ; sarà perciò, come il parallelogrammo  $BM$  al parallelogrammo  $EP$ , così l'altezza della piramide  $DEFH$ , o ch'è lo stesso quella del parallelepipedo  $EO$ , all'altezza della piramide  $ABCG$ , cioè del parallelepipedo  $BL$ . Quindi questi parallelepipedi saranno tra loro uguali; poichè hanno le basi reciprocamente proporzionali alle altezze: e perciò anche uguali dovranno essere le piramidi  $ABCG$ ,  $DEFH$ , che sono le seste parti di tali parallelepipedi.

Laonde le basi triangolari ec.  $C$ .  $B$ .  $D$ .

## PROPOSIZIONE X.

### TEOREMA.

*Ogni cono è la terza parte del cilindro, che ha la medesima base e l'altezza stessa.*

*fig. 49.* Abbia un cono la medesima base con un cilindro, cioè il cerchio  $ABCD$ , e l'altezza stessa: dico che il cono è la terza parte del cilindro, ossia

che il cilindro è triplo del cono ,

Poichè se quel cilindro non è triplo del cono , sarà o più che triplo di un tal cono , o pur meno . Sia primieramente meno che triplo ; e perciò si supponga esser triplo di quell' altro cono della stessa altezza che il proposto , la cui base sia il cerchio  $abcd$  minore di  $ABCD$  , e descritto intorno allo stesso centro . S' iscriva nel cerchio maggiore  $ABCD$  un poligono  $AEBFC$  cc. di un numero pare di lati uguali , i quali non tocchino il cerchio minore  $abcd$  , e poi s' intenda eretto su di questo poligono il prisma ugualmente alto che il cilindro , e la piramide il di cui vertice è lo stesso che quello del cono proposto , la quale comprendendo in se , com' è evidente , il cono che ha per base il cerchio  $abcd$  è maggiore di esso . Per lo che essendo una tal piramide la terza parte di quel prisma , mentre tali solidi hanno la base stessa , e sono ugualmente alti ; dovrà quel prisma essere più che triplo di quel cono che ha per base il cerchio  $abcd$  . E perciò essendo il cilindro proposto maggiore di questo prisma che vi sta dentro ; dovrà esser più che triplo del cono la cui base è il cerchio  $abcd$  . Ma si era supposto che ne fosse triplo ; il che ripugna . Adunque non può il cilindro che ha per base il cerchio  $ABCD$  esser meno che triplo del cono che ha la stessa base , e la medesima altezza del cilindro ,

Dico ora che ne tampoco possa quel cilindro esser più che triplo del cono ; poichè allora si potrà supporre esser triplo di quell' altro cono di uguale altezza , la cui base è il cerchio  $PQRS$  maggiore di



ABCD, e descritto anche intorno allo stesso centro. Or s'isciva similmente nel cerchio PQRS un poligono PYQZRec. di un numero pare di lati uguali, i quali non incontrino il cerchio interiore ABCD, e su di un tal poligono s'intenda eretto il prisma dell'altezza stessa del cilindro, e la piramide che ha per vertice quello del cono, e che perciò è iscritta in questo, e quindi n'è minore. E poichè una tal piramide è terza parte di quel prisma, sarà perciò il medesimo prisma meno che triplo di esso cono: e quindi il cilindro proposto essendo minore di questo prisma nel quale si contiene; dovrà anche esser meno che triplo del cono la cui base è il cerchio PQRS. Ma se n'era supposto triplo: e ciò anche ripugna. Laonde nè anche può il cilindro che ha per base il cerchio ABCD esser più che triplo del cono che ha la stessa base, e la medesima altezza del cilindro. E perciò un tal cilindro non potendo esser nè meno che triplo di un cono che ha la stessa sua base, e la medesima altezza, nè più che triplo; dovrà necessariamente esserne triplo. C. B. D.

## P R O P O S I Z I O N E XI.

## T E O R E M A.

*I coni ed i cilindri dell' altezza stessa sono tra loro come le basi.*

fig. 50. Abbiamo la medesima altezza i coni ed i cilindri; le cui basi sono i cerchi ABCD, EFGH de-

scritti intorno ai diametri  $BD$ ,  $FH$ , e che hanno gli assi  $KL$ ,  $MN$ : dico che come il cerchio  $ABCD$  al cerchio  $EFGH$ , così stia il cono  $ABCDL$  al cono  $EFGHN$ .

Poichè se non è così, sarà come il cerchio  $ABCD$  al cerchio  $EFGH$ , così il cono  $ABCDL$  ad un cono minore dell'altro  $EFGHN$ , o pur maggiore. Sia primieramente ad un cono minore, il quale abbia per vertice il punto  $N$ , e per base il cerchio  $efgh$  minore di  $EFGH$ , e descritto intorno allo stesso centro  $M$ . S'isciva nel cerchio maggiore  $EFGH$  un poligono  $EPFRG$ ec. di un numero pare di lati uguali, il quale non tocchi il cerchio minore  $efgh$ , ed un altro poligono  $AYBQC$ ec. simile a questo s'isciva anche nel cerchio  $ABCD$ ; e poi su tali poligoni s'intendano erette le piramidi che hanno gli stessi vertici  $L$  ed  $N$  dei coni, e che perciò saranno iscritte in essi. E poichè il poligono  $AYBQC$ ec. sta al poligono  $EPFRG$ ec., come il quadrato del diametro  $BD$  a quello del diametro  $FH$  \*; ed in questa ragione è pure il cerchio  $ABCD$  al cerchio  $EFGH$ ; sarà perciò il poligono  $AYBQC$ ec. al poligono  $EPFRG$ ec., come il cerchio  $ABCD$  al cerchio  $EFGH$ . Ma è poi il poligono  $AYBQC$ ec. al poligono  $EPFRG$ ec., come la piramide che ha per base il poligono  $AYBQC$ ec., e per vertice il punto  $L$  a quella la cui base è il poligono  $EPFRG$ ec. ed il punto  $N$  è il vertice: e si è supposto essere il cerchio  $ABCD$  all'altro  $EFGH$ , come il cono  $ABCDL$  all'altro  $efghN$ . Dunque sarà il cono  $ABCDL$  al cono  $efghN$ , come

\* 1.XI.

la piramide  $AYBQCec.L$  all' altra  $EPFRGec.N$ ; e quindi siccome il cono  $ABCDL$  è maggiore della piramide  $AYBQCec.L$  in esso iscritta, dovrebbe anche il cono  $efghN$  esser maggiore della piramide  $EPFRGec.N$ . Ma n'è minore; poichè questa lo comprende: adunque il cerchio  $ABCD$  non sta al cerchio  $EFGH$ , come il cono  $ABCDL$  ad un cono minore del cono  $EFGHN$ . E similmente si dimostrerebbe che non può stare il cerchio  $EFGH$  al cerchio  $ABCD$ , come il cono  $EFGHN$  ad un cono minore del cono  $ABCDL$ .

Dico inoltre che neppure possa stare il cerchio  $ABCD$  al cerchio  $EFGH$ , come il cono  $ABCDL$  ad un altro cono maggiore del cono  $EFGHN$ . Poichè s'è possibile sia questo il cono  $STVN$ , il quale abbia lo stesso vertice  $N$  del cono  $EFGHN$ , e per base il cerchio  $STV$  maggiore dell' altro  $EFGH$ ; sarà invertendo il cerchio  $EFGH$  all' altro  $ABCD$ , come il cono  $STVN$  all' altro  $ABCDL$ . Ma come questo cono  $STVN$  all' altro  $ABCDL$ , così deve stare il cono  $EFGHN$ , ch'è minore del cono  $STVN$ , ad un altro cono minore di  $ABCDL$ , e che potrà suppersi esser quello che ha la stessa altezza e per base un cerchio minore di  $ABCD$ , e concentrico; dunque dovrebbe stare il cerchio  $EFGH$  al cerchio  $ABCD$ , come il cono  $EFGHN$  ad un altro cono dell' altezza stessa di questo, la cui base fosse un cerchio minore di  $ABCD$ . Il che poc' anzi si è dimostrato impossibile. Laonde non può serbare il cerchio  $ABCD$  al cerchio  $EFGH$  la stessa ragione del cono  $ABCDL$  ad un cono maggiore dell' altro  $EFGHN$ . Si è poi dimostrato che nè anche pote-

va serbarla ad un cono minore : perciò dovrà stare il cerchio ABCD al cerchio EFGH, come il cono ABCDL al cono EFGHN.

Or come il cono ABCDL al cono EFGHN, così sta un cilindro all' altro ; poichè questi cilindri sono rispettivamente tripli di quei coni \* : dunque <sup>10.</sup>XII. que sarà pure il cerchio ABCD al cerchio EFGH, come il cilindro descritto sul primo all' altro di uguale altezza che ha per base il secondo. C.B.D.

## PROPOSIZIONE XII.

### TEOREMA.

*I coni ed i cilindri simili sono tra loro in triplicata ragione dei diametri delle basi.*

Sieno i coni ed i cilindri simili, che hanno per *fig. 51* basi i cerchi ABCD, EFGH descritti intorno ai diametri BD, FH, e per assi le KL, MN: dico che il cono ABCDL stia al cono EFGHN, in triplicata ragione di BD ad FH.

Poichè se non sta il cono ABCDL al cono EFGHN in triplicata ragione di BD ad FH; starà in questa ragione il cono ABCDL ad un cono minore di EFGHN, o pur maggiore. Sia primieramente in triplicata ragione di BD ad FH il cono ABCDL ad un altro cono *efgh*N, la cui base è il cerchio *efgh* minore dell'altro EFGH, e descritta intorno allo stesso centro, ed il vertice è lo stesso punto N. S'iscriva nel cerchio maggiore EFGH un poligono di un numero pare di

lati uguali EOFPGec., il quale non tocchi il cerchio minore *efgh*; e poi un altro poligono ATBYCec. simile a questo s'isciva nel cerchio ABCD. Su di questi poligoni s'intendano erette le piramidi che hanno per vertici quelli dei coni proposti, nei quali saranno perciò iscritte; e sia LBT uno dei triangoli che contengono la piramide ATBYCec.L, ed NOF il corrispondente nell'altra piramide EOFPGec.N. Si uniscano le KT, MO. E poichè il cono ABCDL è simile al cono EFGHN,

\*d.24.XI sarà BD ad FH, come l'asse KL all'asse MN\*.

Ma BD sta ad FH, come BK ad FM: dunque BK starà ad FM, come KL ad MN; e permutando BK a KL, come FM ad MN. Per la qual cosa i triangoli BKL, FMN, avendo uguali gli angoli BKL, FMN, che sono retti, e proporzionali i lati intorno ad essi, saranno simili. Similmente poichè BK sta a KT, come FM ad MO, e gli angoli BKT, FMO sono uguali; mentre quella parte che l'angolo BKT è di quattro retti, che sono intorno al centro K, la stessa è l'angolo FMO di quattro retti, che sono intorno al centro M: dovrà il triangolo BKT esser simile all'altro FMO. E poichè si è dimostrato che BK sta a KL, come FM ad MN; ed è poi BK uguale a KT, ed FM uguale ad MO: sarà anche TK a KL, come OM ad MN. Quindi i triangoli TKL, OMN che hanno gli angoli TKL, OMN uguali, perchè retti, saranno anche simili. Or per gli triangoli simili BKL, FMN sta LB a BK, come NF ad FM; e per gli altri triangoli BKT, FMO, che sono anche simili, sta BK a BT, co-

me FM ad FO ; sarà quindi, per equalità , LB a BT , conie NF ad FO : e similmente si dimostrerà che LT stia a TB , come NO ad OF . Laonde essendosi dimostrato esser anche TB a BL , come OF ad FN ; sarà , di nuovo per equalità , TL ad LB , come NO ad NF . Dunque anche i triangoli LTB , NOF avendo proporzionali i loro lati , saranno equiangoli , e perciò simili : e le due piramidi triangolari BKTL , FMON , avendo i loro angoli solidi rispettivamente uguali \* , ed \* A.XI, essendo terminate dallo stesso numero di piani simili l'uno all'altro , saranno simili ; e quindi l'una di esse starà all'altra in triplicata ragione di BK ad FM . E nel modo stesso , conducendo dai punti A , Q , ec. delle linee rette al punto K , e dai punti E , R , ec. delle linee rette all'altro M , e su i triangoli che vengono in tal modo a formarsi intendendo erette quelle piramidi che hanno i vertici stessi dei coni , si dimostrerà che ciascuna delle prime piramidi stia a ciascuua delle altre , in triplicata ragione di BK ad FM , o ch' è lo stesso di BD ad FH . Ma come un antecedente ad un conseguente , così stanno tutti gli antecedenti a tutti i conseguenti ; dunque come la piramide BKTL all'altra FMON , così deve stare l'intera piramide ATBYCec.L all'intera piramide EOFPGec.N ; e perciò anche quella piramide starà a questa , in triplicata ragione di BD ad FH . Laonde essendosi supposto che in questa ragione stia il cono ABCDL all'altro *efgh*N ; starà quel cono a questo , come la piramide ABCDL all'altra *efgh*N . Adunque siccome quel primo cono è maggiore della pirami-

de  $ATBYCec.L$  in esso iscritta, dovrebbe anche il cono  $efghN$  esser maggiore della piramide  $EOFGCec.N$ . Ma n'è minore, poichè questa lo comprende; adunque il cono  $ABCDL$  non può serbare ad un cono minore dell'altro  $EFGHN$  ragion triplicata di  $BD$  ad  $FH$ . Similmente dimostreremo che non possa la ragion triplicata di  $FH$  a  $BD$  esser uguale a quella del cono  $EFGHN$  ad un cono minore dell'altro  $ABCDL$ .

Dico ora che nè tampoco possa la triplicata ragione di  $BD$  ad  $FH$  esser quanto quella del cono  $ABCDL$  ad un cono maggiore del cono  $EFGHN$ , ed ugualmente alto, il quale per conseguenza abbia per base il cerchio  $STV$  maggiore dell'altro  $EFGH$ . Imperocchè invertendo si avrebbe il cono  $STVN$  all'altro  $ABCDL$  in triplicata ragione di  $FH$  a  $BD$ . Ma il cono  $STVN$  deve stare all'altro  $ABCDL$ , come il cono  $EFGHN$ , ch'è minore di  $STVN$ , ad un altro cono minore di  $ABCDL$ , che potrà supporre avere lo stesso vertice di questo, e per base un cerchio minore di  $ABCD$  e descritto intorno allo stesso centro, adunque sarebbe il cono  $EFGHN$  a questo in triplicata ragione di  $FH$  a  $BD$ . E ciò si è dimostrato poc' anzi impossibile. Non potendo dunque la ragione triplicata di  $BD$  ad  $FH$  pareggiar quella del cono  $ABCDL$  ad un altro cono minore, o maggiore di  $EFGHN$ , che gli si è supposto simile; dovrà necessariamente essere il cono  $ABCDL$  al cono  $EFGHN$  in triplicata ragione di  $BD$  ad  $FH$ .

Or il cono  $ABCDL$  sta al cono  $EFGHN$ , come il cilindro che ha la stessa base ed altezza del

primo cono all' altro che ha la stessa base ed altezza dell' altro cono; poichè questi cilindri avendo le medesime basi ed altezze dei coni, ne sono trippli; dunque anche l' un cilindro starà all' altro in triplicata ragione di BD ad FH. C. B. D.

## P R O P O S I Z I O N E XIII.

## T E O R E M A ,

*Se un cilindro sia segato da un piano parallelo ai piani opposti, starà come il cilindro al cilindro, così l' asse all' asse.*

Sia il cilindro AD segato dal piano GH parallelo ai piani opposti AB, CD, il quale incontri l' asse EF in K, e sia la linea GH la comune sezione del piano GH e della superficie del cilindro AD; sia di più AEFC quel parallelogrammo rettangolo che rivolgendosi intorno al lato EF descrive il cilindro AD\*, e la retta GK sia <sup>d. 21. XI</sup> la comune sezione del piano GH coll' altro AEFC, E poichè i piani paralleli AB, GH sono segati dal piano AEKG, le loro comuni sezioni AE, GK saranno parallele\*; quindi AK è un parallelogrammo rettangolo, il quale perciò nel rivolgersi intorno ad EK descriverà un cilindro, ed il suo lato GK opposto ad AE descriverà un cerchio, il cui centro sarà il punto K; ed un tal cerchio essendo lo stesso che la sezione GH, è chiaro che il piano GH divide il cilindro AD nei due cilindri AH, CD, che sono quelli che verrebbero de-



scritti dalla rivoluzione dei parallelogrammi  $AK$ ,  $GF$  intorno alle  $EK$ ,  $KF$ . Or io dico che stia il cilindro  $AH$  al cilindro  $HC$ , come l'asse  $EK$  all'asse  $KF$ .

Si produca l'asse  $FE$  dall'una e dall'altra parte, e poi si taglino quante se ne vogliano  $EN$ ,  $NL$  uguali alla  $EK$ , e quante altre ne piaccia  $FX$ ,  $XM$  uguali alla  $KF$ ; e per gli punti  $L$ ,  $N$ ,  $X$  ed  $M$  si tirino i piani paralleli alle basi  $AB$ ,  $CD$  del cilindro: si dimostrerà come si è fatto del piano  $GH$ , che le comuni sezioni di quei piani e della superficie del cilindro prodotto sieno cerchi, i quali hanno per centri i punti  $L$ ,  $N$ ,  $X$  ed  $M$ : e di più che tali piani tronchino i cilindri  $OS$ ,  $RB$ ,  $CY$  e  $TQ$ . Ciò premesso, i tre cilindri  $OS$ ,  $RB$  ed  $AH$  avendo uguali le loro altezze  $LN$ ,  $NE$  ed  $EK$ , dovranno

\*11.XII. esser tra loro come le basi\*; e perciò saranno uguali al pari di queste: dunque il cilindro  $OH$  e l'asse suo  $LK$  saranno ugualmente multipli del cilindro  $AH$  e del suo asse  $EK$ . E similmente si dimostrerà che il cilindro  $GQ$  e 'l suo asse  $KM$  sono ugualmente multipli del cilindro  $GD$  e del suo asse  $KF$ . Or è chiaro, che se l'asse  $LK$  del cilindro  $OH$  è maggiore dell'asse  $KM$  dell'altro cilindro  $GQ$ , anche quel cilindro è maggiore di questo; e che se l'asse  $LK$  fosse uguale, o minore dell'asse  $KM$ , anche il cilindro  $OH$  sarebbe uguale, o minore del cilindro  $GQ$ . Adunque vi sono quattro grandezze, cioè i due assi  $EK$ ,  $KF$ , ed i due cilindri  $BG$ ,  $GD$ : ed essendosi presi qualunque ugualmente multipli dell'asse  $EK$ , e del cilindro  $BG$ , cioè l'asse  $KL$ , ed il cilindro

OH; come pure dell'asse KF, e del cilindro GD essendosi presi qualunque altri ugualmente moltiplici, cioè l'asse KM, ed il cilindro GQ; si è dimostrato, che se l'asse KL supera l'asse KM, anche il cilindro PG supera il cilindro GQ, e se uguale uguale, se minore minore: dovrà dunque stare l'asse EK all'asse KF, come il cilindro BG al cilindro GD.

E perciò se un cilindro ec. C. B. D.

# PROPOSIZIONE XIV.

## TEOREMA.

*I coni ed i cilindri che hanno basi uguali sono tra loro come le altezze.*

Sulle basi uguali AB e CD sieno posti i cilindri EB ed FD: dico che come il cilindro EB al cilindro FD, così stia l'asse GH all'asse KL.

Si produca l'asse KL di uno di essi cilindri in N, e poi troncata la LN uguale alla HG, s'intenda intorno all'asse LN formato il cilindro CM. E poichè i cilindri EB, CM hanno la medesima altezza, saranno come le loro basi AB, CD \*. Ma <sup>11.</sup>XII. queste sono uguali: quindi anche uguali saranno i cilindri EB, CM. Or essendosi il cilindro FM segato con un piano CD parallelo ai suoi piani opposti; dovrà il cilindro CM serbare all'altro FD, la stessa ragione dell'asse NL all'asse LK \*. Ma il <sup>13.</sup>XII. cilindro CM è uguale al cilindro EB, e l'asse LN all'asse GH; quindi sarà il cilindro EB all'altro

FD, come l'asse HG del primo all'asse LK dell'altro. E poichè come il cilindro EB all'altro FD, così sta il cono ABG al cono CDK;  
 \*10. XII. essendo i cilindri tripli dei conî\*: sarà perciò come l'asse GH all'asse KL, così il cono ABG al cono CDK.

Adunque i conî, ed i cilindri ec. C. B. D.

### PROPOSIZIONE XV.

#### TEOREMA.

*Le basi dei cilindri, e dei conî uguali si reciprocano colle altezze; e se si reciprocano le basi colle altezze di due cilindri, e di due conî, essi sono uguali.*

fig. 54. I cerchi ABCD, EFGH descritti intorno ai diametri AC, EG sieno le basi di due cilindri, e di due conî uguali, e KL, MN i loro assi, che sono anche le loro altezze: dico che le basi e le altezze dei cilindri uguali AX, EO sieno reciprocamente proporzionali, cioè che stia la base ABCD alla base EFGH, come l'altezza MN all'altezza KL.

Imperocchè l'altezza KL o è uguale all'altezza MN, o gli è disuguale. Gli sia primieramente uguale: e poichè il cilindro AX è uguale al cilindro EO, e che i cilindri ugualmente alti sono come le basi; dovrà essere anche la base ABCD uguale alla base EFGH. Laonde la base ABCD sta alla base EFGH, come l'altezza MN all'altezza KL.

Che se le altezze  $KL$  ed  $MN$  non sieno uguali; ma sia  $MN$  la maggiore di esse, si tagli da  $MN$ ,  $PM$  uguale a  $KL$ , e poi si seghi il cilindro  $EO$  col piano  $TYS$  tirato per  $P$  parallelo alle basi  $EG$ ,  $RO$ ; sarà un cerchio la comune sezione di quel piano e del cilindro. Ed essendo il cilindro  $AX$  uguale all'altro  $EO$ , dovranno essi serbare al cilindro  $ES$  la stessa ragione. Ma il cilindro  $AX$  sta al cilindro  $ES$ , come la base  $ABCD$  alla base  $EFGH$ ; poichè hanno la stessa altezza \*; ed <sup>\*11.XII.</sup> il cilindro  $EO$  sta all'altro  $ES$ , come  $MN$  ad  $MP$ ; poichè il cilindro  $EO$  è segato dal piano  $TYS$  parallelo ai piani opposti \*. Dunque sta- <sup>\*13.XII.</sup> rà la base  $ABCD$  alla base  $EFGH$ , come l'altezza  $MN$  all'altezza  $MP$ , ossia  $KL$ : cioè le basi dei cilindri uguali  $AX$ ,  $EO$  si reciprocano colle altezze.

Sieno ora reciprocamente proporzionali le basi e le altezze dei cilindri  $AX$ ,  $EO$ , cioè stia la base  $ABCD$  alla base  $EFGH$ , come l'altezza  $MN$  all'altezza  $KL$ : dico che il cilindro  $AX$  sia uguale al cilindro  $EO$ .

Imperocchè se sia la base  $ABCD$  uguale alla base  $EFGH$ , è chiaro che dovrà esserè anche l'altezza  $MN$  uguale all'altezza  $KL$ ; e perciò il cilindro  $AX$  uguale al cilindro  $EO$ . Che se poi non sia la base  $ABCD$  uguale alla base  $EFGH$ ; sia  $ABCD$  la maggiore. E poichè sta la base  $ABCD$  alla base  $EFGH$ , come l'altezza  $MN$  all'altezza  $KL$ , sarà anche  $MN$  maggiore di  $KL$ : e perciò fatta la stessa costruzione della parte precedente; poichè come la base  $ABCD$  alla base

EFGH , così sta l' altezza MN all' altezza KL , e quest' altezza KL è uguale all' altezza MP ; sarà la base ABCD alla base EFGH , come il cilindro AX all' altro ES ; poichè sono ugualmente  
 \* 11. XII. alti \* : ed è poi come l' altezza MN all' altezza MP ,  
 \* 13. XII. o KL , così il cilindro EO allo stesso ES \* . Dunque il cilindro AX sta all' altro ES , come il cilindro EO allo stesso ES ; e perciò il cilindro AX è uguale al cilindro EO . E così pure si dimostrerà per gli coni . C. B. D.

N. B. La Proposizione 16. non si trova più in questo luogo ; perchè si è da noi trasportata nel principio di questo Libro XII. : ed è precisamente il Lemma II. ( *Veggasi la NOTA ad esso* ).

## PROPOSIZIONE XVII.

### TEOREMA.

*Se la semicirconferenza di un semicerchio si divida continuamente per metà quante volte si voglia , e si congiungano i punti prossimi delle divisioni ; e che poi fatta un' identica operazione in un altro semicerchio , si concepiscano essi rivolgersi insieme coi rettilinei che contengono intorno ai diametri : i solidi che da questi rettilinei si descrivono saranno tra loro in triplicata ragione dei diametri .*

fig. 55 Sieno BAC , EDF due semicerchi i quali suppongansi descritti intorno al comune centro O ;

ed abbiano per diametri le  $BC$ ,  $EF$ ; e divisa continuamente per metà la semicirconferenza  $BAC$  nei punti  $A$ ,  $K$ ,  $L$ , si congiungano le  $BK$ ,  $KA$ ,  $AL$ ,  $LC$ ; e poi una simile operazione si faccia nel semicerchio  $EDF$ : dico che i solidi che si descrivono dai rettilinei  $BKALC$ ,  $EHDIF$ , nel rivolgersi che fanno i semicerchi  $BAC$ ,  $EDF$  insieme con quei rettilinei intorno ai loro diametri  $BC$ ,  $EF$ , sieno tra loro in triplicata ragione di essi diametri  $BC$ ,  $EF$ .

Si uniscano le  $OH$ ,  $CK$ . E poichè quella parte ch'è l'angolo  $EOH$  di quattro retti che sono intorno al centro  $O$ , la stessa è l'angolo  $BOK$  dei medesimi quattro retti; perciò sarà l'angolo  $EOH$  uguale all'altro  $BOK$ : e quindi  $OH$  coinciderà con  $OK$ ; ed essendo  $OE$  ad  $OB$ , come  $OH$  ad  $OK$ ; sarà  $EH$  parallela a  $BK$ , e l'angolo  $HEO$  uguale all'altro  $KBO$ . Similmente si dimostra che la  $OD$  passi per  $A$ , che  $DH$  sia parallela ad  $AK$ , e l'angolo  $ODH$  uguale all'angolo  $OAK$ : e così in seguito. Ciò posto si abbassino dai punti  $K$ ,  $H$  le perpendicolari  $KM$ ,  $HP$  alla  $BC$ ; saranno simili i triangoli  $BKM$ ,  $EHP$  i quali sono equiangoli: e quindi sarà  $BM$  ad  $MK$ , come  $EP$  a  $PH$ . Laonde i coni che da tali triangoli si descrivono nel rivolgersi intorno ai loro lati  $BM$ ,  $EP$  saranno anche simili \*; \*d.24.XI e perciò starà il cono descritto dal triangolo  $BKM$  a quello che descrive l'altro triangolo  $EPH$ , in triplicata ragione di  $KM$  ad  $HP$  \*, ossia di  $KO$  \* 12.XII. ad  $HO$ ; poichè per essere anche simili i triangoli  $MKO$ ,  $PHO$  sta permutando  $MK$  a

PH, come KO ad HO. Or si prolunghino le AK, DH finchè incontrino la CB prolungata in R, S: ed essendo simili i triangoli OAR, ODS, perchè equiangoli, i conì che da essi descrivonsi nel rivolgersi intorno ai loro lati OR, OS saranno anche simili; e perciò starà il cono che si descrive dal triangolo OAR all'altro che vien descritto dal triangolo ODS, in triplicata ragione di OA ad OD, ossia di OK ad OH. Ma è poi anche il triangolo KMR equiangolo e quindi simile al triangolo HPS; che perciò i conì che essi descrivono rivolgendosi intorno ai loro lati MR, PS sono pure in triplicata ragione di KM ad HP, ossia di OK ad OH. L'onde starà il cono descritto dal triangolo AOR a quello che descrive il triangolo DOS, come il cono descritto dal triangolo KMR a quello che descrive il triangolo HPS; e per conseguenza dovrà stare il solido descritto dal quadrilineo KAOM nella sua rivoluzione intorno al suo lato OM a quello che descrive il quadrilineo HDOP nel rivolgersi intorno al suo lato OP, come il cono descritto dal triangolo

- \* 19. V. AOR a quello che si descrive dal triangolo DOS\*. E quindi siccome il cono descritto dal triangolo AOR sta a quello che descrivesi dal triangolo DOS in triplicata ragione di OK ad OH; dovrà anche stare il solido descritto dal quadrilineo KAOM a quello che descrive l'altro quadrilineo HDOP in triplicata ragione di OK ad OH. Ma in questa stessa ragion triplicata si è dimostrato esser anche il cono descritto da BMK a quello che si descrive da EPH. Dunque sarà il cono descritto da

BMK a quello che descrive EPH, come il solido descritto dal quadrilineo KAOM a quello che descrive l'altro quadrilineo HDOP. E perciò sarà tutto il solido descritto dal rettilineo BKAO nel rivolgersi intorno a BO a quello che si descrive dall'altro rettilineo EHDQ nella sua rivoluzione intorno ad EO, come il cono descritto da BMK a quello che descrive EPH \*, cioè in triplicata ragione di OK ad OH. E così continuando a dimostrare, si conchiuderà in fine che sta l'intero solido descritto dalla rivoluzione del semipoligono BKALC nel rivolgersi intorno a BC all'altro solido che descrivesi dal semipoligono EHDIF nel rivolgersi intorno ad EF, in triplicata ragione di OK ad OK, ossia di BC ad EF.

E perciò se la semicirconferenza. C. B. D.

## PROPOSIZIONE XVIII.

### TEOREMA.

*Le sfere sono tra loro in triplicata ragione dei diametri.*

Sieno le sfere descritte intorno ai diametri BC, *fig. 56.* EF dai semicerchi BAC, EDF: dico che la sfera che ha per diametro BC stia a quella che ha EF per diametro, in triplicata ragione di BC ad EF.

Imperocchè se la sfera che ha per diametro BC non sta a quella che ha EF per diametro, in triplicata ragione di BC ad EF; sia primicramente



questa ragione uguale a quella della sfera che ha per diametro  $BC$  ad un'altra minore di quella del diametro  $EF$ ; e quindi descritta da un semicerchio  $edf$  minore dell'altro  $EDF$ , e che suppongasì avere lo stesso centro di questo. Si divida continuamente per metà la semicirconferenza  $EDF$ , finchè si pervenga ad iscrivere nel semicerchio  $EDF$  la metà  $EHDIF$  di quel poligono di un numero pare di lati uguali, il quale non tocca il cerchio minore  $edf$ ; e poi si divida continuamente per metà l'altra semicirconferenza  $BAC$  tante volte, quante volte si è così divisa la semicirconferenza  $EDF$ : si verrà in tal modo ad iscrivere anche nel semicerchio  $BAC$  la metà  $BKALC$  di un poligono di un numero pare di lati uguali simile a quello di cui  $EHDIF$  era metà. Or se i due semipoligoni  $BKALC$ ;  $EHDIF$  s'intendano rivolgersi insieme coi semicerchi nei quali sono iscritti, e coll'altro  $edf$  intorno ai rispettivi diametri, si verranno da quei semipoligoni a descrivere due solidi iscritti nelle sfere che si generano in tal rivoluzione dai semicerchi  $BAC$ ,  $EDF$ ; e di più è manifesto che il solido descritto dal semipoligono  $EHDIF$  non possa toccare la sfera che si descrive dal semicerchio  $edf$ . Laonde dovendo stare il solido descritto dal semipoligono  $BKALC$  a quello che descrive l'altro  $EHDIF$ , in triplicata ragione di  $BC$  ad  $EF$ ; e questa ragione essendosi supposto pareggiare l'altra della sfera che ha per diametro  $BC$  a quella che ha per diametro  $ef$ ; dovrà anche stare la sfera del diametro  $BC$  a quella del diametro  $ef$ , come il

solido descritto dal semipoligono BKALC all'altro che si descrive dal semipoligono EHDIF. E quindi siccome la sfera del diametro BC è maggiore del solido descritto dal semipoligono BKALC, ch'è in essa; dovrebbe perciò anche la sfera del diametro *ef* esser maggiore del solido descritto dal semipoligono EHDIF. Ma n'è minore, perchè questo la comprende: e ciò è impossibile. Non può dunque la triplicata ragione di BC ad EF essere uguale alla ragione della sfera del diametro BC ad un'altra sfera minore di quella che ha EF per diametro. E similmente si dimostrerebbe, che la ragion triplicata di EF a BC non può pareggiar la ragione della sfera del diametro EF ad un'altra sfera minore di quella che ha BC per diametro.

Dico di più, che non possa la ragion triplicata di BC ad EF pareggiar la ragione della sfera del diametro BC ad una sfera maggiore di quella che ha EF per diametro. Poichè s'è possibile sia questa nuova sfera quella che si descrive dal semicerchio STV, maggiore dell'altro EDF: starà invertendo la sfera descritta dal semicerchio STV, cioè quella che ha per diametro SV, alla sfera che ha per diametro BC, in triplicata ragione di EF a BC. Ma la sfera che ha per diametro SV sta a quella che ha per diametro BC, come la sfera il di cui diametro è EF ad un'altra sfera minore di quella del diametro BC: il che è manifesto; poichè la sfera del diametro SV è maggiore della sfera del diametro EF. Adunque dovrebbe la triplicata ragione di EF a BC pareggiar la ragione della sfera del diametro EF ad una sfera minore di quella che ha BC.

per diametro. Il che si è già dimostrato impossibile. Quindi nè anche può essere la triplicata ragione di BC ad EF uguale a quella della sfera che ha per diametro BC ad un' altra sfera, maggiore di quella che ha per diametro EF. Si è poi dimostrato che neppure poteva serbar tal ragione ad una sfera minore; perciò dovrà necessariamente essere la sfera del diametro BC a quella del diametro EF, in triplicata ragione di BC ad EF. C. B. D.

FINE,

IL PRIMO LIBRO

DI

ARCHIMEDE

SULLA SFERA E SUL CILINDRO

NUOVAMENTE ESPOSTO

Per servir di continuazione ai Libri XI. e XII.  
degli Elementi di EUCLIDE.

---

NAPOLI

---

1812.



## PREFAZIONE.

**I**L primo libro di Archimede sulla sfera e sul cilindro è, tra le non poche opere geometriche originali di questo divino ingegno, il solo che possa presentarsi alla primiera istruzione de' Giovani, che intraprendono la carriera geometrica. Esso forma la continuazione de' Libri XI. e XII. degli Elementi di Euclide, o piuttosto è il complemento della teoria sul cilindro e la sfera, che questo Geometra aveva cominciata a trattare nel XII. Libro, ordinando e dimostrando alla sua maniera alcune importanti verità, che riguardano il rapporto di tali solidi, le quali erano state scoperte da Eudosso, come si rileva dalla lettera di Archimede a Dositeo, premessa al primo libro sulla sfera e sul cilindro, la quale è stata restituita alla sua integrità, con alcuni manoscritti, dal Professore di letteratura greca Giacomo Moor, coll' assistenza del suo collega Roberto Simson. In un tal libro Archimede intraprende ad assegnare la misura di questi solidi, sì per riguardo alla loro superficie, che per rispetto alla solidità loro; o che sieno interi, o pur tagliati con piani perpendicolari all'asse: e finalmente assegna il rapporto della sfera al cilindro circoscritto, che rinvenne esser lo stesso sì per la superficie, che per la solidità. Ed ei restò sì pago di questa bella scoperta, che, anteponeandola ad infinite altre importantissime da lui fatte, la volle per compagna fin nella tomba.

Queste verità Archimedee essendo state senza dubbio da lui rinvenute col metodo dei limiti, del quale fece tanto uso, e con tanto profitto, non potè egli poi dimostrarle ricalcando il cammino d'invenzione; poichè vi avrebbe in tal caso dovuto includere la considerazione metafisica dell'infinito, che agli accurati Geometri antichi dispiaceva non poco, come lontana dal verò rigore: che perciò dovè servirsi di ripieghi indiretti; e premetterci ancora non pochi lemmi. Or questi lemmi, e queste dimostrazioni di Archimede, sebbene sieno di molto pregio presso i Geometri, per gli molti tratti di sublimità d'ingegno che vi si ravvisano ad ogni passo; pure, non bisogna negarlo, non eran sì facili a comprendersi e ritenersi da' giovani; e questa ragione ha fatto allontanare tutti coloro che hanno esposto un tal libro dal sistema di dimostrare da lui tenuto. Ma la maggior parte di costoro, avendo adottate le teorie dell'infinito, si era di gran lunga allontanata dallo stile elementare, conveniente ad un libro di geometrica istituzione. Intanto fortunatamente è avvenuto, che le medesime ricerche fatte da me, per semplificare alcune dimostrazioni del XII. Libro di Euclide, mi abbiano somministrato il mezzo di conciliare nelle verità Archimedee la semplicità e facilità delle dimostrazioni, col rigor geometrico, ch'era la prima ed essenzial cosa, a cui doveva aversi riguardo. Io mi sono dunque servito per le dimostrazioni di esser di quell'istesso ripiego indiretto, ch'Euclide aveva adottato nella dimostrazione del-

la Proposizione 18. del suo XII. Libro; e del quale mi era avvaluto per dimostrare la 10., 11., e 12. del medesimo Libro. In tal modo ho anche ottenuto un altro vantaggio, quello, cioè, di non far discernere in questi libri elementari la mano dei Geometri diversi che gli avean composti. Nelle Note alla fine di questo volume si potrà più distesamente vedere quello che ho qui accennato; e vi si troveranno anche notate alcune altre necessarie modificazioni da me fatte in alcuni luoghi di questo libro di Archimede. Qui però conviene far osservare, che le superficie curve dei tre corpi rotondi, che Archimede trasmutava speciosissimamente in cerchi, le ho io esibite in rettangoli: poichè in tal modo non solamente riesce più comodo il servirsene nella pratica, ove spesso se ne ha bisogno; ma anche era ciò necessario, per preparare i giovani, i quali debbono percorrere l'intera carriera delle Matematiche, all'applicazione dei Metodi Sommatorj, alla quadratura delle superficie curve, ove non si possono gli elementi di queste esprimere altrimenti, che secondo l'esibizione che ne ho data. Aggiungasi benanche, che in questo modo mi è riuscito più facile l'applicarvi per le dimostrazioni quel principio Euclideo, del quale qui sopra ho parlato. Affinchè però il giovane, imbattendosi a leggere Archimede, non concepisse il minimo dubbio per tal diversità: ed anche per lo motivo, che sì maravigliose trasformazioni non fossero affatto dimenticate, ho rapportato in uno Scolio a ciascuno di quei Teoremi la corri-



spondenza che v'era tra le mie esibizioni, e le Archimedee, riducendo facilmente quelle a queste.

Non avendo poi Archimede esibite le superficie dei corpi rotondi per mezzo di figure rettilinee, ha quindi tralasciato di recar ne' suoi Teoremi la riduzione delle loro solidità a quelle di solidi terminati da piani, contentandosi solamente d'indicare il rapporto, che v'era tra loro, e completando così in certo modo ciò, che aveva intrapreso a fare Euclide nella Proposizione 10 del XII. Libro de' suoi Elementi. Or è chiaro, che da tali riduzioni non si poteva ricavare verun vantaggio per la pratica; e perciò io vi ho aggiunto un teorema, nel quale ho stabilito il rapporto tra una piramide ed un cono: dal quale poi facilmente si deriva la riduzione del cilindro, o della sfera ad un solido terminato da piani.

A questo libro di Archimede ho aggiunto l'altro de *Circuli dimensione*, che con esso formava una sola dottrina; giacchè era necessario per ridurre in pratica le verità che vi si contengono. E siccome dopo tante approssimazioni sì grandi, che si sono ritrovate per la quadratura del cerchio dai moderni Geometri, sarebbe stato strano, che io avessi ritenuta quella di Archimede; perciò ho cercato tra le ultime quella, che fosse più energica, e per la quale non vi fosse bisogno che di soli artifizj elementari di Geometria, e di Aritmetica; e questa mi è sembrata esser quella dell'illustre Geometra Giacomo Gregory, che ho esposta in una maniera semplicissima, e molto adattata alle menti dei giovani.

# IL PRIMO LIBRO DI ARCHIMEDE SULLA SFERA E SUL CILINDRO.

## DEFINIZIONI.

1. **S**E da un punto della circonferenza del semicerchio generatore di una sfera si abbassi la perpendicolare al diametro; ciascuno di que'solidi che vien descritto da uno de' due semisegmenti circolari ne' quali resta diviso il semicerchio, si dirà *segmento sferico*: e l'*altezza* di esso sarà quella parte del diametro, che gli corrisponde nel semisegmento, che lo genera.

2. Il *settore sferico* è quel solido, che si descrive da un settore circolare, il quale si rivolga intorno ad uno de' suoi raggi immobile, finchè ritorni dove cominciò il suo moto.

Un tal solido è composto da un segmento sferico al quale vi sia aggiunto, o pur ne sia tolto quello la cui base è il cerchio, ch'è base di esso segmento, ed il vertice è il centro della sfera.

3. Il *rombo conico* è quel solido, che si descrive da un triangolo qualunque, il quale si rivolga intorno ad un suo lato, che comprende angoli acuti con ciascuno dei rimanenti.

E' chiaro che un tal solido sia composto da due coni, i quali hanno una base comune, ed i loro assi per dritto.

## P R I N C I P J .

1. La linea retta è la più breve di quante linee si tirano da un punto ad un altro .

2. Le due tangenti , che da un punto preso fuori di un cerchio si conducono al cerchio sono maggiori dell' arco circolare , che resta tra i contatti .

3. Il piano è la minima di tutte le superficie che hanno gli stessi termini .

4. Se vi sieno due superficie comunque composte da altre superficie curve , o piane , ed esse sieno concave verso uno stesso piano , nel quale hanno comune il loro termine : di queste sarà sempre minore quella , ch' è compresa , tuttoché avesse coll' altra una parte comune .

## P R O P O S I Z I O N E I.

## T E O R E M A .

*Se s' iscriva un poligono in un cerchio ; il perimetro di questo poligono iscritto sarà minore della circonferenza del cerchio .*

Ciò è chiaro ; poichè ciascun lato di un tal poligono e minore dell' arco , che da esso è sotteso \* .

## P R O P O S I Z I O N E II.

## T E O R E M A .

*Se si circoscriva un poligono ad un cerchio ; il perimetro di questo poligono circoscritto è maggiore della circonferenza del cerchio .*

fig. 57. Al cerchio BFL vi si circoscriva il poligono AKGEC : dico che il perimetro di un tal poligono sia maggiore della circonferenza del cerchio .

Poichè le tangenti BA , AL sono maggiori dell' arco BL , ch' è tra i contatti \* ; è simil-

te le tangenti BC, CD sono maggiori dell' arco BD; le DE, EF maggiori dell'arco DF; le FG, GH maggiori dell'arco FH; e le HK, KL maggiori dell'arco HL: perciò l' intero perimetro del poligono è maggiore della circonferenza del cerchio . C. B. D.

## P R O P O S I Z I O N E III.

## T E O R E M A .

*Ogni cerchio è uguale ad un triangolo rettangolo , di cui un lato intorno all' angolo retto , rappresenti la circonferenza del cerchio , e l' altro sia uguale al raggio .*

Sia il cerchio ABCD descritto col raggio OA , *fig. 58.* ed intorno al centro O; ed un lato XY, che comprende l'angolo retto in X del triangolo rettangolo ZXY , rappresenti la circonferenza del cerchio ABCD , l' altro lato ZX sia uguale al raggio OA: dico che questo triangolo ZXY sia uguale al cerchio ABCD .

Poichè se il triangolo ZXY non è uguale al cerchio ABCD , dovrà pareggiare un cerchio minore di ABCD, o pur maggiore . Suppongasì primieramente uguale ad un cerchio minore di ABCD, e sia questo l' altro , *abcd* descritto intorno allo stesso centro O. S'isciva nel cerchio maggiore ABCD un poligono AEBFCec. di un numero pare di lati uguali , il qual non tocchi il cerchio minore *abcd*: è chiaro , che se dal centro O si tirino i raggi ai vertici degli angoli di questo poligono ,

- resterà esso diviso in tanti triangoli , quanti sono i suoi lati: e poichè le perpendicolari, che dal centro  $O$  si abbassano su i lati uguali del poligono iscritto nel cerchio, sono uguali\*; perciò que' triangoli sa-
- \* 14. III. ranno tutti ugualmente alti; e quindi la somma loro, cioè il poligono , dovrà essere uguale ad un solo triangolo, che ha per base la somma delle basi di quelli, cioè il perimetro del poligono, e per altezza la  $OP$ , loro altezza comune. Adunque essendo la circonferenza del cerchio  $ABCD$  maggiore del perimetro del poligono  $AEBFCcc$  iscritto in esso , si tagli dalla  $XY$  la  $Xy$  uguale a questo perimetro , e similmente si prenda sulla  $XZ$  la  $Xz$  uguale alla  $OP$ , ch'è minore del raggio  $OA$ , o sia di  $XZ$ , e poi si congiunga la  $zy$ : sarà il triangolo  $zXy$  uguale al poligono  $AEBFCcc$ . Ma questo triangolo è minore dell'altro  $ZXY$ , che si è supposto pareggiare il cerchio  $abcd$ ; quindi dovrà esser anche il poligono  $AEBFCcc$  minore di un tal cerchio. Lo che ripugna: poichè quel poligono comprende il cerchio  $ABCD$ . E perciò non può il triangolo  $ZXY$  esser uguale ad un cerchio minore di  $ABCD$ .
- Or dico che nè anche possa quel triangolo  $ZXY$  pareggiare un cerchio  $GHLK$  maggiore di  $ABCD$ . Poichè se lo può, suppongasì quel cerchio descritto intorno allo stesso centro  $O$ , e s'iscriva in esso il poligono  $GMHNKcc$  di un numero pare di lati uguali, che non tocchi il cerchio minore  $ABCD$ . E poichè il perimetro di questo poligono è maggiore del perimetro di quell'altro simile ad esso, che si potrebbe circoscrivere al cerchio  $ABCD$ ; e questo è maggiore della circonferenza del cerchio  $ABCD$ ,

e quindi della  $XY$ ; sarà perciò anche il perimetro del poligono  $GMHNKec.$  maggiore della  $XY$ . Ciò posto si prolunghi questa  $XY$  in  $T$ , finchè la  $XT$  sia uguale al perimetro del poligono  $GMHNKec.$ ; e prolungata anche la  $XZ$  in  $R$ , finchè  $XR$  sia uguale alla perpendicolare  $OQ$ , che dal centro  $O$  si abbassa sopra un lato del poligono  $GMHNKec.$ , la quale è maggiore del raggio  $OA$ , si congiunga  $RT$ : sarà il triangolo  $RXT$  uguale al poligono  $GMHNKec.$ . Quindi siccome il triangolo  $RXT$  è maggiore dell'altro  $ZXY$ , anche il poligono  $GMHNKec.$  dovrebbe esser maggiore del cerchio  $GHLK$  nel quale è iscritto. Lo che ripugna. Laonde neppur può il triangolo  $ZXY$  esser uguale ad un cerchio maggiore di  $ABCD$ . Ma qui sopra si è dimostrato, che non poteva quel triangolo pareggiare un cerchio minore dello stesso  $ABCD$ ; dovrà perciò essere uguale a questo cerchio. C. B. D.

Scol. I lati  $XY$ ,  $xy$  dei due triangoli  $ZXY$ ,  $zXy$  rettangoli in  $X$ , rappresentino le circonferenze di due cerchi, e gli altri due lati  $XZ$ ,  $xz$ , che sono anche intorno all'angolo retto, sieno rispettivamente uguali ai raggi degli stessi cerchi; saranno essi triangoli  $ZXY$ ,  $zXy$ , uguali ai cerchi de' raggi  $XZ$ ,  $Xz$  \*; e quindi siccome questi cerchi sono tra loro, come i quadrati de' diametri, o pur de' raggi  $XZ$ ,  $Xz$  \*; perciò dovrà anche stare il triangolo  $ZXY$  al triangolo  $zXy$  come il quadrato di  $XZ$  a quello di  $Xz$ . Ma i triangoli  $ZXY$ ,  $zXy$  sono rispettivamente le metà dei rettangoli di  $ZX$  in  $XY$ , e di  $zX$  in  $Xy$ ; quindi sarà pure il rettan-

\* 3.

\* 2.XII

golo di ZX in XY a quello di  $zX$  in  $Xy$ , come il quadrato di ZX a quello di  $zX$ ; e permutando starà il rettangolo di ZX in XY al quadrato di ZX, come il rettangolo di  $zX$  in  $Xy$  al quadrato di  $zX$ , cioè starà XY a ZX, come  $Xy$  a  $zX$ ; e di nuovo permutando XY ad  $Xy$ , come ZX a  $zX$ . Vale a dire

*Le circonferenze de' cerchi sono tra loro come ; raggi.*

## PROPOSIZIONE IV.

### TEOREMA.

*Se in un cono s' iscriva una piramide a base equilatera ; la superficie di questa piramide , senza la base , è uguale ad un triangolo rettangolo , di cui un lato intorno all' angolo retto sia uguale al perimetro della base della piramide , e l' altro lato sia quanto l' altezza di uno de' triangoli uguali , che formano la detta superficie .*

fig. 59. Sia il cerchio BAC la base di un cono, e'l rettilineo equilatero BAC iscritto in questo cerchio dinoti la base della piramide iscritta nel cono ; e sia inoltre il triangolo rettangolo EFG, di cui un lato FG intorno all' angolo retto è uguale al perimetro del rettilineo BAC, e l' altro lato FE è quanto l' altezza di uno de' triangoli uguali, che contengono quella piramide : dico che questo triangolo EFG pareggi la superficie della piramide, senza la base.

Poichè sono uguali i lati del rettilineo  $ABC$ ; perciò i triangoli che contengono la piramide saranno perfettamente uguali; e per conseguenza avranno anche uguali le loro altezze, e ciascuna di queste verrà rappresentata dalla  $FE$ . Laonde se la  $FG$  si divida nelle  $FH$ ,  $HK$ ,  $KG$  uguali alle  $AB$ ,  $BC$ ,  $CA$ , e si congiungano le  $EH$ ,  $EK$ ; i triangoli  $FEH$ ,  $HEK$ ,  $KEG$  avendo la stessa altezza di quelli, che contengono la piramide, gli saranno uguali: e perciò la somma di questi, cioè la superficie della proposta piramide, senza la base, dovendo pareggiare la somma di quelli, sarà uguale al triangolo  $EFG$ . C. B. D.

## PROPOSIZIONE V.

### TEOREMA.

*Se i punti ne' quali due lati di un cono incontrano la circonferenza della sua base si uniscano con una linea retta; n'emergerà un triangolo, che sarà minore della superficie conica ch'ei sostiene.*

N. B. Chiamasi *lato* del cono l'ipotenusa del triangolo rettangolo generatore di questo solido, qualunque sia il luogo, ov'ella si ritrovi in una tal genesi. E lo stesso potrà dirsi del *lato* del cilindro nella Propos. seguente.

Sieno  $DA$ ,  $DC$  due lati del cono  $BACD$ , ed i *fig. 6a.* punti  $A$ ,  $C$  ne' quali essi incontrano la circon-



ferenza  $BAC$  si congiungano colla  $AC$ : dico che il triangolo  $ADC$  sia minore della superficie conica, ch' ei sottende.

Sia una ~~al~~ superficie quella, ch' è rappresentata dalla  $ABCD$ . Si segli l' arco  $ABC$  per metà in  $B$ , e si uniscano le  $AB$ ,  $BC$ ,  $DB$ : saranno i due triangoli  $ABD$ ,  $BCD$  maggiore del triangolo  $ADC$ (\*).  


---

- fig. 61.* (\*) „ Imperocchè se si costituiscano al centro  $d$   
 „ del cerchio  $acb$  descritto col raggio  $da$  uguale a  
 „  $DA$ , i tre angoli  $adb$ ,  $bdc$ ,  $cde$  uguali rispettiva-  
 „ mente ai tre altri angoli  $ADB$ ,  $BDC$ ,  $CDA$ ; è  
 „ chiaro, che il punto  $e$  non potrà cadere in  $a$ ;  
 „ poichè altrimenti i tre angoli  $adb$ ,  $bdc$ ,  $cde$ , e  
 „ quindi i loro uguali in  $D$  formerebbero quattro  
 \* 21.XI. „ retti \*. Laonde l' arco  $ce$  sarà minore dell' arco  
 „  $cea$ . Ma l' arco  $ce$  è anche minore dell' arco  $cba$ ;  
 „ poichè i due angoli  $cdb$ ,  $bda$  sono maggiori dell'  
 \* 20.XI. „ angolo  $cde$  \*: adunque la corda  $ca$  dev' esser  
 „ maggiore della corda  $ce$ . Or si congiungano le  
 „  $ab$ ,  $bc$ ,  $ce$ , e la  $bd$  incontri la  $ca$  in  $m$ , gli dovrà  
 „ essere perpendicolare: e perciò i due triangoli  
 „  $bdc$ ,  $bda$ , che sono uguali, pareggeranno insie-  
 „ me presi il rettangolo di  $bd$ , loro base comune, in  
 „  $cm$ , altezza di uno di essi. E se si abbassi da  $d$   
 „ sopra  $ce$  la perpendicolare  $dn$ , il triangolo  $dce$ ,  
 „ ch' è doppio dell' altro  $dnc$ , sarà anche uguale  
 „ al rettangolo di  $dn$  base comune alle sue due  
 „ metà  $ndc$ ,  $nde$  in  $nc$  altezza di una di que-  
 „ ste. Per lo che siccome  $cm$  si è dimostrata mag-  
 „ giore di  $cn$ , e che  $db$  è maggiore di  $dn$ ; il primo  
 „ de' detti rettangoli sarà maggiore dell' altro;

Si supponga esser  $H$  l'eccesso di quei due triangoli su di questo ; sarà  $H$  o minore dei segmenti circolari  $AEB$ ,  $BFC$ , o pure non minore.

Sia in primo luogo non minore. E poichè la superficie  $BAED$  composta dalla superficie conica  $AEBD$ , e dal segmento circolare  $AEB$  ha gli stessi termini , che il triangolo  $ABD$  , sarà essa maggiore di questo triangolo \* : Similmente l'altra superficie  $BCFD$  composta dalla superficie conica  $BFCD$ , e dal segmento  $BFC$  è maggiore del triangolo  $BDC$ : e perciò l'intera superficie conica  $ABCD$  insieme coi segmenti circolari  $AEB$ ,  $BFC$  è maggiore dei triangoli  $ADB$ ,  $BDC$ . Ma si è supposto , che lo spazio  $H$  sia non minore di quei segmenti circolari ; quindi la superficie conica  $ABCD$  insieme collo spazio  $H$  è maggiore dei triangoli  $ADB$ ,  $BDC$ , e perciò anche del triangolo  $ADC$  insieme collo spazio  $H$ , la qual somma s'era supposta uguale a quelli triangoli. Laonde , toltone di comune lo spazio  $H$ ; sarà la rimanente superficie conica  $ABCD$  maggiore del triangolo  $ADC$ .

Sia adesso lo spazio  $H$  minore dei segmenti circolari  $AEB$ ,  $BFC$ . Si dividano per metà gli archi  $AB$ ,  $BC$  in  $E$ ,  $F$ , e si uniscano le  $AE$ ,  $EB$ ,  $BF$ ,  $FC$ ; farà ciascuno dei triangoli  $AEB$ ,  $BFC$  maggiore della metà del segmento circolare nel quale consiste: poi chè se si tirino per gli punti,  $E$ ,  $F$  le tan-

---

» cioè i due triangoli  $edb$ ,  $bda$ , o i loro uguali  
 »  $CDB$ ,  $BDA$  saranno maggiori del triangolo  $cde$ ,  
 » o dell' uguale  $CDA$ . Come si è qui sopra as-  
 » sunto .

genti al cerchio, e si compiano i parallelogrammi sulle  $AB$ ,  $BC$ ; ogni triangolo di quelli è la metà di ciascuno di questi parallelogrammi, ch'è maggiore del segmento circolareal quale è circoscritto: che perciò se si continui a dividere in due parti uguali le metà degli archi  $AB$ ,  $BC$ , dovrà finalmente pervenirsi a dei segmenti circolari minori dello spazio  $H^*$ ; sieno questi quelli che insistono sulle linee rette  $AE$ ,  $EB$ ,  $BF$ ,  $FC$ , e si uniscano le  $DE$ ,  $DF$ . E poichè la superficie  $EAGD$  composta dalla superficie conica  $AGED$ , e dal segmento circolare  $AGE$  è maggiore del triangolo  $ADE$ ; e che l'altra superficie  $BEMD$  è maggiore del triangolo  $EDB$ : sarà perciò tutta la superficie  $MBEAGD$ , che componesi dalla superficie conica  $AEBD$ , e dai segmenti circolari  $AGE$ ,  $EMB$  maggiore dei triangoli  $ADE$ ,  $EDB$ . E quindi essendo i triangoli  $AED$ ,  $DEB$  maggiori del triangolo  $ABD$ ; sarà molto più la superficie  $MBEAGD$ , maggiore del triangolo  $ADB$ . Per la stessa ragione, anche la superficie  $KBFCLD$  è maggiore del triangolo  $BDC$ . Quindi le due superficie  $MBEAGD$  e  $KBFCLD$ , cioè la superficie conica  $ABCD$ , insieme coi segmenti circolari  $AGE$ ,  $EMB$ ,  $BKF$ ,  $FLC$  sarà maggiore dei triangoli  $ABD$ ,  $DBC$ . Ma questi triangoli sono uguali al triangolo  $ADC$  insieme collo spazio  $H$ ; e quei segmenti, che abbiamo nominati, sono minori di esso spazio  $H$ : perciò la rimanente superficie conica  $ABCD$  è maggiore del triangolo  $ADC$ . C. B. D.

*COR.* Quindi se s'iscrive in un cono una piramide; la superficie di questa è minore della superficie del cono, non considerandovi le loro basi.

Poichè ciascuno dei triangoli , che comprendono la piramide è minore della superficie conica , che esso sottende .

## PROPOSIZIONE VI.

### TEOREMA.

*Se al cerchio ch'è base di un cono si tirino due tangenti , le quali s' incontrino fra loro ; i triangoli , che avranno per basi queste tangenti , e per vertice quello del cono saranno maggiori della superficie conica , che da essi si comprende .*

Sia il cerchio  $ACB$  la base di un cono , che ha *fig. 62.* per vertice il punto  $E$  ; e ad un tal cerchio si tirino le due tangenti  $AD$ ,  $CD$  , le quali s' incontrino in  $E$ , e si uniscano le  $AE$ ,  $DE$ ,  $EC$  : dico che i triangoli  $AED$ ,  $DEC$  sieno maggiori della superficie conica  $ABCE$  contenuta dai lati  $AD$ ,  $DC$  del cono , e dall' arco  $ABC$  .

Si divida quest'arco  $ABC$  per metà in  $B$ , e per  $B$  si tiri al cerchio  $ACB$  la tangente  $GBF$ , la quale incontri le  $AD$ ,  $DC$  in  $G$ ,  $F$  ; sarà questa tangente parallela alla corda  $AC$  tirata fra i contatti  $A$ ,  $C$  : finalmente si congiungano le  $EE$ ,  $EG$ . E poichè le  $FD$ ,  $DG$  sono maggiori di  $FG$ , aggiuntevi di comune le  $AG$ ,  $CF$ , saranno le  $AD$ ,  $DC$  maggiori delle  $AG$ ,  $GF$ ,  $FC$ . Or la tangente  $AD$  è perpendicolare al raggio  $AO$  del cerchio  $ACB$ , e questo raggio è la comune sezione di un tal cerchio, ch'è base del cono, e del triangolo  $AOE$ ,

— che lo descrive; che perciò la DA dovrà esser  
 \*d.4.XI. perpendicolare al piano del triangolo AOE\*, e  
 quindi alla AE, che esiste in un tal piano: e similmente si dimostrerà, che ogn' altro lato EB, EC del cono sia perpendicolare alla tangente il cerchio ACB nel suo estremo B, C. Quindi i triangoli EAD, ECD, AEG, GEF, FEC hanno tutti la stessa altezza, cioè il lato del cono; e perciò i due primi staranno agli altri tre, come AD, DC ad AG, GF, FC; la qual cosa si dimostra facilmente. Per lo che essendo le AD, DC maggiori delle AG, GF, FC, saranno anche i triangoli AED, DEC maggiori dei triangoli AEG, GEF, FEC. Dinoti lo spazio H l' eccesso di quei due primi triangoli su questi tre altri: potrà H esser minore de' trilinei AGB, BFC, compresi dalle tangenti AG, GF, FC, e dagli archi circolari AB, BC tra i contatti, o pur non minore.

Sia primieramente H non minore di questi trilinei. E poichè i triangoli AEG, GEF, FEC, ed il quadrilatero AGFC compongono una superficie; e questa, e l'altra superficie, che si compone dalla superficie conica ABCE, e dal segmento circolare ABE hanno gli stessi termini nel piano AEC, cioè i lati del triangolo AEC, e sono entrambe rivolte colla loro concavità verso questo piano; perciò sarà quella prima superficie maggiore della seconda\*. Laonde toltone di comune il segmento circolare AEC resterà la somma dei triangoli AEG, GEF, FEC, e de' trilinei AGB, BFC maggiore della superficie conica ABCE.

\* pr. 4.

Ma lo spazio  $H$  si è supposto non minore de' trilinei  $AGB$ ,  $BFC$ ; dunque sarà anche la somma di quei tre triangoli, e dello spazio  $H$  maggiore della superficie conica  $ABCE$ ; e perciò siccome quei tre triangoli insieme collo spazio  $H$  erano uguali ai due triangoli  $AED$ ,  $DEC$ ; così anche questi saranno maggiori della superficie conica  $ABCE$ .

Che se lo spazio  $H$  si supponga minore de' trilinei  $AGB$ ,  $BFC$ ; si biseghino gli archi  $AB$ ,  $BC$  nei punti  $K$ ,  $L$ , per gli quali si tirino al cerchio  $ACB$  le tangenti  $MN$ ,  $XR$ ; queste taglieranno da essi trilinei  $AGB$ ,  $BFC$  i triangoli  $MGN$ ,  $XFR$ , che ne sono più che la metà. Imperocchè se congiungasi  $AK$ , essendo  $AM$  uguale ad  $MK$ , ed  $MK$  minore di  $MG$ , sarà anche  $AM$  minore di  $MG$ , e quindi il triangolo  $GKM$  essendo maggiore dell'altro  $MKA$ , è molto più che la metà del trilineo  $GKA$ ; e così pure dimostrando, che il triangolo  $GKN$  sia più che la metà del trilineo  $GKB$ , ne segue che l'intero triangolo  $MGN$  sia più che la metà del trilineo  $AGB$ : e similmente si dimostra che il triangolo  $XFR$  sia più che la metà del trilineo  $BFC$ . Se dunque si continuino a dividere per metà gli archi  $AK$ ,  $KB$ ,  $BL$ ,  $LC$ , e si tirino le tangenti al cerchio  $ACB$ , si dovrà pervenire finalmente a de' trilinei minori dello spazio  $H$ . Sieno questi i trilinei  $AMK$ ,  $KNB$ ,  $BXL$ ,  $LRC$ , e si congiungano le  $ME$ ,  $NE$ ,  $XE$ ,  $RE$ . Si dimostrerà come poc' anzi, che i triangoli  $AEG$ ,  $GEF$ ,  $FEC$  sieno maggiori dei triangoli  $AEM$ ,  $MEN$ ,  $NEX$ ,  $XER$ ,  $REC$ ; poichè le basi  $AG$ ,  $GF$ ,  $FC$  di quelli, insieme prese, sono maggiori

della somma delle basi  $AM$ ,  $MN$ ,  $NX$ ,  $XR$ ,  $RC$  di questi, e l'altezza loro comune è il lato del cono: e che la superficie composta dai triangoli  $AEM$ ,  $MEN$ ,  $NEX$ ,  $XER$ ,  $REC$ , e dal rettilineo  $AMNXRC$ , avendo gli stessi termini nel piano  $AEC$  coll'altra superficie composta dal segmento circolare  $ABC$ , e dalla superficie conica  $ABCE$ , e comprendendola, ne sia maggiore. Che perciò togliendone di comune il segmento circolare  $ABC$ , resteranno i triangoli  $AEM$ ,  $MEN$ ,  $NEX$ ,  $XER$ ,  $REC$  insieme co' trilinei  $AMK$ ,  $KNB$ ,  $BXL$ ,  $LRC$  maggiori della superficie conica  $ABCE$ . Ma quei trilinei si erano supposti minori dello spazio  $H$ ; quindi anche la somma dei triangoli  $AEM$ ,  $MEN$ ,  $NEX$ ,  $XER$ ,  $REC$ , e di  $H$ , cioè i triangoli  $AEG$ ,  $GEF$ ,  $FEC$ , presi insieme, saranno maggiori della superficie conica  $ABCE$ . E finalmente dovrà molto più la somma de' due triangoli  $AED$ ,  $DEC$ , che sono maggiori dei triangoli  $AEG$ ,  $GEF$ ,  $FEC$ , esser maggiore della stessa superficie conica  $ABCD$ . C.B.D.

**COR.** Si rileva da ciò, che *la superficie di una piramide circoscritta ad un cono, sia maggiore della superficie del cono, non considerando le loro basi.*

Poichè si è dimostrato, che i due triangoli che hanno per basi le tangenti il cerchio base del cono, le quali s'incontrano, e per vertice quello del cono sono maggiori della superficie conica, che resta tra essi. E così continuandosi a dimostrare, se ne conchiuderà ciò che si è enunciato.

Di più, che *se vi sia un'altra piramide la qua-*

le abbia anche per vertice quello del cono , e per base un poligono simile a quello, ch'è base della piramide circoscritta al cono , e maggiore di esso ; la superficie di quest' altra piramide , sarà pure maggiore di quella del cono , non considerandovi le loro basi .

Poichè è chiaro , che ciascun triangolo di questa seconda piramide è maggiore del corrispondente nella prima, per averne la base, e l' altezza maggiore .

## PROPOSIZIONE VII.

### TEOREMA .

*Se si congiungano gli estremi corrispondenti di due lati di un cilindro; n'emergerà un quadrilatero minore della superficie cilindrica, ch'esso sottende .*

Sia il cerchio AEB la base di un cilindro , e *fig. 63.* CFD il piano opposto ad esso . Sieno inoltre AC, BD due lati di questo solido , ed AB , CD le congiungenti i loro termini corrispondenti : dico che il quadrilatero ABCD sia minore della superficie cilindrica AEBDFC , ch' esso sottende .

Si dividano per metà i due archi AB , CD nei punti E , F ; e si uniscano le AE , EB , CF , FD . E poichè le AC , BD sono uguali , e parallele all' asse del cilindro , saranno uguali , e parallele tra loro ; e perciò la figura ABDC è un parallelogrammo, il quale è chiaro che sia rettan-



golo, ed abbia la stessa altezza del cilindro: e similmente si dimostra, che sieno parallelogrammi rettangoli le figure  $AF$ ,  $FB$ , e che abbiano per loro altezza quella del cilindro. Laonde i tre rettangoli  $AF$ ,  $FB$ ,  $AD$  sono ugualmente alti; e perciò staranno i due rettangoli  $AF$ ,  $FB$ , presi insieme, all' altro  $AD$ , come  $AE$ ,  $EB$  ad  $AB$ . Ma la somma delle  $AE$ ,  $EB$  è maggiore di  $AB$ : adunque anche i rettangoli  $AF$ ,  $FB$  saranno maggiori del rettangolo  $AB$ . Dinoti lo spazio  $H$  l'eccesso di quelli su questo: sarà un tale spazio  $H$  o minore dei segmenti circolari  $AGE$ ,  $EKB$ ,  $CLF$ ,  $FMD$ , o pur non minore.

Sia primieramente non minore. E poichè la superficie  $GEACFL$  composta dalla superficie cilindrica, ch' è tra le  $CA$ ,  $FE$ , e dai segmenti circolari  $AGE$ ,  $CLF$  è maggiore del rettangolo  $ACFE$  con cui ha gli stessi termini\*, cioè le linee rette  $AC$ ,  $CF$ ,  $FE$ ,  $EA$ : e che similmente l'altra superficie  $KEBDFM$  è maggiore del rettangolo  $EBDF$ ; perciò le due superficie  $GEACFL$ ,  $KEBDFM$ , prese insieme, cioè la superficie cilindrica  $AEBDFC$ , ch' è sottesa dal rettangolo  $ABDC$ , insieme coi segmenti circolari  $AGE$ ,  $EKB$ ,  $CLF$ ,  $FMD$  sarà maggiore dei rettangoli  $AF$ ,  $FB$ . Ma questi rettangoli sono uguali all' altro  $ACDB$  insieme collo spazio  $H$ : quindi la superficie cilindrica  $AEBDFC$  insieme con quei segmenti circolari, sarà maggiore del rettangolo  $ACDB$  insieme con  $H$ . È poi  $H$  maggiore dei segmenti circolari; perciò dovrà quella rimanente superficie cilindrica esser maggiore del rettangolo  $ACDB$ ,

Sia ora lo spazio  $H$  minore di quei segmenti circolari. Si divida per metà ciascun arco  $AE$ ,  $EB$ ,  $CF$ ,  $FD$ , poi le loro metà dividansi anche in due parti uguali, e ciò si continui a fare, finchè vi restino dei segmenti circolari minori dello spazio  $H$  : sieno questi quelli, che insistono sulle linee  $AG$ ,  $GE$ ,  $EK$ ,  $KB$ ,  $CL$ ,  $LF$ ,  $FM$ ,  $MD$ . Dimostreremo, come nella parte precedente, che i rettangoli  $AL$ ,  $GF$ ,  $EM$ ,  $MB$  sieno maggiori degli altri  $AF$ ,  $FB$ ; e che le superficie cilindriche, che sono comprese tra i lati  $AC$ ,  $GL$ ;  $GL$ ,  $EF$ ;  $EF$ ,  $KM$ ;  $KM$ ,  $BD$  insieme coi segmenti circolari, che hanno per corde le  $AG$ ,  $GE$ ,  $EK$ ,  $KB$ ,  $CL$ ,  $LF$ ,  $FM$ ,  $MD$ , cioè l'intera superficie cilindrica, ch'è tra le  $AC$ ,  $BD$  insieme con quei segmenti circolari, sia maggiore dei rettangoli  $AL$ ,  $GF$ ,  $EM$ ,  $MB$ , e quindi anche degli altri  $AF$ ,  $FB$ , ossia del rettangolo  $ACDB$  insieme collo spazio  $H$ . Per lo che essendo quei segmenti circolari minori dello spazio  $H$ : dovrà la rimanente superficie cilindrica  $AEBDFC$  esser maggiore del rettangolo  $ACDB$ . C. B. D.

*COR. Quindi se s'iscriva un prisma in un cilindro; la superficie del prisma è minore della superficie del cilindro, non considerandovi le loro basi.*

Imperocchè ciascun parallogrammo, che compone la superficie del prisma, è minore della superficie cilindrica, ch'è costituita su di esso.

## PROPOSIZIONE VIII.

## TEOREMA.

*Se per gli estremi di due lati di un cilindro, si tirino le tangenti ai cerchi, che sono le basi di questo solido, le quali s' incontrino fra loro: unendo questi punti di concorso n' emergeranno due rettangoli maggiori della superficie cilindrica compresa tra essi .*

fig. 64. Sia il cerchio ACB una delle basi di un cilindro, e CG, AE sieno due suoi lati: per gli estremi A, C, E, G de' quali sieno tirate ai cerchi ACB, EGF, basi del cilindro, le tangenti AD, CD; EH, GH, che s' incontrino fra loro in D, ed H; e questi punti si uniscano colla DH: dico che i quadriletari DCGH, DAEH sieno due rettangoli, i quali insieme presi sono maggiori della superficie cilindrica, ch' essi comprendono, cioè di quella, ch' è terminata dai lati EA, GC, e dagli archi ABC, EFG.

Si tirino le AC, EG fra i contatti. E poichè le EH, AD sono perpendicolari al lato AE del cilindro, esse saranno tra loro parallele; e per la stessa ragione sono anche parallele le GH, CD. Laonde l'angolo EHG è uguale all'angolo ADC; e perciò i triangoli isosceli EHG, ADC, avendo uguali le loro basi AC, EG, ed il loro angoli verticali, e quindi quelli che sono adjacenti alle basi, saranno perfettamente

uguali. Adunque  $EH$  è uguale ad  $AD$ : ma gli era pure parallela, perciò il quadrilatero  $ADHE$  è un parallelogrammo: e lo stesso può dirsi dell' altro  $DCGH$ ; ed è poi chiaro, ch' essi sieno rettangoli ugualmente alti, che il cilindro. Ciò posto, si biseghino gli archi  $ABC$ ,  $EFG$  in  $B$ ,  $F$ , e per questi punti si tirino ai cerchi  $ACB$ ,  $EGF$  le tangenti  $KBL$ ,  $IFM$ , e si congiungano le  $IK$ ,  $LM$ . Si dimostrerà come poc' anzi, che i quadrilateri  $EAKI$ ,  $IKLM$ ,  $LMGC$  sieno rettangoli: e siccome le basi  $DA$ ,  $DC$  de' due rettangoli  $DE$ ,  $DG$  sono maggiori delle basi  $AK$ ,  $KL$ ,  $LC$  de' tre altri rettangoli  $KG$ ,  $KM$ ,  $LG$ ; perciò que' due saranno maggiori di questi tre. Sia lo spazio  $O$  l' eccesso di quelli su questi; sarà questo spazio  $O$  o minore dei trilinei  $CLB$ ,  $BKA$ ,  $GMF$ ,  $FIE$ , o pur non minore.

Sia in primo luogo non minore. E poichè la superficie, che si compone dai tre rettangoli  $AI$ ,  $IL$ ,  $LG$ , e dai quadrilateri  $EIMG$ ,  $AKLC$  ha gli stessi termini nel piano  $EACG$  coll' altra superficie, che si compone dalla superficie cilindrica, ch' è tra i lati  $EA$ ,  $GC$  del cilindro, e gli archi  $EFG$ ,  $ABC$ , e dai segmenti circolari  $EFG$ ,  $ABC$ ; e che di più la prima, e la seconda sono entrambe concave verso un tal piano  $EACG$ , e quella comprende questa; perciò la prima sarà maggiore della seconda \* . Laonde togliendone di comune i segmenti circolari  $ABC$ ,  $EFG$ , resteranno i tre rettangoli  $AI$ ,  $KM$ ,  $LG$  insieme co' trilinei  $EIF$ ,  $FMG$ ,  $AKB$ ,  $BLC$  maggiori della superficie cilindrica, ch' è racchiusa

\* pr. 4.

dalle EA; GC, e dagli archi EFG, ABC. Ma lo spazio O si è supposto non minore di quei quattro trilinei; quindi sarà anche la somma dei tre rettangoli AI, KM, LG, e di O maggiore della stessa superficie cilindrica: e siccome quei tre rettangoli insieme con O, pareggiavano i due rettangoli DE, DG; così saranno anche questi maggiori della superficie cilindrica ABCGFE.

Che se lo spazio O si supponga minore de' trilinei AKB, BLC, EIF, FMG; allora si biseghino continuamente gli archi AB, BC, EF, FG, e si tirino ad essi le tangenti, finchè si pervenga a de' trilinei minori dello spazio O; e poi il resto della dimostrazione si continui, come nella Prop. 7.

Con. Quindi si rileva che la *superficie di un prisma circoscritto ad un cilindro sia maggiore della superficie del cilindro, non considerandovi le loro basi.*

Poichè si è dimostrato, che due rettangoli, che toccano un cilindro, ed hanno da una parte un lato comune, e dall'altra sono terminati da due lati del cilindro, sono maggiori della superficie cilindrica ch'essi comprendono; e così continuando a dimostrare, se ne conchiuderà ciò che si è detto.

Di più la *superficie di un altro prisma ugualmente alto, che comprende quello, che tocca il cilindro, e che ha per basi de' rettilinei simili a quelli che sono basi del primo, sarà anche maggiore della superficie cilindrica.*

Poichè ciascun rettangolo, che termina questo secondo prisma è maggiore del corrispondente, che termina il primo; mentre la base è maggiore della base, e l'altezza è la stessa,

## PROPOSIZIONE IX.

## TEOREMA.

*La superficie di un cilindro senza le basi, è uguale al rettangolo contenuto da una linea retta, che rappresenta la circonferenza della base di un tal cilindro, e da un suo lato.*

Il cerchio ABCD dinoti la base di un cilindro, il cui asse sia OV, che dinoterà anche un qualunque lato di un tal cilindro; e sia il rettangolo ZY contenuto da XY, che rappresenti la circonferenza del cerchio ABCD, e da ZX uguale ad OV: dico che questo rettangolo sia uguale alla superficie del cilindro senza le basi.

Poichè se il rettangolo ZY non è uguale alla superficie del cilindro, che ha per base il cerchio ABCD, e per asse OV; dovrà pareggiare la superficie di un cilindro descritto collo stesso asse, e che abbia per base un cerchio minore del cerchio ABCD, o pur maggiore. Pareggi in primo luogo quella del cilindro; la cui base è il cerchio *abcd* minore di ABCD, e concentrico. S'iscriva nel cerchio maggiore ABCD un poligono AEBFCec. di un numero pare di lati uguali, il quale non tocchi il cerchio minore *abcd*, e poi s'intenda eretto su di questo poligono un prisma dell'altezza del cilindro. E poichè il perimetro di un tal poligono è minore della circonferenza del cerchio ABCD \*, la quale si è rap- \* p. 1.

presentata colla retta  $XY$ , si tagli da questa la  $Xy$  uguale a quel perimetro, e si compia il rettangolo  $Zy$ : sarà questo rettangolo, com'è chiaro, uguale alla superficie di quel prisma; e perciò maggiore della superficie del cilindro descritto sul cerchio  $abcd$ \*, e quindi anche del rettangolo  $ZY$ , che si è supposto uguale a questa superficie cilindrica. Lo che ripugna. Non può dunque il rettangolo  $ZY$  pareggiare la superficie di un cilindro, che abbia lo stesso asse  $OV$  del proposto, ed una base minore del cerchio  $ABCD$ .

\* c. p. 8.

Sia dunque un tal rettangolo  $ZY$  uguale alla superficie di un altro cilindro anche descritto collo stesso asse  $OV$ , ed avente per base il cerchio  $GHLK$  maggiore di  $ABCD$ , e concentrico. S'intenda similmente iscritto in questo cerchio  $GHLK$  un poligono  $GMHNKec.$  di un numero pare di lati uguali, il quale non tocchi l'altro cerchio  $ABCD$ ; e su di esso si eriga poi un prisma dell'altezza  $OV$ , che verrà ad essere iscritto in quel cilindro. Ciò posto, essendo il perimetro del poligono  $GMHNKec.$  maggiore della circonferenza del cerchio  $ABCD$ , e perciò anche della retta  $XY$ , che la rappresenta; si produca la  $XY$  in  $T$  finchè  $XT$  pareggi un tal perimetro, e compiasi il rettangolo  $ZT$ , sarà, come è chiaro, un tal rettangolo uguale alla superficie di quel prisma; e quindi minore della superficie del cilindro descritto sul cerchio  $GHLK$ \*, e perciò anche del rettangolo  $ZY$ , che si è supposto uguale a questa. Lo che anche è un assurdo.

\* c. p. 7.

Laonde non potendo il rettangolo  $ZY$ , contenu-

to dalla linea retta  $XY$ , che rappresenta la circonferenza del cerchio  $ABCD$ , e dall'altra  $ZX$  ch'è quanto la  $OV$ , esser uguale alla superficie di un cilindro descritto coll'asse  $OV$ , la cui base sia un cerchio minore di  $ABCD$ , o pur maggiore; dovrà necessariamente pareggiare quella del cilindro di questa base  $C. B. D.$

## PROPOSIZIONE X.

### TEOREMA.

*La superficie di un cilindro senza le basi sta ad una di queste, come il doppio lato del cilindro al raggio di una sua base.*

Sia un cilindro che abbia per asse la linea retta  $AC$ , ed  $AE$  esprima il raggio della sua base: dico che debba stare la superficie del cilindro ad uno dei cerchi, che ne sono le basi, come la doppia  $AC$  ad  $AE$ . fig. 66.

La linea retta  $AB$  rappresenti la circonferenza del raggio  $AE$ , ed essa si applichi perpendicolarmente alla  $AC$  nel suo estremo  $A$ , e si compia il rettangolo  $CB$ ; sarà questo uguale alla superficie del cilindro\*; e se congiungasi  $AE$ , il triangolo rettangolo  $EAB$  sarà uguale al cerchio ch'è la base di esso cilindro\*. Or se si prolunghi  $AC$  finchè  $AD$  ne sia doppia, e si congiunga  $BD$ ; è chiaro che il triangolo  $BAD$  pareggiando il rettangolo  $CB$ , sia al par di questo uguale alla superficie del proposto cilindro. Ma il triangolo  $DAB$  sta al

\* p. 9.  
\* p. 3.



— triangolo EAB, come DA ad EA, cioè come il doppio di CA ad EA. Dunque è vero, che la superficie del cilindro, che ha per asse CA, e per base il cerchio del raggio EA sta a questo cerchio, come il doppio dell' asse, ossia di un lato del cilindro, al raggio della base. C. B. D.

Scol. Fra CA; che dinota il lato del cilindro, e la doppia AE, ch' è il diametro della base si ritrovi la media proporzionale M; sarà il quadrato di M uguale al rettangolo di CA nella doppia AE, e perciò anche all'altro della doppia CA, cioè DA, in AE; giacchè questi due rettangoli sono uguali, per aver le basi reciprocamente proporzionali alle altezze: e perciò sarà anche DA ad M, come M ad AE, ossia come il cerchio del raggio M all' altro del raggio AE\*. E quindi, poichè AD sta ad AE, come il triangolo DAB al triangolo EAB, starà anche quel triangolo a questo, come il cerchio del raggio M a quello del raggio AE. Ma il cerchio del raggio AE è uguale al triangolo EAB, poichè la AB rappresenta la circonferenza di esso, e la AE è quanto il raggio\*. Dunque anche il triangolo DAB dovrà pareggiare l' altro cerchio del raggio M. Ma quel triangolo si è detto essere uguale alla superficie del cilindro. Adunque

*La superficie di un cilindro, senza le basi, è uguale al cerchio il cui raggio è la media proporzionale tra'l lato di un tal cilindro e'l diametro della sua base.*

E questa è l' esibizione della superficie di un cilindro secondo Archimede.

## PROPOSIZIONE XI.

## TEOREMA.

*La superficie di un cono, senza la base, è uguale ad un triangolo rettangolo, di cui i lati intorno all'angolo retto, uno rappresenti la circonferenza della base di un tal cono, e l'altro sia quanto un lato di questo solido.*

Sia il cerchio ABCD la base di un cono, ed *fig. 67.* OV il suo asse, VB un suo lato; e sia il triangolo rettangolo ZXY, di cui un lato XY intorno all'angolo retto rappresenti la circonferenza del cerchio ABCD, l'altro XZ sia quanto VB: dico che questo triangolo debba pareggiare la superficie del cono ABCDV.

Poichè se un tal triangolo non è uguale alla superficie di questo cono; potrà suppersi pareggiar quella di un altro cono descritto collo stesso asse, e che abbia per base un cerchio minore di ABCD, o pur maggiore. Sia primieramente uguale alla superficie di quel cono, che ha l'asse stesso OV, e per base il cerchio *abcd*, minore dell'altro ABCD, e descritto intorno allo stesso centro O. S'isciva nel cerchio maggiore ABCD un poligono AEBFCec., di un numero pare di lati uguali, il quale non tocchi il cerchio minore *abcd*\*; <sup>1.2.XII.</sup> e poi s'intenda su di questo poligono eretta la piramide, che ha per vertice il punto V, la quale verrà ad essere iscritta nel cono ABCDV. Di poi

- dal vertice  $V$  di questa piramide su di un lato  $EB$  della sua base si abbassi la perpendicolare  $VP$ , che sarà minore, com'è chiaro, del lato  $VB$  del cono; e si tagliu dalle  $XY$ ,  $XZ$ , le  $Xy$ ,  $Xz$  rispettivamente uguali al perimetro del poligono  $AEBFCec$ , ed alla  $VP$ , e si congiunga la  $zy$ : sarà il triangolo  $zXy$  uguale alla superficie della piramide  $AEBFCec.V$  \*. Or la superficie di questa piramide è maggiore di quella del cono  $abcdV$  ch'essa comprende \*; e si è supposto che questa superficie conica pareggi il triangolo  $ZXY$ : adunque dovrebb'essere il triangolo  $zXy$  maggiore dell'altro  $ZXY$ . Lo che ripugna. Non può dunque il triangolo  $ZXY$  pareggiare la superficie di un cono descritto coll'asse  $OV$ , e che abbia per base un cerchio minore di  $ABCD$ .

- Sia dunque un tal triangolo  $ZXY$  uguale alla superficie di un altro cono  $GHLV$ , che abbia lo stesso asse  $OV$ , e la cui base  $GHL$  sia un cerchio maggiore di  $ABCD$ , e concentrico. S'iscriva nel cerchio maggiore  $GHL$  un poligono  $GMHNKec$ , di un numero pare di lati uguali, il quale non tocchi il cerchio minore  $ABCD$ , e sopra un tal poligono s'intenda eretta la piramide, che ha per vertice il punto  $V$ , la quale essendo iscritta nel cono  $GHLV$ , avrà una superficie minore di quella di un tal cono \*, cioè del triangolo  $ZXY$ . Ciò posto, dal vertice  $V$  di questa piramide si abbassi su di un lato  $MH$  della sua base la perpendicolare  $VQ$ , che sarà, com'è chiaro, maggiore di  $VB$  lato del cono  $ABCDV$ ; e si prolunghino le  $XY$ ,  $XZ$  in  $T$ , ed in  $R$ , finchè

XT pareggi il perimetro del poligono GMHNKec, il quale è maggiore della circonferenza ABCD, lo che può dimostrarsi come nella Prop. 3., e la XR pareggi la VQ: congiunta RT, sarà il triangolo RXT uguale alla superficie di una tal piramide, e perciò minore del triangolo ZXY. Lo che anche ripugna. Quindi il triangolo ZXY nè pure può essere uguale alla superficie di un cono, che abbia l'asse OV, e per base un cerchio maggiore di ABCD. Ma si è dimostrato, che un tal triangolo nè anche poteva pareggiare la superficie di un cono il quale avesse per asse OV; e per base un cerchio minore di ABCD. Adunque dovrà quel triangolo essere uguale alla superficie del cono ABCDV: C. B. D.

## PROPOSIZIONE XII.

### TEOREMA.

*La superficie di un cono, senza la base, serba a questa la stessa ragione, che un lato di un tal cono al raggio della base.*

Sia un cono, che abbia per lato la linea retta AC, ed AE esprima il raggio della sua base: dico che debba star la superficie di questo cono, senza la base, ad essa base, come AC ad AE. fig. 66.

Rappresenti la linea retta AB la circonferenza del raggio AE, ed essa si applichi perpendicolarmente alla AB, e si congiungano le DB, BE; saranno i triangoli DAB, EAB rispettivamente uguali

- \* p. 11. alla superficie del cono \*, ed a quella della base  
 \* p. 3. di esso \*. E quindi siccome questi due triangoli sono tra loro, come AD ad AE; così sarà anche la superficie di quel cono alla sua base, come AD ad AE, cioè come un lato del cono al raggio della sua base. C. B. D.

- Scol. Tra il lato AD di un cono, ed il raggio AE della sua base si trovi la media proporzionale M, starà AD ad AE in duplicata ragione di M ad AE, cioè come il cerchio del raggio M a quello, che ha AE per raggio. Ma AD sta ad AE, come il triangolo DAB all' altro EAB: quindi anche quel triangolo starà a questo, come il cerchio del raggio M all' altro, che ha AE per raggio. È poi  
 p. 3. il cerchio del raggio AE uguale al triangolo AEB \*. Dunque il cerchio del raggio M sarà uguale al triangolo DAB, cioè alla superficie di quel cono ch'era rappresentata da questo triangolo. Adunque

*La superficie di un cono, senza la base, è uguale al cerchio, che ha per raggio la media proporzionale tra il lato di esso cono, e'l raggio della sua base.*

E questa è la maniera nella quale ha Archimede esibita una tal superficie conica.

### PROPOSIZIONE XIII.

#### TEOREMA.

*Se un cono si seghi con un piano parallelo alla base; la superficie conica, ch'è tra i piani paralleli, sarà uguale al rettangolo contenuto da quella parte del lato del cono, ch'è tra i piani sudetti,*

e da un'altra linea retta, che rappresenti la somma della metà della circonferenza della base del cono, e della metà del perimetro della sezione prodotta dal piano segante.

Sia un cono ABCD descritto dalla rivoluzione *fig. 68*, del triangolo rettangolo DOC intorno al suo lato DO, ed esso cono sia segato dal piano EFG parallelo alla base ABC: dico che la superficie conica, ch'è tra i piani paralleli ABC, EFG sia uguale al rettangolo contenuto dalla GC, e da un'altra linea retta, ch'è uguale alla somma della metà della circonferenza ABC, e della metà del perimetro della sezione EFG.

Dal punto C si elevi CH perpendicolare al lato DC del cono, ed uguale alla circonferenza del cerchio ABC; poi si congiunga DH, e per G si tiri GK parallela a CH. E poichè i piani paralleli ABC, EFG sono segati dal piano DOC, le loro comuni sezioni con questo, cioè le PG, OC saranno parallele\*; e quindi l'angolo DPG è retto al pari del suo interno, ed opposto DOC; e perciò il triangolo DPG rivolgendosi intorno a DP descrive un cono, e PG descrive il cerchio, che n'è base: laonde la sezione EFG è un cerchio. Or essendo simili i triangoli DOC, DPG sta, permutando, OC a PG, come CD a DG: ma CD sta a DG, come CH a GK, per gli altri triangoli simili DCH, DGK; quindi sarà pure CH a GK, come OC a PG, o come la circonferenza del raggio OC a quella del raggio PG\*: e perciò essendosi supposta CH uguale alla cir-

conferenza del raggio OC, sarà anche GK uguale alla circonferenza del raggio PG. Ciò premesso il triangolo DCII è uguale alla superficie del cono ABCD \*; ed il triangolo DGK è uguale alla superficie dell'altro cono EFGD: adunque sarà la differenza di quei due triangoli, cioè il trapezio CGKH uguale alla differenza delle due superficie coniche, cioè alla superficie conica, ch'è tra i piani paralleli ABC, EFG. Ma se si tiri per K la KL parallela alla DC, e si unisca CK; è chiaro che il trapezio CGKH essendo uguale ai due triangoli CKH, CGK, sia quanto la somma dei rettangoli della metà di CH in LK, o CG, e della metà di GK in CG; e quindi uguale al rettangolo di CG nella metà di CH, e GK. Ma queste CH, e GK rappresentano le circonferenze dei cerchi ABC, EFG. Dunque la superficie conica, ch'è tra i piani paralleli ABC, EFG è uguale al rettangolo di CG nella metà della somma delle circonferenze dei cerchi ABC, EFG. C. B. D.

COR. Si divida PO per metà di N, si tiri per N la NM parallela ad OC, ed indi poi per G si tiri GQ parallela a PO; sarà per gli triangoli simili GQC, GRM, e permutando, QG a GR, come QC ad RM, e perciò QC doppia di RM. Ma le OQ, PG, prese insieme, sono il doppio di NR; dunque le OC, PG saranno il doppio di NM: e quindi la circonferenza del raggio NM rappresenterà la metà della somma delle circonferenze dei raggi

\* c. p. 3. OC, PG \*. E perciò

*La superficie conica, ch'è tra i piani paralleli sarà uguale al rettangolo contenuto dalla GC, ch'è*

*la parte del lato del cono, ch'è tra essi piani, e dalla circonferenza di quel cerchio, che ha per raggio la NM, che dal punto medio della PO si tira parallela alla PG, o alla OC.*

Scol. Or se si ritrovi tra CG, ed il doppio della NM, cioè le OC, PG insieme, la media proporzionale X; dovrà il quadrato di X pareggiare il rettangolo di CG nella doppia MN, e quindi quello della doppia CG in MN; i quali rettangoli sono uguali, per aver le basi reciprocamente proporzionali alle altezze. Laonde sarà la doppia CG ad X, come X ad MN, o come la circonferenza del raggio X all'altra, che ha MN per raggio \* : e quindi se si costituissero due triangoli rettangoli, uno dei quali abbia per lati intorno all'angolo retto il doppio di GC, e la circonferenza del raggio MN, e l'altro la X, e la circonferenza del raggio X; questi due triangoli dovrebbero essere uguali \*. Ma il primo di essi \* 15.VI. triangoli, avvegnachè uguale al rettangolo di GC nella circonferenza del raggio MN, pareggia la superficie conica, ch'è tra i piani paralleli \*: e \* p. 3. l'altro è uguale al cerchio del raggio X \*. E \* c.p.13. perciò

*Se un cono si seghi con un piano parallelo alla base, la superficie conica, ch'è tra i piani paralleli, è uguale a quel cerchio, il cui raggio è la media proporzionale tra il doppio lato del cono, ch'è tra questi piani, ed una linea retta uguale ai raggi de' due cerchi, che sono in essi.*

Ed è in questo modo, che Archimede ha esibita la superficie conica, di cui si è parlato.



## PROPOSIZIONE XIV.

## TEOREMA.

*Ogni cono è uguale ad una piramide, la quale abbia per base un rettilineo uguale al cerchio base del cono, e la stess' altezza di questo solido.*

*fig. 69.* Sia il cerchio  $ABCD$  la base di un cono, ed  $OV$  il suo asse, o l'altezza; e la piramide  $PQRS$  abbia per base il rettilineo  $PQR$  uguale al cerchio  $ABCD$ , e la sua altezza  $PS$  pareggi la  $OV$ : dico che quel cono, e questa piramide sieno tra loro uguali.

Imperocchè se la piramide  $PQRS$  non è uguale al cono, che ha per base il cerchio  $ABCD$ , e per altezza  $OV$ ; si supponga pareggiare quell'alto cono ugualmente alto, che ha per base il cerchio  $abcd$  minore di  $ABCD$ , e concentrico. S'iscriva nel cerchio maggiore  $ABCD$  un poligono  $AEBFCec.$  di un numero pare di lati uguali, che non tocchi il cerchio minore  $abcd$ ; e poi su di un tal poligono s'intenda eretta la piramide iscritta nel cono proposto, che sarà perciò di uguale altezza, che l'altra  $PQRS$ ; e quindi dovrà stare quella a questa, come il poligono  $AEBFCec.$  al rettilineo  $PQR$  \*, o al cerchio  $ABCD$ , che si è

\* 6.XII. supposto uguale a questo rettilineo: è perciò siccome il poligono  $AEBFCec.$  è minore del cerchio  $ABCD$  in cui è iscritto; dovrà anche la pirami-

de, che ha per base il poligono AEBFCec. esser minore dell' altra PQRS, vale a dire del cono, che ha per base il cerchio *abcd*, e per altezza la OV, il quale si è supposto uguale alla piramide PQRS. Lo che è impossibile; poichè la piramide, che ha per base il poligono AEBFCcc. comprende un tal cono. Non può dunque la piramide PQRS pareggiare un cono dell' altezza OV, che abbia per base un cerchio minore del cerchio ABCD.

Si supponga in secondo luogo la piramide PQRS essere uguale ad un altro cono, che abbia la stessa altezza OV, e per base il cerchio CHKL maggiore di ABCD, e concentrico. S' iscriva pure in questo cerchio il poligono GMHNKec. di un numero pare di lati uguali, che non tocchi l' altro cerchio ABCD, e su di questo poligono si concepisca eretta la piramide iscritta in quel cono. Ed essendo questa piramide uguale in altezza all' altra PQRS; sarà quella a questa, come la base GMHNKec. alla base PQR\*, cioè al cerchio ABCD: e quindi siccome il\* poligono GMHNKec. è maggiore del cerchio ABCD; dovrà anche la piramide, che ha per base quel\* poligono esser maggiore dell' altra PQRS, o del cono che ha per base il cerchio GHKL, e per altezza OV, al quale questa piramide si era supposta uguale. Ma ciò non può essere; poichè la piramide GMHNKec. V è iscritta in questo cono. Adunque la piramide PQRS nè anche può pareggiare un cono dell' altezza OV, che abbia per base il cerchio GHKL maggiore di ABCD. Si è poc' anzi dimostrato,

che non poteva pareggiare un cono ugualmente alto, la cui base fosse il cerchio *abcd* minore di *ABCD*. Laonde una tal piramide dovrà pareggiare il cono *ABCDV*. C. B. D.

COR. E perciò anche ogni cilindro sarà uguale ad un prisma, che ha per base un rettilineo uguale alla base del cilindro, e per altezza un lato di un tal solido.

Poichè l'uno, e l'altro di questi solidi sono rispettivamente tripli del cono, e della piramide, <sup>\*c.7.XII)</sup><sub>eio.XII.)</sub> che hanno le stesse loro basi, e l'altezza medesima \*.

## PROPOSIZIONE XV.

### TEOREMA.

*Se vi sieno due coni tali, che la superficie di uno sia uguale alla base dell' altro, e la perpendicolare, che dal centro della base di questo si abbassa su di un suo lato, pareggi l'altezza del primo; questi due coni saranno uguali.*

*fig. 70.* Sieno i due coni *ABLC*, *DEMF*, ed il cono *ABLC* abbia la sua base, cioè il cerchio *BLC* uguale alla superficie dell' altro cono *DEMF*, e l'altezza *AG* dello stesso cono *ABLC* pareggi la perpendicolare *HK*, che dal centro della base del cono *DEMF* si abbassa su di un suo lato *DE* dico che questi due coni sieno uguali.

Poichè essendo la base del cono *ABLC* uguale alla superficie dell' altro *DEMF*; dovrà stare la base del cono *ABLC* a quella del cono *DEMF*,

come la superficie di questo stesso cono alla sua base \*. Ma come quella superficie conica a questa base, così sta DE ad EH \*, o pure DH ad HK, per esser simili i triangoli DEH, DHK, o finalmente DH ad AG, che si è supposta pareggiare HK. Quindi come la base del cono ABLC a quella dell' altro DEMF, così sta l' altezza DH di questo all' altezza AG del primo: e perciò i coni ABC, DEF avendo le loro basi reciprocamente proporzionali alle altezze, saranno tra loro uguali \*. C. B. D.

\* 7. V.

\* p. 12.

\* 16. XII.

## P R O P O S I Z I O N E XVI.

## T E O R E M A.

*Ogni rombo conico è uguale ad un cono la cui base è un cerchio uguale alla superficie di uno dei coni, che compongono il rombo, e l' altezza è quanto quella perpendicolare, che si abbassa sopra uno dei lati di questo cono stesso, dal vertice dell' altro cono.*

Sia ABPCD un rombo conico, che abbia per base il cerchio BPC, ed AD per altezza; e si ponga il cono HGQK, che abbia la base, cioè il cerchio GQK uguale alla superficie del cono ABPC, e l' altezza HL quanto la perpendicolare DF, che dal vertice D dell' altro cono DBPC componente il rombo conico, si abbassa sopra il lato AB del cono ABPC: dico che il cono HGQK sia uguale al rombo conico ABPCD. fig. 71.

- Si supponga un altro cono NMRX, che abbia la base MRX uguale alla base BPC del rombo conico, e l'altezza NO quanto la AD. E poichè il cono DBPC
- \*14.XII. sta all'altro ABPC, come DE ad EA \*, sarà componendo il rombo conico ABPCD al cono ABPC, come DA ad AE. Ma sta pure il cono NMRX
- \*14.XII. al cono ABPC, come NO, ossia AD ad AE \*. Dunque il rombo conico ABPCD, e'l cono NMRX serbando al cono ABPC la stessa ragione, dovranno
- \* 9. V. no essere uguali tra loro \*. Or essendosi supposta la base del cono HGQK uguale alla superficie dell' altro cono ABPC; dovrà stare la superficie di questo cono alla sua base, come la base del cono HGQK a quella del cono ABPC, o dell' altro NMRX. Ma la superficie del cono ABPC sta alla
- \* P. 12. sua base, come AB a BE \*, o pure come AD a DF, per esser simili i triangoli ABE, ADF, o finalmente come NO ad HL, le quali rette pareggiano rispettivamente le AD, DF. Dunque starà la base del cono HGQK a quella dell' altro NMRX, come l'altezza NO di questo all'altezza HL del primo: e perciò essi conì saranno uguali \*
- \*15.XII. Li \*. Laonde essendosi dimostrato il cono NMRX uguale al rombo conico ABPCD; sarà un tal rombo anche uguale al cono HGQK. C. B. D.

Cos. Si rileva dalla dimostrazione del precedente teorema, che due, o più conì i quali hanno la medesima base pareggiano un sol cono, che ha la base stessa, e per altezza la somma delle altezze loro.

## PROPOSIZIONE XVII.

## TEOREMA.

*Se un cono si seghi con un piano parallelo alla base , e sul cerchio , che si ottiene da tal sezione s' intenda descritto dalla parte di sotto un altro cono , che abbia per vertice il centro della base del primo ; verrà questo cono a costituire un rombo conico con quell' altro , che il piano segante tronca verso il vertice del cono proposto : e se un tal rombo conico si tolga dall' intero cono ; il solido che rimane sarà uguale a quel cono la cui base è un cerchio uguale alla superficie conica, ch' è tra i piani paralleli , e l' altezza è quanto la perpendicolare, che dal centro della base del cono proposto si abbassa su di' un suo lato.*

Sia il cono ABGC, il qual si seghi con un piano *fig. 72.* parallelo alla base , che faccia la sezione DKE ; ch' è un cerchio \* ; e sopra questo cerchio si \* d. p. 13. concepisca descritto l' altro cono DKEF , il quale abbia per vertice il centro F della base del cono ABGC: dico che se dal cono ABGC si tolga il rombo conico ADKEF; il rimanente solido sia uguale al cono QHRL, la cui base è un cerchio uguale alla superficie conica, ch' è tra i piani paralleli DKE , BGC, e l' altezza è quanto la perpendicolare FH, che si abbassa dal centro F della base del cono ABGC sopra un suo lato AB .

Pongansi i due altri coni NMSX, POTR tali, che

- la base del cono NMSX sia uguale alla superficie del cono ABGC, e l'altezza uguale alla FH; che perciò sarà un tal cono NMSX uguale all'altro
- \* p. 15. ABGC\*. Sia poi la base del cono POTR uguale alla superficie del cono ADKE, e l'altezza anche quanto la FH; sarà un tal cono POTR uguale al rombo conico ADKEF\*. Or i tre coni QHRL, NMSX, POTR hanno la stessa altezza, e perciò sono nella
- \* 11. XII ragione delle basi\*; sarà dunque il cono NMSX uguale ai coni QHRL e POTR, siccome la base del primo è uguale alle basi di questi altri due. Laonde essendo il cono NMSX uguale al cono ABGC, e il cono POTR al rombo conico ADKEF; dovrà il rimanente cono QHRL esser anche uguale al solido che rimane togliendo il rombo conico ADKEF dal cono ABGC. C. B. D.

Con. Dalla precedente dimostrazione si rileva, che due, o più coni, i quali hanno la medesima altezza pareggiano un sol cono dell'altezza stessa, che ha per base un cerchio uguale alla somma delle basi dei coni proposti.

## PROPOSIZIONE XVIII.

### TEOREMA.

*Se uno dei coni, che compongono un rombo conico si seghi con un piano parallelo alla base, e sul cerchio, ch'è la sezione in esso fatta, descrivasi un cono, il quale abbia comune il vertice coll'altro cono, che fa parte del rombo conico; e che poi quel rombo conico, che così si ottiene, si tolga dal*

*proposto: il rimanente solido pareggerà un cono, la cui base è uguale alla superficie, ch'è tra i piani paralleli, e l'altezza è quanto la perpendicolare, che dal vertice dell'altro cono componente il rombo conico proposto si abbassa sopra un lato del primo cono.*

Sia il rombo conico BAGCD, e l'un dei coni *fig. 73.* BAGC, che lo compongono si segli con un piano parallelo alla base, il quale faccia la sezione EQF, ch'è un cerchio, sul quale si descriva il cono, che ha per vertice il punto D: dovrà la differenza de' due rombi conici BAGCD, BEQFD pareggiare il cono KHSL, la cui base è uguale alla superficie conica, ch'è tra i piani paralleli AGC., EQF, e l'altezza sia quanto la perpendicolare DH, che cade dal punto D sulla BA, prolungata se bisogna.

Si pongano i due altri coni NMVX, POTR, e sia la base del cono NMVX uguale alla superficie del cono BAGC, e l'altezza alla DH; che perciò un tal cono NMVX sarà uguale al rombo BAGCD \*: sia poi \* p. 16. la base del cono POTR uguale alla superficie del cono BEQF, e l'altezza quanto la stessa DH, il che renderà questo cono POTR uguale all'altro rombo conico BEQFD. E poichè la superficie del cono BAGC si compone dalla superficie del cono BEQF, e da quella, ch'è tra i piani paralleli EQF, AGC; e la superficie del cono BAGC è uguale alla base del cono NMVX; la superficie del cono BEQF è uguale alla base del cono POTR; e finalmente la superficie, ch'è tra i piani paralleli EQF, AGC, è uguale alla base del cono KHSL: perciò la base del cono NMVX è uguale alle basi dei coni



- POTR, KHSL. Laonde avendo questi conì anche la stess' altezza, sarà il cono NMVX uguale ai conì
- \* c.p.17. KHSL, POTR \*. Ma il cono NMVX è uguale al rombo BAGCD, e 'l cono POTR all' altro rombo BEQFD. Quindi il rimanente solido, ch'è la differenza di que' due rombi, dovrà pareggiare il cono KHSL. C. B. D.

## P R O P O S I Z I O N E XIX.

## T E O R E M A .

*Se un arco di cerchio minore della semicirconfenza si divida in un qualunque numero di parti, e si tirino a queste le corde; e poi un tal arco insieme colle corde, che si sono in esso tirate, si rivolga intorno ad un raggio, che passa per un de' suoi estremi; la superficie sferica descritta da tutto l' arco sarà maggiore di quella, che descrivono tutte quelle corde.*

fig. 74. Sia l' arco di cerchio ADB minore della semicirconfenza ABC, ed esso sia diviso nelle parti AD, DE, EB alle quali sien tirate le corde AD, DE, EB: dico che se si rivolgano l' arco, e le corde intorno al raggio DA, che passa per uno degli estremi A dell' arco; la superficie sferica descritta dall' arco sia maggiore della superficie, che vien generata dalle corde AD, DE, EB.

Dall' altro estremo B dell' arco si abbassi sul raggio OA la perpendicolare BF, la quale nel rivolgersi l' arco ADB intorno ad OA descriverà un

cerchio. E poichè la superficie sferica descritta dall'arco ADB, e quell'altra, che si descrive dalle AD, DE, EB hanno per termine comune la circonferenza del cerchio descritto da BF, verso il quale sono concave, e che di più la prima superficie comprende la seconda: perciò sarà la superficie generata dall'arco ADB maggiore di quella, che si descrive dalle corde AD, DE, EB delle parti in cui esso arco si è diviso \*. C.B.D. \* pr. 4.

COR. Dimostrando nel modo stesso, che la superficie sferica descritta dall'altro arco BGC, che vi resta per compiere la semicirconferenza ABC, sia maggiore della superficie, che si descrive dalle corde delle parti in cui esso si divide; ne segue, che

*La superficie di una sfera sia maggiore della superficie del solido, che si descrive da un qualunque rettilineo iscritto nel semicerchio generatore della sfera.*

## PROPOSIZIONE XX.

### TEOREMA.

*Se ad un arco di cerchio minore della semicirconferenza si tirino in diversi punti le tangenti, le quali s'incontrino tra loro, e le estreme si arrestino ai raggi, che passano per gli termini dell'arco; e s'intenda rivolgersi intorno ad uno di questi raggi l'arco, e le tangenti: la superficie sferica, che descrivesi dall'arco sarà minore di quella superficie, che descrivono le tangenti.*

Sia l'arco circolare ADB minore della semicir- *fig. 75.*

conferenza, al quale nei punti  $D$ ,  $E$ ,  $F$  si tirano le tangenti  $LG$ ,  $GH$ ,  $HK$ ; e la prima, e l'ultima di queste incontrino in  $L$ , e  $K$  i raggi  $OA$ ,  $OB$  tirati per gli termini  $A$ ,  $B$  dell' arco: dico che la superficie sferica, che descrivesi dall' arco  $ADB$  in rivolgersi intorno al raggio  $AO$  sia minore della superficie, che si descrive in una tal rivoluzione dalle tangenti  $LG$ ,  $GH$ ,  $HK$ .

Dall' estremo  $B$  dell' arco si abbassi sul raggio  $OA$ , intorno al quale un tal arco si suppone girare, la perpendicolare  $BN$ , e si tiri  $BM$  tangente all' arco stesso. E poichè rivolgendosi intorno ad  $AN$  si l' arco  $ADB$ , che le tangenti  $LG$ ,  $GH$ ,  $HM$ ,  $MB$ , si vengono a descrivere due superficie una dall' arco, e l'altra dalle tangenti, le quali hanno per loro termine comune la circonferenza di quel cerchio, che si descrive dalla  $BN$ , e che di più la prima è compresa dalla

- \* pr. 4. seconda; sarà dunque quella minore di questa \*.  
Or essendo  $BM$  tangente del cerchio, e perciò perpendicolare a  $BO$ ,  $MK$  è maggiore di  $MB$ ; ma è anche il punto  $K$  più distante dall' asse  $AC$ , che il punto  $B$ : adunque la superficie conica descritta da  $MK$  è maggiore di quella, che si descrive da  $BM$ . Aggiuntavi di comune la superficie descritta dalle  $LG$ ,  $GH$ ,  $HM$ ; sarà l' intera superficie descritta dalle  $LG$ ,  $GH$ ,  $HK$  maggiore di quella, che si descrive dalle  $LG$ ,  $GH$ ,  $HM$ ,  $MB$ ; e perciò anche maggiore della superficie sferica descritta dall' arco  $ADB$ , della quale si era poc' anzi dimostrata maggiore quella, che descrivevano le tangenti  $AG$ ,  $GH$ ,  $HM$ ,  $MB$ . C. B. D.

COR. Dimostrando similmente , che la superficie sferica descritta dall' altro arco BC , che vi rimane per compiere la semicirconferenza ABC , sia minore della superficie descritta dalle tangenti KP, PQ ; ne segue , che

*La superficie di una sfera sia minore della superficie di quel solido , che si descrive da un qualunque rettilineo circoscritto al semicerchio , dal quale si genera la sfera .*

## PROPOSIZIONE XXI.

### TEOREMA .

*Se vi sieno due archi circolari , che abbiano per centro comune il vertice di quell' angolo , ch' essi sottendono , e l' arco esteriore si divida in modo , che le corde delle sue parti non tocchino l' arco interiore ; la superficie generata da quelle corde rivolgendosi insieme coll' arco intorno al raggio tirato per uno de' termini di questo , sarà maggiore della superficie sferica , che in tal rivoluzione si descrive dall' arco interiore .*

Sieno ABH , DEF due archi circolari descritti *fig. 76.* intorno allo stesso centro O , e tra i lati dello stesso angolo DOF ; e l' arco esteriore DEF sia diviso nelle parti DE , EG , GF in modo , che le corde DE , EG , GF non tocchino l' arco interiore ABH : dico , che se intorno a DO si rivolgano gli archi , e le corde , sia la superficie descritta dalle corde DE , EG , GF maggiore della su-

perficie sferica, che descrivesi dall' arco ABH.

Dal centro O si abbassino sulle DE, EG, GF le perpendicolari, e per gli punti B, K, L ove queste incontrano l' arco ABH, gli si tirino le tangenti MN, NP, PQ, che saranno rispettivamente parallele alle DE, EG, GF, e minori di queste corde; ma sono anche i punti E, G, F più distanti dall' asse DO, che non lo sono gli altri N, P, Q: laonde le superficie coniche generate dalle DE, EG, GF saranno rispettivamente maggiori delle altre generate dalle MN, NP, PQ\*, cioè l' intera superficie descritta dalle corde DE, EG, GF sarà maggiore di quella, che descrivono le tangenti MN, NP, PQ; e quindi anche maggiore della superficie sferica descritta dall' arco

\* pp. 11.  
e 13.

\* p. 20. ABH \*. C. B. D.

COR. Dimostrando similmente, che la superficie descritta dalle corde delle parti, in cui si divide l' altro arco FRT, eh' è il compimento al semicerchio dell' arco DEF, sia maggiore della superficie sferica descritta dall' arco HSC compimento al semicerchio dell' arco ABH; ne segue, che

*Se vi sieno due cerchi concentrici, la superficie di quel solido, che si genera da un rettilineo iscritto nel cerchio esteriore, il qual non tocca il cerchio interiore, sia maggiore della superficie della sfera, che vien generata da questo cerchio.*

## PROPOSIZIONE XXII.

### TEOREMA.

*Se un arco di cerchio non maggiore del qua-*

*drante si divida in parti uguali , ed a queste parti vi si tirino le corde ; la superficie descritta da queste corde , nel rivolgersi insieme coll' arco intorno ad un raggio tirato per un di lui estremo , sarà uguale al rettangolo dell' altezza dell' arco nella circonferenza di quel cerchio , chè ha per raggio la distanza di una di quelle corde dal centro dell' arco .*

Sia ABD un arco di cerchio non maggiore del *fig. 77.* quadrante , il quale sia diviso nelle parti uguali AB , BE , ED , e sieno AB , BE , ED le corde , che le sottendono : dico che la superficie descritta da queste corde , nel rivolgersi insieme coll' arco ABD intorno al raggio OA , tirato per un di lui estremo A , sia uguale al rettangolo dell' altezza AH di esso arco nella circonferenza , che ha per raggio la perpendicolare OP , che dal centro O dell' arco si abbassa su di una di quelle corde AB .

Dai punti delle divisioni B , E si abbassino sul raggio immobile AO le perpendicolari BF , EG . E poichè nel rivolgersi il triangolo ABF rettangolo in F intorno al suo lato AF , l' altro lato AB descrive una superficie conica ; sarà perciò la superficie descritta dalla AB uguale al triangolo rettangolo , che ha per lati intorno all' angolo retto , la AB stessa , e la circonferenza del raggio BF \* , o sia al rettangolo della circonferenza di BF in BP metà di AB . Ma perchè sono simili ; *\* p. 11.* triangoli ABF , APO , sta , permutando , AF ad AP , come BF a PO , o come la circonferenza

- \* c.p.3. del raggio BF a quella del raggio PO\*; quindi il rettangolo di BP nella circonferenza del raggio BF, dovendo pareggiar l' altro rettangolo di BF nella circonferenza del raggio PO, sarà anche questo uguale alla superficie conica descritta da AB. Or nel rivolgersi il trapezio EBFG intorno al lato FG, cui gli altri BF, EG. sono perpendicolari, la EB descrive una porzione di superficie conica, ch'è tra i piani paralleli descritti dalle EG, BF, la quale è quanto il rettangolo contenuto dalla EB nella KL, che dal punto medio della BE si tira
- \* p. 13. parallela alla BF\*. Ma poichè, congiunta la OK, l'angolo OKB è retto, e quindi uguale ai due BKN, KBN; toltone di comune, l'angolo BKN, resterà l'angolo KBN uguale all'altro LKO; e perciò i due triangoli LKO, BKN, e quindi gli altri LKO, BEM saranno simili, e starà BE a BM, come KO a KL, o come la circonferenza del raggio KO a quella del raggio KL: laonde il rettangolo di BM, o FG nella circonferenza del raggio KO, o PO sarà uguale a quello di BM nella circonferenza del raggio KL, cioè alla superficie conica descritta da BE. Per lo che essendosi dimostrata la superficie conica descritta da BA uguale al rettangolo di AF nella circonferenza di PO; sarà la superficie descritta dalle OB, BE uguale al rettangolo delle AF, FG, cioè di AG nella circonferenza del raggio OP. E così continuando a dimostrare per le altre superficie descritte dalle altre corde ED, ec; si conchiuderà, che la superficie descritta da tutte esse sia uguale al rettangolo della circonferenza di OP in AH. C.B.D.

COR. Se l'arco AD fosse stato il quadrante; la superficie descritta dalle corde degli archi uguali in cui esso si sarebbe diviso, avrebbe pareggiato il rettangolo della circonferenza del raggio OP nel raggio OA. E quindi se nell' altro quadrante del semicerchio ABC si fosse praticato lo stesso, se ne sarebbe concluso, che

*La superficie di quel solido, che vien descritto da un semipoligono di un numero pari di lati uguali, iscritto in un semicerchio, debba essere uguale al rettangolo del diametro di questo, nella circonferenza, che ha per raggio la distanza di uno dei lati del semipoligono dal centro del semicerchio.*

## PROPOSIZIONE XXIII.

### TEOREMA.

*Se un arco non maggiore del quadrante si divida in parti uguali, e si tirino a queste le corde; e che poi s'intenda rivolgersi il rettilineo contenuto da queste corde, e dai raggi tirati per gli estremi dell' arco, intorno ad uno di questi raggi: il solido, che da un tal rettilineo si descrive; sarà uguale al cono, che ha per base un cerchio uguale alla superficie generata da quelle corde, e per altezza la perpendicolare, che dal centro dell' arco cade in una di esse.*

Sia l' arco ABD non maggiore del quadrante, fig. 78. il qual si divida nelle parti uguali AB, BE, ED,



ed a queste gli si tirino le corde: dico che il solido, che si descrive dal rettilineo ABEDO rivolgendosi intorno al raggio AO, sia uguale ad un cono, che ha per base il cerchio uguale alla superficie descritta dalle AB, BE, ED, e per altezza la perpendicolare OP abbassata dal centro O dell'arco su di una delle corde AB.

Si tirino i raggi OB, OE. Or il triangolo ABO rivolgendosi intorno al suo lato AO descrive un

- \* d. 2. rombo conico \*, uguale a quel cono, la cui base pareggia la superficie conica descritta da AB, e l'altezza è quanto la OP \*: e se si prolunghi la EB in G, si vede chiaramente, che i due triangoli GEO, GBO, rivolgendosi intorno alla GO, descrivono due rombi conici; che perciò il solido terminato dalla superficie conica descritta da EB, e da quelle, che descrivonsi dalle BO, EO, il quale è la differenza di quei due rombi conici, sarà uguale al cono, che ha la base uguale alla superficie conica descritta da EB, e per altezza la perpendicolare OQ, che cade sulla EB dal centro O \*, o ch'è lo stesso la OP. Adunque sarà l'intero solido descritto dal quadrilatero ABEO uguale a quel cono, la cui base è quanto la superficie descritta dalle AB, BE, e che ha per altezza la OP \*. E così continuando a dimostrare, se ne conchiuderà essere tutt' il solido descritto dal rettilineo proposto ABEDO uguale al cono, la cui base è uguale alla superficie descritta dalle AB, BE, ED, ed OP n'è l'altezza.

Che se l'arco AB fosse stato il quadrante; pro-

lungando l'ultima delle corde FD fino ad incontrare il raggio OA in H; l'ultimo solido terminato dalla superficie conica generata da DF, da quella, che si descrive dalla OD, e dal cerchio descritto da OF, essendo la differenza del cono descritto dal triangolo FOH, e del rombo conico, che descrivesi dall'altro triangolo ODH, dovrebbe pareggiare quel cono, la cui base è uguale alla superficie conica descritta da FD, ed OR, o sia OP n'è l'altezza \*: che perciò aggiugnendo questo solido a quello descritto dal rettilineo ABEDO; ne risulterà il solido iscritto nell'emisfero, che vien generato dal quadrante circolare ABF rivolgendosi intorno al raggio AO, uguale al cono, la cui base pareggia la superficie di un tal solido, e l'altezza è quanto la OP.

\* p. 17.

Cor. Dimostrandosi lo stesso per lo solido descritto da un altro rettilineo identico, il qual s'iscrive nell'altro quadrante OFC; ne segue, che

*Se in un semicerchio s'iscrive un semipoligono di un numero pari di lati uguali, e questo si rivolga intorno al diametro; il solido iscritto nella sfera pareggerà quel cono, la cui base è uguale alla superficie di questo solido, e l'altezza è quanto la perpendicolare, che dal centro del semicerchio cade sopra un lato del semipoligono.*

## PROPOSIZIONE XXIV.

### TEOREMA.

*La superficie di una sfera è uguale al rettun-*

golo contenuto da una linea retta, che rappresenti la circonferenza del suo cerchio generatore, e dal diametro di questo stesso cerchio.

*fig. 79.* Sia  $ABC$  quel semicerchio, che genera una sfera; ed  $AC$  il suo diametro; ed il rettangolo  $ZY$  sia contenuto dalla  $XY$ , la quale rappresenti la circonferenza del diametro  $AC$ , e dalla  $XZ$ , che pareggia un tal diametro: dico che questo rettangolo sia uguale alla superficie della sfera, che quel semicerchio descrive.

Imperocchè se il rettangolo  $ZY$  non è uguale alla superficie della sfera, che si descrive dal semicerchio  $ABC$ ; dovrà pareggiare la superficie di un'altra sfera descritta da un semicerchio minore di  $ABC$ , o pur maggiore. Pareggi in primo luogo quella della sfera, che si descrive dal semicerchio  $abc$  minore di  $ABC$ , e concentrico. Si divida continuamente per metà la semicirconferenza esteriore  $ABC$ , finchè le corde de' suoi archi  $AG$ ,  $GB$ ,  $BH$ ,  $HC$  non tocchino la semicirconferenza interiore  $abc$ ; e dal centro  $O$  sopra una di tali corde  $GA$  si abbassi la perpendicolare  $OP$ : sarà questa  $OP$  minore del raggio  $OA$ ; e perciò la circonferenza del raggio  $OP$  sarà minore della cir-

\* c. p. 3. conferenza del raggio  $OA^*$ , cioè della  $XY$ . Si tagli dunque dalla  $XY$  la  $Xy$  uguale alla circonferenza del raggio  $OP$ , e si compia il rettangolo  $ZY$ ; sarà un tal rettangolo uguale alla superficie di quel solido, che si descrive dal semipoligono  $AGBHC$  iscritto nel semicerchio  $ABC^*$ . Ma la superficie di questo solido è maggiore di quella

\* c. p. 22

della sfera descritta del semicerchio  $abc$  \* ; la qua-  
 le si è supposto pareggiare il rettangolo  $ZY$  : a-  
 dunque sarebbe il rettangolo  $Zy$  maggiore dell'  
 altro  $ZY$  . Lo che ripugna . E perciò il rettan-  
 golo  $ZY$  non può essere uguale alla superficie di  
 una sfera descritta dal semicerchio  $abc$  minore di  
 $ABC$  .

Suppongasi dunque questo rettangolo  $ZY$  esse-  
 re uguale alla superficie di un'altra sfera, descrit-  
 ta dal semicerchio  $DEF$  maggiore di  $ABC$ , e con-  
 centrico . Si divida un tal semicerchio  $DEF$  con-  
 tinuamente per metà, finchè le corde de' suoi ar-  
 chi  $DK$ ,  $KE$ ,  $EL$ ,  $LF$  non tocchino la semicir-  
 conferenza interiore  $ABC$ ; e si abbassi dal centro  
 $O$  sopra una di tali corde  $DK$  la perpendicolare  
 $OQ$ : sarà questa  $OQ$  maggiore del raggio  $OA$ , e per-  
 ciò la circonferenza del raggio  $OQ$  sarà maggiore  
 di quella del raggio  $OA$ \*, cioè della  $XY$  . Laon- \* c. p. 3.  
 de si prolunghi la  $XY$  in  $T$ , finchè  $XT$  pareg-  
 gi la circonferenza del raggio  $OQ$ , e la  $XZ$  si  
 prolunghi anche in  $R$ , in modo che la  $XR$  sia u-  
 guale al diametro  $FD$  di quest' altro semicerchio  
 $DEF$ ; e si compia il rettangolo  $RT$ : sarà  
 questo rettangolo uguale alla superficie del so-  
 lido, che si descrive dal semipoligono  $DKELT$  \*. \* c. p. 22.  
 Ma la superficie di questo solido è minore di quel-  
 la della sfera generata dal semicerchio  $DEF$ , nel-  
 la quale quel poligono viene ad essere iscritto \*. \* c. p. 19.  
 Adunque anche il rettangolo  $RT$ , ch' è uguale alla  
 superficie di quel solido, dovrà esser minore del  
 rettangolo  $ZY$ , che si suppone pareggiare quella  
 della sfera . Lo che ripugna . Quindi il rettangolo

ZY non può essere uguale alla superficie di una sfera descritta da un semicerchio maggiore di ABC. Si è poi dimostrato, che nè anche poteva esser quanto quella di una sfera descritta da un semicerchio minore. Adunque dovrà un tal rettangolo ZY essere uguale alla superficie della sfera, che si descrive dal semicerchio ABC. C. B. D.

- fig. 66. Scol. Rappresenti AB la circonferenza del cerchio generatore di una sfera, e la AC applicata perpendicolarmente alla AB nell' estremo A, sia il diametro di un tal cerchio: se si compia il rettangolo CB, sarà questo uguale alla superficie di
- \* p. 24. una tale sfera \*. Or se si prolunghi la AC in D, finchè AD sia doppia di AC, e quindi quadrupla di AE metà di AC, e che perciò è uguale al raggio del cerchio generatore della sfera; congiunte le BD, BE, il triangolo DAB essendo uguale al rettangolo CB, sarà quanto la superficie sferica generata dal cerchio del raggio AE; e l'altro triangolo EAB dinoterà un tal cerchio \*. Laonde la superficie sferica starà al suo cerchio generatore, come il triangolo DAB all' altro EAB; cioè come DA ad AE, e quindi come 4 ad 1. Vale a dire
- \* p. 3.

*La superficie di una sfera è quadrupla del suo cerchio generatore*

E questa è l' esibizione della superficie di una sfera secondo Archimede.

E volendo esibire un sol cerchio uguale alla superficie di una sfera, sarà questo il cerchio, che ha per raggio il diametro del cerchio generatore della sfera: poichè quel cerchio è quadruplo di questo, dall' essere il quadrato del raggio di quello, qua-

druplo del quadrato del raggio di questo \* .  $\frac{*}{2.XII}$ .

## P R O P O S I Z I O N E XXV.

## T E O R E M A .

*Ogni sfera è uguale ad un cono , che ha per base il cerchio uguale alla superficie della sfera , e per altezza il raggio di questa .*

Sia ABC quel semicerchio , che genera la sfera, *fig. 79.* ed OA il suo raggio: ed il cono ZXRY abbia per base il cerchio XRY uguale alla superficie della sfera , che da un tal semicerchio si descrive , e la sua altezza ZM sia quanto la OA : dico che questo cono pareggi quella sfera .

Imperocchè se il cono ZXRY non è uguale alla sfera , che si descrive dal semicerchio ABC ; dovrà pareggiare una sfera la qual si descriva da un semicerchio minore di ABC , o pur maggiore . Si supponga in primo luogo uguale a quella sfera , che descrivesi dal semicerchio *abc* minore di ABC , e concentrico . Si divida continuamente per metà la semicirconferenza esteriore ABC , finchè le corde de' suoi archi AG , GB , BH , HC non tocchino la semicirconferenza interiore *abc*; e dal centro O si abbassi sopra una di queste corde AG la perpendicolare OP. Or poichè la superficie del solido , che si descrive dal semipoligono AGBHC rivolgendosi intorno ad AC è minore della superficie della sfera , che vien descritta dal semicerchio ABC ; e questa si è supposta pareggiare il cerchio

— XRZ; dovrà perciò quella superficie essere quanto un cerchio minore di XRY. Sia questo il cerchio  $xry$ , che si supponga concentrico all'altro XRY; e s'intenda descritto su questo cerchio il cono  $xry$ , che abbia per altezza la  $zM$  uguale alla  $OP$ , ch'è minore di  $OA$ , e quindi di  $MZ$ ; sarà un tal cono uguale al solido generato dal

\* c.p.23. semipoligono AGBHC \*. Ma questosolido è maggiore della sfera, che si descrive dal semicerchio  $abc$ : adunque dovrebbe anche il cono  $xry$  esser maggiore dell'altro ZXRY. Lo che ripugna. Non può dunque il cono ZXRY essere uguale ad una sfera la quale sia descritta da un semicerchio minore di ABC.

Si supponga perciò, ch'esso cono possa pareggiare la sfera, che si descrive da un semicerchio maggiore di ABC; e sia questo il semicerchio DEF concentrico ad ABC. Si divida anche la semicirconferenza esteriore DEF continuamente per metà, finchè gli archi FK, KE, EL, LF sien tali, che le loro corde non tocchino la semicirconferenza interiore ABC, e sopra una di tali corde DK si abbassi la perpendicolare OQ. E poichè la superficie del solido, che si genera dalla rivoluzione del semipoligono DKELF intorno alla DF, è maggiore della superficie della sfera, che si descrive dal semicerchio ABC \*: perciò

\* c.p.21. dovrà la superficie di quel solido esser uguale ad un cerchio maggiore del cerchio XRY: sia questo il cerchio SVT descritto intorno allo stesso centro M di quello, e su di esso s'intenda eretto quel cono, che ha per altezza la NM uguale alla

OQ, ch'è maggiore della OA, e quindi della MZ; sarà un tal cono uguale a quel solido \*. Laonde siccome quel solido è minore della sfera, che si descrive del semicerchio DEF nella quale è iscritto \*; così sarà pure il cono NSVT minore dell'altro ZXRY. Lo che anche ripugna. E perciò non può il cono ZXRY pareggiare la sfera, che si descrive da un semicerchio maggiore di ABC. Ma si è poc' anzi dimostrato, che nè pure poteva quel cono pareggiare una sfera, la quale si descrivesse da un semicerchio minore di ABC. Adunque dovrà esser quanto la sfera, che da un tal semicerchio si descrive. C. B. D.

Scol. Essendo la superficie di una sfera quadrupla del suo cerchio generatore \*; ed i due cono- \*sc.p.24.  
ni uno che abbia per base la superficie sferica, l'altro il cerchio generatore di esso, e per altezza comune il raggio, dovendo esser tra loro come le basi \*; perciò sarà il primo quadruplo del \* 11.XII  
secondo. Ma si è dimostrato, che il primo sia uguale alla sfera. Adunque

*Ogni sfera è quadrupla di quel cono, che ha per base il cerchio, generatore della sfera, e per altezza il raggio di questo.*

Ed è in tal modo, che Archimede ha esibita la sfera.

## PROPOSIZIONE XXVI.

### TEOREMA.

*Ogni cilindro che abbia la base uguale al cer-*



chio generatore di una sfera, e per altezza il diametro di questo, è sesquialtero della sfera: e la di lui superficie insieme colle basi, è ancora sesquialtera della superficie della sfera.

N. B. Una grandezza si dice *sesquialtera* di un'altra, se questa accresciuta della sua metà pareggi la prima.

Imperocchè il cilindro, che abbiamo detto, essendo triplo di quel cono, che ha la stessa base sua, e l'altezza medesima\*, dovrà esser sestuplo di quell'altro cono, che ha la medesima base, e per altezza il raggio della sfera\*: si è poi dimostrata la sfera quadrupla di quest'ultimo cono\*. È chiaro dunque, che il cilindro sia sesquialtero della sfera.

Di nuovo, poichè la superficie di un tal cilindro sta alla base, come il doppio del lato del cilindro al raggio di essa base\*: ed è il lato del cilindro proposto uguale al diametro della sua base; quindi il doppio del lato sarà quadruplo del raggio della base; e perciò anche la superficie cilindrica sarà quadrupla della base. Laonde se ad una tal superficie vi si aggiungano le due basi; sarà la superficie cilindrica insieme colle due basi sestupla di una di queste, cioè del cerchio generatore della sfera. Ma si è dimostrato, che la superficie della sfera è quadrupla di questo stesso cerchio\*; quindi tutta la superficie cilindrica è sesquialtera di quella della sfera, C. B. D.

## PROPOSIZIONE XXVII.

## TEOREMA 3

*La superficie di un segmento sferico è uguale al rettangolo contenuto da una linea retta, che rappresenta la circonferenza del cerchio generatore dell'intera sfera, e dall'altezza di quell'arco di questo cerchio, dal quale si descrive la superficie del proposto segmento.*

Sia ABC il semicerchio, che genera una sfera; fig. 804 ed abbassato da un qualunque punto B della semicirconferenza ABC la perpendicolare BH sul diametro AC, dinoti AEBH quel semisegmento circolare dal quale si descrive un segmento sferico: sia poi il rettangolo ZY contenuto dalla XY uguale alla circonferenza del cerchio, che ha per raggio OA, e dalla XZ uguale alla AH altezza dell'arco AB: dico che tal rettangolo ZY pareggi la superficie del segmento sferico descritto da AEBH.

Poichè se questo rettangolo non è uguale alla superficie di un tal segmento sferico, il qual si supponga minore della mezza sfera; dovrà pareggiare la superficie di un segmento sferico, la qual si descriva da un arco circolare maggiore di AEB, o pur minore, e che si potrà supporre sottendere quello stesso angolo AOB, ch'era sotteso dall'arco AEB. Suppongasi in primo luogo uguale ad una superficie sferica generata dall'arco *aeb* minore di AEB, e descritto come si è detto. Si divida continuamente per

- metà l'arco AEB, finchè le corde degli archi, in cui  
 \*c.l.2.XI resta diviso, non tocchino l'altro arco *acb*\*; e sopra  
 una di tali corde AE si abbassi la perpendicolare  
 OP, che sarà minore di OA, e quindi di XZ; che  
 perciò anche la circonferenza del raggio OP sarà  
 \* c. p. 3. minore di quella del raggio OA\*, cioè della linea  
 retta XY. Laonde si tagli dalla XY la Xy uguale alla  
 circonferenza del raggio OP, e si compisca il ret-  
 tangolo Zy, il quale sarà quanto la superficie,  
 che si descrive dalle corde AE, EB, nel rivol-  
 \* p. 23 gersi insieme coll' arco AEB intorno ad AO\*.  
 Or una tal superficie è maggiore della superficie  
 \* p. 21. sferica, che si descrive dall' arco circolare *aeb*\*:  
 quindi anche il rettangolo Zy dovrà esser maggio-  
 re dell' altro ZY. Lo che non può essere. E perciò  
 non può il rettangolo ZY pareggiare la superficie  
 sferica descritta da un arco circolare minore di AEB.

Sia perciò un tal rettangolo uguale a quella super-  
 ficie sferica, che vien generata da un altro arco circo-  
 lare DFG maggiore di AEB, e descritto come nel  
 principio di questa dimostrazione si è detto. Si di-  
 vida pure un tal arco continuamente per metà, finchè  
 le corde DF, FG delle parti, in cui si è esso diviso

- \*c.l.2.XII non tocchino l'altro arco AEB\*; e si abbassi  
 dal centro O comune a questi due archi, la per-  
 pendicolare OQ sopra una di quelle corde DE:  
 sarà OQ maggiore di OA; e perciò la circonfe-  
 renza del raggio OQ sarà anche maggiore di quel-  
 \* c. p. 3. la del raggio OA\*, cioè di XY. Laonde si pro-  
 lungli XY in T, finchè XT sia uguale alla cir-  
 conferenza del raggio OQ: e prolungata anche la  
 XZ, in R, sicchè XR pareggi DII altezza dell'

arco DG , si compia il rettangolo RT , il quale sarà uguale alla superficie , che si descrive dalle corde DF , FG rivolgendosi insieme coll' arco DFG intorno al raggio DO \* . Ma una tal superficie è minore di quella , che in questa rivoluzione si descrive dall' arco DFG : adunque dovrà benanche il rettangolo RT esser minore del rettangolo ZY . La qual cosa è impossibile . E perciò non può il rettangolo ZY esser uguale alla superficie sferica , che si descrive da un arco maggiore dell' arco AEB : si è pur dimostrato , che non poteva un tal rettangolo pareggiare la superficie sferica , che si descriverebbe da un arco minore di AEB . Laonde dovrà esser quanto quella , che si descrive dall' arco AEB .

\* p. 22.

Che se il segmento sferico fosse stato maggiore della mezza sfera , cioè quello , che vien descritto dal semisegmento circolare CBH maggiore del quadrante ; è chiaro che la sua superficie , sia anche quanto il rettangolo della circonferenza del raggio OA in CH : poichè essa è la differenza della superficie della sfera , e di quella dell'altro segmento sferico generato dal semisegmento circolare AEBH , ch'è minore del quadrante ; è quindi quanto la differenza de' due rettangoli , che hanno per base comune la circonferenza del raggio OA , e per altezze le CA , ed HA rispettivamente . C. B. D.

Con. Paragonando adesso il rettangolo della circonferenza del raggio OA in AC , il qual pareggia la superficie sferica descritta dalla semicirconferenza ABC\* , al rettangolo della circonferenza dello stesso raggio OA in AH , il quale è quanto la porzione

\* p. 24.

di superficie sferica descritta dall'arco circolare  
 \* p. 27. AEB \*; si vede chiaramente, che avendo questi rettangoli per base comune il cerchio del raggio OA debbano esser tra loro come le altezze, cioè come CA ad AH. Val quanto dire, che

*La superficie di una sfera stia a quella di un suo segmento, come il diametro della sfera all'altezza del segmento.*

fig. 81. **Scol.** Sia AC il diametro di una sfera, ed ABC il semicerchio generatore di essa: sia poi AE l'altezza di un suo segmento sferico, cioè di quello, che si descrive dal semisegmento circolare ABE; sarà la superficie di una tale sfera all'altra di quel

\* c. prec. segmento sferico, come CA ad AE \*, cioè co-

\* c2. 20 X come il quadrato di CA a quello di AB \*; o finalmente come il cerchio del raggio CA a quello del

\* 2. XII. raggio AB \*. Per lo che essendosi dimostrato il cerchio del raggio CA uguale alla superficie della

\* sc. p. 24. sfera, che descrivesi dal semicerchio ABC \*; sarà anche la superficie del segmento sferico descritto dal semisegmento circolare ABE, uguale al cerchio del raggio AB. Ma nel descriversi il segmento sferico dal semisegmento circolare ABE, l'estremo B della AB descrive il cerchio, ch'è base di un tal segmento sferico. Laonde.

*La superficie di un segmento sferico è uguale a quel cerchio il cui raggio è una linea retta, che si tiri dal vertice del segmento ad un qualunque punto della circonferenza della base di esso.*

Ed è in questo modo, che Archimede esibisce la superficie di un segmento sferico.

## P R O P O S I Z I O N E XXVIII .

## T E O R E M A .

*Ogni settore sferico è uguale a quel cono , che ha per base quel cerchio , il qual pareggia la superficie sferica , che termina il settore , e per altezza il raggio della sfera .*

Sia AEBO quel settore circolare , che rivolgendosi intorno al raggio OA descrive il settore sferico ; ed il cono ZXRY abbia la sua base XRY uguale alla superficie sferica generata in tal rivoluzione dall' arco AEB , cioè , al cerchio del raggio AB \* , e per altezza la ZM uguale ad OA : \*sc.p.27. dico che questo cono sia quanto quel settore sferico .

Imperocchè se non è il cono ZXRY uguale al settore sferico , che vien descritto dal settore circolare AEBO , il qual si supponga per ora minore del quadrante ; sarà quanto un altro settore sferico maggiore di quello , che descrivesi dal settore circolare AEBO , o pur minore . Sia primieramente minore , e suppongasi perciò uguale a quell' altro settore sferico , che si descrive dal settore circolare *aebO* minore di AEBO , e costituito con questo nello stesso angolo AOB. Si divida continuamente per metà l' arco esteriore AEB , finchè le corde AE , EB delle sue parti non tocchino l' arco interiore *aeb* ; e poi s' intenda rivolgersi il rettilineo AEBO insieme. col settore cir-

- colare AEBO intorno al raggio OA. E poichè la superficie, che in tal rivoluzione si descrive dalle AE, EB è minore di quella, che descrivesi dall' arco AEB \*; perciò quella superficie sarà rappresentata da un cerchio minore del cerchio XRY, che pareggia questa: sia questo il cerchio  $\pi\gamma\gamma$  concentrico ad XRY, e su di esso si descriva il cono dell' altezza Mz uguale ad QP, ch' è minore di OA, e quindi anche di MZ; sarà un tal cono uguale al solido, che si descrive dal rettilineo AEBO \*; e perciò maggiore del settore sferico generato dal settore circolare acbO, ossia del cono ZXRY, che si era supposto pareggiare questo settore. Lo che è impossibile. Adunque il cono ZXRY non è minore del settore sferico, che si descrive dal settore circolare AEBO.

- Sia perciò maggiore di esso, e quindi uguale a quel settore sferico, il quale vien generato dal settore circolare DFGO maggiore dell'altro AEBO, e costituito nello stesso angolo AOB. Si divida continuamente per metà l' arco DFG, finchè le corde delle sue parti DF, FG non tocchino l'altro arco AEB; e poi s' intenda rivolgersi il rettilineo DFGO intorno ad OD; sarà la superficie, che si descrive dalle DF, FG maggiore della superficie sferica, che vien generata dall' arco AEB \*; e perciò quella tal superficie sarà rappresentata da un cerchio maggiore del cerchio XRY. Sia questo il cerchio SVT, che suppongasi concentrico all' altro XRY, e poi su di esso s' intenda descritto quel cono, che ha l' altezza MN uguale alla perpendicolare OQ, che dal centro O

dell' arco DFG si abbassa sopra una di quelle corde DF. E poichè un tal cono è quanto il solido generato dal rettilineo DFGO \* ; sarà esso cono \* p. 23. minore del settore sferico , che descrivesi dal settore circolare DFGO , e quindi dell' altro cono ZXRY, che si è supposto pareggiare un tal settore sferico . Lo che è impossibile . Laonde uè pur può il cono ZXRY esser maggiore del settore sferico generato dal settore circolare AEBO : si è poi dimostrato , che non poteva esserne minore . Adunque gli dovrà essere uguale .

Che se il settore sferico proposto fosse stato descritto dal settore circolare BCO maggiore del quadrante : essendo un tal settore sferico la differenza della sfera , e dell' altro settore di questa , che si descrive dal settore circolare AEBO minore del quadrante ; sarà perciò quanto la differenza di que' conì , che pareggiano questi solidi ; e quindi quanto il cono , che ha per base la superficie sferica descritta dall' arco BC , e per altezza la OA. C.B.D.

COR. Essendo la sfera , ed un suo settore rispettivamente uguali a due conì , uno , che ha per base un cerchio uguale alla superficie sferica , e per altezza il raggio \* , e l' altro , che ha per base quel cerchio , che pareggia la superficie sferica , che termina il settore , e la stessa altezza \* ; saranno perciò quei due solidi , come questi due conì ; e quindi come le loro basi \* , cioè come la \* p. 27. \* p. 28. \* 11. 12. superficie della sfera alla superficie della porzione sferica , che termina il settore ; o finalmente come il diametro della sfera all' altezza di una tal porzione sferica \* . \* c.p.27.



## PROPOSIZIONE XXIX.

## TEOREMA.

*Ogni segmento sferico è uguale ad un cono, che tien per base quel cerchio, il cui raggio è l'altezza di esso segmento, e per asse la rimanente porzione del diametro accresciuta del raggio.*

*fig. 81.* Rappresenti ABC il semicerchio generatore di una sfera, ed ABE sia quel semisegmento circolare dalla cui rivoluzione intorno ad AE si genera il segmento sferico: dico che questo segmento sferico sia uguale al cono, che ha per base quel cerchio, il cui raggio è l'altezza AE di esso segmento, e per asse la rimanente parte EC del diametro accresciuta del raggio OA.

- Imperocchè essendo il quadrato di AB uguale ai quadrati delle AE, EB, anche il cerchio del raggio AB dovrà pareggiare i cerchi, che hanno per raggi le AE, EB \*; e perciò il cono, che ha per base il cerchio del raggio AB, e per altezza la AO, cioè il settore sferico generato dal settore circolare ABO \*, dovrà essere uguale ai due coni i quali hanno per basi i cerchi dei raggi AE, EB, e per altezza la medesima AO \*: toltone di comune il cono, la cui base è il cerchio del raggio BE, ed EO n'è l'altezza, cioè quello, che si descrive dal triangolo BEO rivolto intorno a EO; o pure aggiungendovelo di comune, secondo che il settore circolare ABO era minore del qua-
- \* 2. XII.
- \* p. 28.
- \* e. p. 17.

drante, o pur maggiore; sarà il segmento sferico descritto da ABE uguale a due coni, dei quali uno ha per base il cerchio del raggio AE, e per altezza AO, e l'altro ha per base il cerchio del raggio BE, e per altezza AE. Or poichè AE sta ad EB, come EB ad EC; sarà AE ad EC, come il quadrato di AE a quello di EB, o come il cerchio del raggio AE a quello del raggio EB \* : e perciò il cono, \* 2.XII. che ha per base il cerchio del raggio AE, e per altezza EC, è uguale all'altro la cui base è il cerchio del raggio BE, ed AE n'è l'altezza \*. Laonde \* 15.XII sostituendo questo cono a quello; sarà il segmento sferico generato da ABE uguale ai due coni, dei quali ciascuno ha per base il cerchio del raggio AE, ed un di essi ha per altezza AO, l'altro EC; e quindi ad un sol cono, che ha per base quel cerchio, e per altezza le EC, ed AO prese insieme \*. C. B. D.

\* cp. 16

ScOL. In ordine a CE, ch'è l'altezza di uno dei segmenti in cui resta divisa una sfera, alla stessa CE insieme con CO raggio di essa sfera, e ad EA altezza dell'altro segmento sferico si ritrovi la quarta proporzionale M; sarà, permutando, CE ad EA, come EC insieme con CO ad M, e quindi come quel cono, che ha per base il cerchio del raggio EA, e per altezza EC insieme con CO all'altro della stessa base, e che ha M per altezza. Ma questo cono sta poi all'altro, che ha per base il cerchio del raggio BE, e per altezza M, come il cerchio del raggio EA a quello del raggio EB, cioè come EA ad EC. Adunque, per equalità ordinata, starà il cono la cui base è il

cerchio del raggio EA, ed EC insieme con CO n'è l'altezza, al cono che ha per base il cerchio del raggio BE, ed M per altezza, come CE ad EC, cioè in ragion d'uguaglianza. Che perciò siccome quel primo cono si è dimostrato uguale al segmento sferico, che si descrive dal semi segmento circolare CBE \*; così a questo stesso segmento sarà pure uguale l'altro cono, che ha per base il cerchio del raggio BE, ed M per altezza. Ed ecco come facilmente si ricava dalla nostra esibizione di un segmento sferico, quella di Archimede, cioè che

*Ogni segmento sferico sia uguale a quel cono, che ha la stessa base del segmento, e per altezza la quarta proporzionale in ordine all'altezza dell'altro segmento, a questa stessa accresciuta del raggio della sfera, e all'altezza del segmento proposto.*

F I N E .

LA MISURA  
DEL  
CERCHIO.



NAPOLI



1812.



## P R E F A Z I O N E .

**I**L cerchio, ch' è dopo le figure rettilinee la più semplice, era naturale, che dovesse eccitar subito dopo queste la curiosità dei Geometri in cercarne la misura. Sapendo già essi, che l'aja di un poligono regolare iscritto in un cerchio era uguale al rettangolo del suo perimetro nella metà della distanza di uno de' suoi lati dal centro del cerchio in cui era iscritto; passando dai poligoni iscritti al cerchio stesso, non dovettero stentar molto a dimostrare, che il cerchio era quanto il rettangolo della sua circonferenza nella metà del raggio; e quindi a ridurre il Problema della quadratura del cerchio a quello della rettificazione della circonferenza.

Tra i molti tentativi, che furon fatti per la rettificazione della circonferenza, il primo di cui ci sia pervenuta notizia è quello di Dinostrato, fratello del Geometra Menecmo particolar discepolo di Platone. Egli si valse in questa ricerca di una curva, che per la proprietà che aveva di quadrare il cerchio, fu chiamata *Quadratrice*; e forse perchè Dinostrato fu il primo a ravvisarvela, fu perciò detta di Dinostrato. E di una tal curva si valsero anche a quest' oggetto Nicomede, e molti altri geometri della Scuola Platonica. Ma questa maniera di quadrare il cerchio fu ben presto riconosciuta come poco soddisfacente, e poco geometrica; mentre per la

genesì di una tal curva si esigea un certo moto, ed una determinata velocità di un punto, la quale non poteva esibirsi senza prima ammettere la rettificazione della circonferenza; e volendo ottener tal curva geometricamente, bisognava ricorrere a quei luoghi, che gli antichi dicevano alla superficie; o pur descriverla per mezzo di una linea spirale descritta in un piano: e l'una, e l'altra di queste considerazioni era molto vaga, e poco conducente alla vera soluzione del Problema: esse non erano però dispregiabili, nè lo sono tuttavia, avendo dato luogo alla scoperta di una proprietà importante della quadratrice. In generale gli sforzi, ed i tentativi di un vero geometra, se non lo fanno riuscire in quello, che cerca, non sono però mai perduti, ed infruttuosi.

Il Problema della quadratura del cerchio era dunque ai tempi di Archimede ancora tra le cose desiderate dai Geometri; ed è perciò che quest' uomo sommo, dotato di un ingegno fatto per eseguire tutto ciò, ch' era nuovo, ed arduo, avendo intrapreso a risolverlo, diede il primo, con una destrezza singolarissima per quei tempi, un approssimante rapporto del diametro del cerchio alla circonferenza, e del cerchio al quadrato circoscritto ad esso. Il primo di tali rapporti, del quale molti si avvalgono in pratica, anche a dì nostri, perchè proposto in termini ristrettissimi, è quello di 7 a 22; e l'altro, che deducesi facilmente dal primo, è quello di 11 a 14. Non vi mancarono però anche in quei tempi felici per la Geometria molti, che indegni affatto del nome di Geo-

metri, pretesero di aver ritrovato in diversi modi l'esatta quadratura del cerchio. Ed i loro paralogistici ragionamenti, che non ci sono per buona fortuna pervenuti, possono scusare alquanto i tempi nostri, nei quali di questi falsi quadratori, appena iniziati nella Geometria, spesso spesso se ne schiudono.

Chi desidera una completa, ed insieme dilettevole notizia delle varie ricerche sulla quadratura del cerchio potrà leggere un Opuscolo del Sig. Montucla, che trovasi anche inserito nella fine del secondo volume della sua Storia delle Matematiche, edizione del 1792. Per me basta solamente l'avvertire, che dal Wallis in poi, tutti i sommi Geometri Moderni, tra i quali il Nevvton, il Leibnitz, Giacomo Gregory, ed Huyghens, si sono occupati ad escogitare dei metodi ingegnosisimi, per approssimare nella maniera più grande possibile la circonferenza del cerchio. E che Lagny portò quest' approssimazione sino a farla differire dalla vera circonferenza per meno di un fratto, il cui numeratore fosse l'unità, ed il denominatore un numero composto di 128 cifre decimali; in modo tale che, come si esprime il Signor Montucla, l'errore su di un cerchio del diametro cento milioni di volte maggiore di quello della sfera delle stelle fisse, supponendo la parallasse dell'orbe terrestre solamente di un secondo, sarebbe più bilioni di bilioni di volte minore del diametro di un capello. Approssimazione, che spaventa, e della quale non avendosene alcun bisogno in pratica, non



serve ad altro , che a provare l' estrema pazienza di quello , che se n'era occupato , e l' attività del metodo, che gliel'aveva fatto ottenere. Contuttociò l' Eulero ha mostrato co' suoi metodi , che l' approssimazione del Lagny poteva spingersi anche più oltre, ed ottenersi con artifizj di calcolo anche più attivi . E ciò è sufficiente a far conoscere , con quanto poco buon senso tanti a giorni nostri , perdono inutilmente il loro tempo in paralogistiche ricerche sul Problema della quadratura del cerchio .

Senza però ricorrere ai Metodi proposti dai sommi Analisti Moderni , i quali implicano delle ricerche sulle serie , mi sono attenuto in questo Libro della *Misura del Cerchio* al metodo di Giacomo Gregory , ricavato dai soli principj di Geometria , e condotto a fine con ovviissime operazioni Aritmetiche ; poichè un tal metodo è molto semplice , e facile , e dà un' approssimazione per gli usi pratici più che sufficiente , ed esatta .

## LA MISURA DEL CERCHIO

## DEFINIZIONI.

1. **U**NA figura curvilinea si dirà essersi *quadrata*, se ella per mezzo di una geometrica costruzione è trasformata in un' altra rettilinea.

Poichè a quest' ultima figura può sempre essirsi un quadrato uguale \*.

\* 14. II.

2. E si dirà *rettificata* una curva, se con geometriche operazioni si rinvenga una linea retta, che la pareggi.

Scol. La quadratura di uno spazio curvilineo è o *esatta*, o per *approssimazione*. Si dice *esatta*, allorchè la figura rettilinea pareggia lo spazio curvilineo a rigor geometrico, e senza averne trascurata veruna, abbenchè minima, quantità; ed è per approssimazione quando si rinviene una figura rettilinea, che differisca dallo spazio curvilineo per una quantità piccolissima, e per conseguenza trascurabile. E lo stesso deve dirsi convenevolmente per la rettificazione di una curva.

## L E M M A I.

*Ogni poligono di un numero pari di lati uguali iscritto in un cerchio, è medio proporzionale tra quell' altro poligono regolare iscritto nel cerchio stesso, che ha la metà di lati, ed il poligono circoscritto simile a questo.*

*fig. 82.* Sia DB il lato di un poligono di un numero pari di lati uguali, iscritto nel cerchio DBE; e da un estremo D dell'arco DB si abbassi sul raggio OB, che passa per l'altro estremo, la perpendicolare DF, la qual si produca sino alla circonferenza in E; sarà l'arco BE uguale all'arco BD \*; e quindi la DE dinoterà il lato di quel poligono regolare iscrivibile nel cerchio DBE, che ha la metà di lati del già iscritto. Finalmente per lo punto B si tiri ad un tal cerchio la tangente ABC, la quale si arresti ai raggi OD, OE, che passano per gli estremi dell'arco DBE; sarà questo il lato del poligono circoscrittibile al cerchio DBE, simile all'iscrivibile del lato DE; la qual cosa può facilmente rilevarsi dal Lib. IV. di Euclide. Or io dico, che i poligoni i quali hanno per loro lati le DE, DB, AC sieno continuamente proporzionali.

E poichè i triangoli DFO, ABO sono rispettivamente uguali agli altri OFE, OBC; perciò saranno essi triangoli DFO, ABO le metà degli altri DOE, AOC. Laonde dividendosi i poligoni, che hanno per lati le DE, AC in tanti tri-

angoli, come DOE, AOC, quanti sono i loro lati; si divideranno per conseguenza in tanti triangoli, come DFO, ABO, quanti ne dinota il doppio numero de' lati di essi, cioè il numero di quelli del poligono del lato BD. Ma lo stesso numero di volte si contiene anche il triangolo DOB in quest' ultimo poligono. Adunque i triangoli DFO, DOB, ABO sono tre grandezze, delle quali ne sono ugualmente moltiplici rispettivi il poligono del lato DE, quello del lato DB, e l' altro del lato AC: e perciò questi poligoni saranno tra loro come quei triangoli \*. Or il triangolo DOF sta all' altro DOB, come la base OF alla base OB, per essere ugualmente alti \*; e quindi come OD a OA \*; ed in questa stessa ragione è pure il triangolo DOB al triangolo BOA; per aver essi il loro vertice comune in B: che perciò il triangolo DOF starà al triangolo DOB, come questo triangolo DOB all' altro AOB, cioè i tre triangoli DOF, DOB, BOA saranno continuamente proporzionali; e quindi anche continuamente proporzionali saranno i poligoni, che hanno rispettivamente per lati le DE, DB, AC, i quali si sono dimostrati proporzionali ad essi triangoli DOF, DOB, AOB. C. B. D.

\* 15. V.

\* 1. VI.

\* 2. VI.

## L E M M A II.

*Ogni poligono di un numero pari di lati uguali, circoscritto ad un cerchio, è quarto proporzionale in ordine alla somma de' due poligoni iscritti in questo cerchio, l'uno simile al già circoscritto, e l'altro, che ha la metà del numero di lati, al doppio di questo, ed all'altro poligono circoscritto, che gli è simile.*

fig. 82.

Si supponga fatto lo stesso apparecchio del Lemma precedente, e sieno DB, DE i lati dei due poligoni iscritti nel cerchio DBE, ed AC un lato di quel poligono circoscritto, ch'è simile all'iscritto del lato DE: e di più si tirino al cerchio DBE, per gli punti D, E, le tangenti DL, EH; sarà LH il lato dell'altro poligono circoscritto simile all'iscritto del lato DB, cioè sarà LH il lato di quel poligono regolare circoscritto al cerchio DBE, che ha doppio numero di lati del già circoscritto. Or io dico, che questo poligono del lato LH sia quarto proporzionale in ordine ai due poligoni iscritti, cioè quelli, che hanno per lati le DB, DE; al doppio di questo del lato DE, ed al poligono circoscritto del lato AC.

Si congiunga OL. E poichè i due triangoli LDO, LBO hanno tutti i loro lati uguali; perciò essi saranno anche uguali, e l'angolo DOB resterà biseгато dalla LO: per la qual cosa starà AO ad OB, o pure OD, come AL ad LB\*.

\* 3. VI.

Ma AO sta ad OD, come il triangolo ABO al

triangolo DBO \*, o pure come questo triangolo \* 1. VI.  
 DBO all' altro DOF \*; ed AL sta ad LB, come \* 1. prec.  
 il triangolo AOL al triangolo LOB \*. Adunque \* 1. VI.  
 starà il triangolo DBO al triangolo DOF, come  
 il triangolo AOL all' altro LOB: e componendo,  
 i due triangoli DBO, DOF staranno al triangolo  
 DOF, come il triangolo AOB al triangolo LOB.  
 Ma il triangolo DOF sta al suo doppio, come il  
 triangolo LOB al doppio di esso \*, cioè al qua-  
 drilatero DOBL. Laonde le tre grandezze, cioè  
 i due triangoli DOB, DOF insieme, il triangolo  
 DOF, ed il doppio di questo stesso triangolo DOF  
 sono in ordinata ragione con tre altre grandezze,  
 cioè col triangolo AOB, col triangolo LOB, e col  
 quadrilatero DOBL; e quindi, per equalità, dovrà  
 stare il triangolo DOB insieme coll' altro DOF al  
 doppio di esso DOF, come il triangolo AOB al  
 quadrilatero DOBL. Per la qual cosa, essendosi  
 dimostrato, che i poligoni i quali hanno per lati  
 rispettivamente le DB, DE, AC sieno ugualmente  
 multipli dei triangoli DOB, DOF, AOB \*; e\* dim. l. pr.  
 potendosi facilmente dimostrare, che il poligono  
 del lato LH sia pure ugualmente multiplice del  
 triangolo LOH, e quindi del quadrilatero DOBL,  
 che a questo triangolo è uguale, per essere am-  
 bedue doppi dello stesso triangolo LOB; ne se-  
 gue, che dovendo aver luogo tra gli ugualmente  
 multipli la stessa proporzione, che tra le par-  
 ti \*, debba perciò stare il poligono del lato DB  
 insieme con quello del lato DE al doppio del po-  
 ligono del lato DE, come il poligono del lato  
 AC al poligono del lato LH, C. B. D.

(15. V  
 e 16. V

\* 15. V.

## PROPOSIZIONE I.

## TEOREMA.

*Se si prenda per unità il raggio di un cerchio; un tal cerchio, con un' approssimazione di meno di una diecimilionesima, sarà espresso da 3, 1415926 quadrati del raggio.*

Essendosi preso per unità il raggio del cerchio; il quadrato del raggio dinoterà l'unità quadrata; della quale, ne farà doppio il quadrato iscritto nel cerchio, e quadruplo il circoscritto. Quindi se tal unità quadrata si concepisca divisa in 1,000000 di parti uguali; il quadrato iscritto in un tal cerchio sarà espresso da 2,000000, e 'l circoscritto da 4,000000. E trovando aritmeticamente un medio proporzionale tra i due numeri 2,000000, e 4,000000; un tal medio proporzionale, ch'è 2,8284271 esprimerà in quadrati del raggio l'ottagono iscritto \*. Ed il quarto proporzionale 3,3137085 in ordine alla somma di que' numeri, che si è poc' anzi veduto rappresentare l'ottagono, e 'l quadrato iscritto, al doppio di questo, ed al numero, che esprime il quadrato circoscritto, dinoterà anche in quadrati del raggio l'ottagono circoscritto \*. Similmente passando, col mezzo dei due precedenti Lemmi, dall'ottagono iscritto, e circoscritto ad un tal cerchio, prima alla figura di 16 lati iscritta, e poi allacircoscritta, e così continuando successivamente, si troverà esser

\* l. 1.

\* l. 2.

la fig. di 16 lati iscr. 3,06L4674, e la circosc. 3,1825979

32	3,1214452	3,1517249
64	3,1365485	3,1441184
128	3,1403311	3,1422236
256	3,1412772	3,1417504
512	3,1415138	3,1416321
1024	3,1415729	3,1416025
2048	3,1415877	3,1415951
4096	3,1415914	3,1415933
8192	3,1415923	3,1415928
16384	3,1415925	3,1415927
32768	3,1415926	3,1415926

Donde chiaramente apparisce, che le due figure ciascuna di 32768 lati uguali, una iscritta, e l'altra circoscritta al cerchio, fino alle loro parti diecimilionesime non si differiscono affatto tra loro, essendo espresse dallo stesso numero 3,1415926; ond'è, che, la loro differenza dovrà consistere in parti più piccole di una diecimilionesima del quadrato del raggio. E perciò anche il cerchio, ch'è medio tra queste due figure dovrà essere espresso da 3,1415926 quadrati del raggio. C. B. D.

## PROPOSIZIONE II.

### TEOREMA.

*Un cerchio sta al quadrato del suo diametro come 3,1415926 a 4,0000000.*

Essendo i cerchi come i quadrati de' diametri \*; \* 2.XII. starà, permutando, un cerchio al quadrato del



suo diametro, come un altro cerchio al quadrato del diametro suo. Ma nel teorema precedente una tal ragione per lo cerchio del raggio 1 si è trovata esser quella di 3,1415926 a 4,0000000: poichè eran questi i numeri, che si è veduto esprimere il cerchio; ed il quadrato del diametro. Laonde questa stessa dovrà esser la ragione di un qualunque altro cerchio al quadrato del suo diametro. C. B. D.

## PROPOSIZIONE VI.

### TEOREMA.

*Il diametro di un cerchio, sta alla sua circonferenza, come 1 a 3,1415926.*

- Imperocchè essendo il quadrato del diametro duplo del rettangolo del diametro stesso nel raggio \*, sarà quadruplo del triangolo rettangolo, che ha per lati intorno all' angolo retto un tal diametro, e il raggio; poichè questo triangolo è anche metà di quel rettangolo \*. Adunque starà questo triangolo al quadrato del diametro, come 1 a 4. Ma è poi il quadrato del diametro al cerchio come 4,0000000 a 3, 1415925. Laonde, per equalità, quel triangolo starà al cerchio, ossia ad un altro triangolo rettangolo, che ha per lati intorno all' angolo retto la circonferenza ed il raggio \*, come 1 a 3,1415926. Che perciò essendo questi triangoli come le basi \*, starà anche il diametro alla circonferenza, come 1 a 3, 1415926. C.B.D.
- F I N E.

**N O T E**  
**CRITICHE, E GEOMETRICHE**  
**SULL' UNDECIMO E DUODECIMO LIBRO**  
**DEGLI**  
**ELEMENTI DI EUCLIDE**

LE QUALI RENDONO RAGIONE DE' CAMBIAMENTI, CHE IN QUESTA EDIZIONE SI SONO FATTI NEL TESTO GRECO, O PURE CONTENGONO DELLE OSSERVAZIONI IN ALCUNE PROPOSIZIONI.

Seguite da alcune altre riflessioni sul nostro libro DELLA SFERA E DEL CILINDRO, e sull' altro DELLA MISURA DEL CERCHIO, col confronto di questi con quelli originali di ARCHIMEDE.

---

N A P O L I

---

1812.



# N O T E ec.

## ALLA DEF. IX. DEL LIB. XI.

Questa definizione nel Testo Greco è l'undecima del Lib. 11., ed è preceduta da quella de' solidi simili, e degli uguali e simili. Noi abbiamo dovuto invertire un tal ordine per premetterla a queste, in cui ne abbisognavamo; ne crediamo di esserci, così facendo, allontanati dal vero metodo di Euclide. In effetto nel Libro 1. degli Elementi di questo Geometra si trova la definizione dell'angolo piano premessa a quella delle figure rettilinee; quantunque in definir queste non si dovesse tener conto degli angoli. E perchè non avrebbe egli dovuto serbare lo stesso ordine nel Libro 11.? Se dunque questa def. del Lib. 11. si trova posposta a quella delle figure solide, abbiamo tutto il fondamento di credere esser ciò avvenuto per causa degli antichi espositori, i quali hanno in mille luoghi corrotto il Testo di Euclide. La nostra definizione è poi diversa un poco dalle due seguenti, che si trovano nel Testo Greco, e delle quali ci è sembrata essere più precisa.

## DEF. XI. LIB. XI. EUCL.

*Solidus angulus est plurium quam duarum linearum, quae se se contingant, et non in eadem siet superficie, ad omnes lineas inclinatio. Vel solidus angulus est qui pluribus quam duobus planis angulis comprehenditur, non existentibus in eodem plano, et ad unum punctum constitutis.*

Inoltre la nostra definizione, contiene anche espressa la condizione, che i lati dell'angolo solido sieno *linee rette*; il che non si trova indicato nelle definizioni attribuite ad Euclide, e che tutti i suoi Comentatori hanno ritenute: e si sa, che oltre questi angoli solidi la Geometria non ne considera altri.

ALLA DEF. X. DEL LIB. XI.

Nel Testo di Euclide una tal definizione, ch'è la 9, si trova fatta nel seguente modo

DEF. IX. LIB. XI. EUCL.

*Similes figurae solidae sunt, quae similibus planis multitudine æqualibus continentur.*

Or dalla nozione che si è già ricevuta della similitudine nel 6. libro per le figure piane, e che in questo luogo deve corrispondere a quella che se ne dà per le solide, si rileva, che queste dovrebbero divenire identiche (*uguali, e simili*), sol che i piani i quali si suppongono simili si facciano anche uguali; cioè sol che si supponga, che due lati omologhi di due di esse figure simili sieno uguali: il che supporrebbe, che gli angoli solidi contenuti dallo stesso numero di angoli piani rispettivamente uguali, e similmente disposti sieno necessariamente uguali; la qual cosa doveva esser dimostrata, e non assunta: molto più, perchè non essendo generalmente vera questa proprietà degli angoli solidi, poc' anzi detta, come sarà dimostrato nella nota alla Prop. A di questo libro, si poteva giustamente dubitare, che forse da la similitudine delle figure solide non si passasse all'uguaglianza loro, col supporre, che

i piani i quali terminano esse figure , divenissero uguali. E da ciò si vede , che la definizione rapportata negli Elementi di Euclide per le figure solide simili non sia completa , e che per renderla tale bisognava necessariamente aggiugnervi , come dal Simson , e da noi si è fatto , l'altra condizione , che gli angoli solidi corrispondenti sieno uguali . Che anzi una tal condizione si rende anche necessaria , affinchè l'idea di similitudine già data nel Lib. 6 consenta con quella , che se ne dà in questo luogo . Or in quel Libro , per le figure piatte si richiedeva , che oltre alla proporzionalità de' lati , fossero anche uguali gli angoli corrispondenti di tali figure ; ed in questa si doveva perciò esigere , che oltre alla similitudine de' piani , che terminano le figure solide , fossero anche uguali gli angoli solidi di esse .

#### ALLA DEF. XI. DEL LIB. XI.

Dalla precedente nota si rileva chiaramente , che la seguente enunciazione di Euclide : *Aequales et similes figurae solidae sunt quae similibus planis, multitudine , et magnitudine aequalibus continentur*, non possa esser mai una definizione , come vien rapportata nel Testo Greco , ov' è la 10 del Lib. 11 ; ma che sia un Teorema da dimostrarsi vero , o falso . Roberto Simson crede , che Teone , o altro antico editore , siasi fatto ingannare da una falsa evidenza , e di una proposizione ne abbia fatta una definizione ; e molto a proposito soggiunge : *Quamvis igitur verum esset figurarum solidarum quae similibus planis , multitudine , et magnitudine*

*æqualibus continentur, inter se æquales esse. merito tamen culpandus est is, qui ex hac propositione demonstranda definitionem fecit.* E questo ragionamento del Simson vien comprovato dallo stesso Euclide; mentre quest' accurato Geometra ne' suoi Elementi Piaui dimòstrò, e non assunse, che due triangoli i quali hanno i lati rispettivamente uguali sieno uguali: e se troviamo per prima definizione del Lib. 3, che *cerchi uguali sono quelli, che hanno uguali raggi*; ciò niente può provare in favor di coloro, che hanno ritenuta nel Libro 11. la def. 10. ( *Vegg. la Nota alla def. 1. Lib. 3.* ). Ma ha poi ragione il Simson di esclamare? *Quid autem dicendum si hæc propositio non vera sit? nonne confitendum est Geometras per mille trecentos annos in hac re elementari deceptos fuisse?* La maniera nella quale egli si sforza di provarlo, sebbene concludente, è pure una sottigliezza aliena dalla purità geometrica, e da quella semplicità, che deve porsi negli Elementi di questa scienza. Del resto una tal quistione non contribuisce per niente al nostro scopo di render gli Elementi di Euclide senza neo; è perciò noi la tralasciamo.

#### ALLE DEFF. XVIII, e XXI. DEL LIB. XI.

Chiunque sa, che le cose, che si contengono in un libro elementare di Geometria non debbono esser mai più generali dell' applicazione, che deve farsene, e che quindi le definizioni debbono essere ad esse proporzionate; non dimanderà certamente, perchè mai Euclide abbia definito

particolarmente il cono , ed il cilindro , cioè il solo cono , e cilindro , che , data la definizione generale di questi solidi , si direbbero *retti* . Ed ognuno , che per poco è versato nelle cose geometriche sa bene , che le poche verità , che si contengono nel Libro 12. circa il rapporto di questi solidi , sono le sole , delle quali occorre servirsi nell' intero Corso delle Matematiche : che perciò , sebbene esse si appartenessero ugualmente al cono , ed al cilindro in generale , e che il rilevarle si generalmente , che particolarmente sia lo stesso , come potrà vedersi presso Clavio e Commandini ; purtuttavia Euclide , per ragion di metodo , e per una certa semplicità elementare , si contentò dimostrarle per lo cono , e per lo cilindro retto solamente : e quindi non dovè dare , che le definizioni di questi solidi , e non già quelle del cono , e del cilindro in generale . Di più l' aver ritenute per questi solidi le definizioni Euclidee , com' era conveniente , per ciò che poc' anzi si è detto , ci ha anche procurato l' altro vantaggio di non essere stati obbligati nel Libro sulla Sfera e sul Cilindro ad aggiugnere , ogni volta , che si è parlato del cono , eccetto che nella Prop. 14. , la condizione ch' esso sia retto , cioè *isoscele* , come lo chiama Archimede ; mentre le verità ch' egli dimostra per questo solido , ad una tal sola sua specie , e non già al cono in generale , si appartengono .

## ALLA PROP. II. DEL LIB. XI.

Nel Testo di Euclide la prima parte di questa Proposizione si trova enunciata nel seguente modo : *Ogni triangolo è in un piano* . Or non



essendo concepibile, che Euclide abbia voluto in questo luogo dimostrare ciò; che aveva assunto ne' primi sei Libri; bisogna supporre, che tal Prop. sia stata da taluno mutata, e viziata: che perciò noi ad imitazione del Simson abbiamo cambiata quell' enunciazione in quest' altra: *Tre punti, che non stieno per dritto, sono in un piano*, e per la dimostrazione di una tal verità ci siamo serviti di quell' istesso semplicissimo ripiego, del quale si era avvalto il Simson.

ALLA PROP. III. DEL LIB. XI.

Questa Prop. si trova dimostrata ne' nostri Elementi in una maniera diretta, ed anche più semplice di quella di Euclide.

ALLA PROP. VII. DEL LIB. XI.

Questa Prop. è stata senza dubbio intrusa nel Testo Greco da qualche antico espositore, per un mal' inteso rigore. Imperciocchè la verità, che in essa si dimostra, cioè che: *La linea retta che unisce due punti presi in due linee rette parallele, cade nel piano di queste*, o ch'è lo stesso, che: *La linea retta che unisce due punti presi in un piano, cade nel piano stesso*, è compresa nella natura della linea retta, e del piano, ed è stata varie volte assunta dallo stesso Euclide; del che potrà vedersene un esempio nella Prop. 30 Lib. I. E ciò mostra chiaramente, ch' Euclide non credè mai necessario il dimostrarla.

Inoltre la dimostrazione di una tal Prop. 7. è

fondata sulla 3. del libro stesso, nella quale ben due volte si assume da Euclide ciò, che nella 7. si vuol dimostrare: e lo stesso si trova anche assunto nella dimostrazione della Prop. 6.

ALLA PROP. XX. DEL LIB. XI.

Nel principio di questa dimostrazione si trova *fig. 18.* nel Testo Greco: » ma se non lo è, sia BAC il maggiore ». Or siccome l'angolo BAC può essere uguale ad uno de' rimanenti, si è perciò da noi, e dal Simson detto » ma se non lo è, sia l'angolo BAC non minore di uno qualsivoglia de' rimanenti; maggiore però di DAB.

ALLA PROP. XXI. DEL LIB. XI.

È qui a proposito il far rilevare, che non possono costituirsi altri angoli solidi con angoli piani di figure rettilinee regolari, che cinque solamente. In fatti dagli angoli piani del triangolo equilatero si possono costituire tre angoli solidi diversi, combinandone insieme tre, quattro, o cinque: perchè fino a questa somma si ha sempre una quantità minore di quattro retti; mentre da sei in poi tal quantità si fa uguale a quattro retti, o maggiore. È chiaro ancora, che dagli angoli del quadrato non possa costituirsi, che semplicemente quell'angolo solido, ch'è contenuto da tre di essi: e si potrà pure costituire un angolo solido con tre angoli del pentagono regolare insieme presi; poichè questi fanno meno di quattro retti. Al contrario non se ne potrà costituire uno

da tre angoli dell' esagono regolare , che fanno già quattro retti ; e molto meno se ne potrà ottenere uno con tre angoli dell' ettagono regolare , o di altra figura regolare di maggior numero di lati .

Or il primo de' cinque summentovati angoli è quello del *tetraedo* ; il secondo dell' *ottuaedro* ; il terzo dell' *icosaedro* , che , come si detto nelle definizioni 26 , 27 , e 29 del Lib. 11. , sono figure solide terminate da triangoli equilateri . Di più l' angolo solido compreso da tre angoli retti si appartiene al *cubo* , ed al *dodecaedro* quello , ch' è contenuto da tre angoli del pentagono regolare . Ma eccone di queste cinque figure solide un' elegante costituzione , ricavata dal Lib. 13. degli Elementi dello stesso Euclide .

#### LEMMA I. ( PROP. 4. LIB. XIII. EUCL. )

*Se una linea retta sia divisa in estrema e media ragione ; i quadrati della tutta , e della parte minore sono tripli di quello della parte maggiore .*

- fig. 1. N. Sia la retta AB divisa in C , come si è detto ; sarà il quadrato di AB insieme con quello di BC uguale al doppio rettangolo di AB in BC insieme  
 \* 7. II. col quadrato di AC \* : ma il rettangolo di AB in BC è uguale al quadrato di AC ; e quindi il doppio di quello al doppio di questo . Dunque il quadrato di AB insieme con quello di BC è triplo del quadrato di AC. C. B. D.

#### LEMMA II. ( PROP. 5. LIB. XIII. EUCL. )

*Se una linea retta si divida in estrema , e media*

*ragione , e poi gli si aggiunga per dritto il maggior segmento : l'intera linea retta sarà anche divisa in estrema , e media ragione ; ed il segmento maggiore sarà quella linea , che si era posta da principio .*

Sia la linea retta BA divisa in C in estrema , *fig.2. N.* e media ragione , e per dritto ad essa si ponga la AD uguale alla AC.

E poichè BA sta ad AC , come AC a CB ; sarà , inventando , AC a BA , come CB ad AC , e componendo BD a BA , come BA ad AC , ossia ad AD ; e perciò la BD è divisa in estrema , e media ragione in A , ed AB è il maggior segmento . C. B. D.

LEMMA III. ( PROP. 12. LIB. XIII. EUCL. )

*Se in un cerchio vi s' iscriva un triangolo equilatero ; il quadrato di un lato di questo triangolo sarà triplo di quello del raggio del cerchio .*

Sia ABC il triangolo equilatero iscritto nel cerchio *fig.3. N.* ABC , il cui raggio AD si prolunghi in E , e si unisca la BE. E poichè ABC è un lato del triangolo equilatero iscritto nel cerchio ABC ; sarà l'arco BEC la terza parte della circonferenza : quindi l'arco BE , ch'è metà di BEC ne dinoterà la sesta parte ; e perciò la congiungente BE , essendo il lato dell'esagono regolare iscritto in questo cerchio , pareggerà il raggio AD \*. Or il quadrato di *\*c.15.IV.* AE , ch'è quadruplo di quello di AD , essendo uguale ai quadrati di AB , e BE , saranno questi anche il quadruplo del quadrato di AD . Per lo che se da' quadrati AB, BE se ne tolga quello

di BE, e dal quadruplo del quadrato di AD se ne tolga uno di essi; dovrà restare il quadrato di AB uguale a tre quadrati di AD: e perciò quel quadrato sarà triplo dell' altro di AD. C. B. D.

LEMMA IV. ( PROP. 7. LIB. XIII. EUCL. )

*Se tre angoli di un pentagono equilatero sieno uguali, o che si succedano, o no: il pentagono sarà equiangolo.*

fig. 4. N. Sieno primieramente uguali gli angoli successivi in A, B, C del pentagono ABCDE: si conducano le AC, BE, FD. E poichè le due CB, BA sono uguali alle due EA, AB, e che l'angolo CBA è uguale all'angolo BAE; sarà CA uguale a BE, l'angolo BCA uguale all'angolo AEB, e l'angolo BAC, o sia BAF uguale all'altro ABE, o sia ABF\*. Laonde, essendo uguali gli angoli BAF, ABF, sarà AF uguale ad FB, e per conseguenza anche FC sarà uguale ad FE. Adunque essendo CF uguale ad FE, CD uguale a DE, e DF comune; sarà l'angolo FCD uguale all'altro FED. Ma era anche FCB uguale ad FEA: quindi sarà tutto l'angolo BCD uguale all'altro AED, e perciò questo angolo pareggerà ancora ciascun di quelli in A, ed in B. Similmente si dimostra, che ad essi sia uguale l'angolo CDE: dunque il proposto pentagono sarà equiangolo.

Non sieno ora contigui gli angoli uguali; masi bene sieno essi quelli in A, C, D: si unisca BD. E poichè le due BA, AE sono uguali alle due BC, CD, e comprendono angoli uguali,

sarà la base BE uguale alla base BD , l'angolo AEB all'angolo CDB , e l'angolo ABE all'altro CBD : ma è pure l'angolo BED uguale all'angolo BDE ; poichè si è dimostrata BE uguale a BD . Adunque tutto l'angolo AED sarà uguale a tutto l'altro CDE , e perciò anche a quelli in A , C ; ai quali si dimostrerà similmente essergli uguale l'angolo ABC. Quindi il proposto pentagono è equiangolo . C. B. D.

LEMMA V. ( PROP. 10. LIB. XIII. EUCL. )

*Il quadrato del lato del pentagono regolare iscritto in un cerchio è uguale ai quadrati de' lati dell'esagono , e del decagono regolare iscritti nel cerchio stesso ,*

Rappresenti AB il lato del pentagono regolare *fig. 5. N.* iscritto nel cerchio ACD , ed alla AB si abbassi dal centro F la perpendicolare FH , che si produca in K , e si uniscano le KB , KA , BF , FA ; sarà KA , o KB il lato del decagono iscritto in un tal cerchio : finalmente si abbassi su di AK la perpendicolare FLM , si unisca KN , e si prolunghi AF in G .

E poichè AB è il lato del pentagono , sotterrà esso la quinta parte della circonferenza , ossia  $\frac{2}{5}$  parti della semicirconferenza ; e perciò se si applichi nel semicerchio ABCG la BC uguale alla AB , il rimanente arco CG dovrà essere la quinta parte della semicirconferenza , cioè uguale ad AK. Ma l'arco AK è doppio dell'altro KM: dunque anche l'arco CG sarà doppio dell'altro KM . E perciò tutto l'arco BG sarà anche doppio dell'altro

EM; e quindi anche l'angolo BFG dovrà esser doppio dell'altro BFM. Ma un tal angolo

- \* 20. III. GFB è pur doppio dell'angolo EAB\*: perciò sarà l'angolo BEN uguale all'altro BAF; ed i triangoli BFA, BEN, che hanno i già detti angoli uguali; e l'angolo ABF di comune, saranno equiangoli, e perciò simili. Laonde sarà AB a BF, come BF a BN; ed il rettangolo ABN pareggerà il
- \* 16. VI. quadrato di BF\*. Or poichè AL è uguale ad LK, e la NL è comune, e perpendicolare alla KA; sarà KN uguale ad NA, e l'angolo LKN anche uguale all'altro LAN. Ma l'angolo LAN è uguale all'angolo KBN\*; perciò anche l'angolo LKN sarà uguale a KBN: è poi l'angolo NAK comune ai due triangoli AKB, AKN; dunque il triangolo AKB è equiangolo all'altro KNA, e perciò BA sta ad AK, come KA ad AN; ed il rettangolo BAN sarà uguale al quadrato di AK. Laonde essendosi già dimostrato il rettangolo ABN uguale al quadrato di BF; i due rettangoli ABN, BAN insieme presi, cioè il quadrato di AB, pareggerà i quadrati di BF, e di AK. C. B. D.

PROP. I. PROBL. (PROP. 13. LIB. XIII. EUCL.)

*Costituire un tetraedo.*

- fig. 6. Si esponga una qualunque retta AB, dalla quale
- \* 9. VI. se ne tagli la terza parte BC\*; poi si descriva su di essa il semicerchio ADB, nel quale si tirì la CD perpendicolare al diametro. Ciò posto si esponga il cerchio EFG, che abbia per raggio una retta uguale a CD, e descritta in esso il triangolo equi-

atero EFG si elevi dal centro H la HK perpendicolare al piano del cerchio, ed uguale alla AC; e finalmente congiungansi le KE, KF, KG: dico che la piramide EFGK sia un tetraedo.

E poichè la KH è perpendicolare al piano EFG, e quindi alle rette HE, HF, HG\*; perciò i triangoli rettangoli KHE, KHF, KHG avendo uguali i loro cateti, avranno anche uguali le ipotenuse KE, KF, KG, e di più ciascuna di queste, com'è chiaro, pareggerà la AD. Or per gli triangoli simili ADC, DBC deve stare AD a DC, come DB a BC; e quindi saranno anche proporzionali i quadrati che da tali rette descrivonsi\*: ma il quadrato di DB sta a quello di BC, come AB a BC; perciò in questa ragione sarà pure il quadrato di AD a quello di DC. Laonde essendo AB tripla di BC, sarà anche il quadrato di AD triplo di quello di DC: ma è poi il quadrato di EF triplo di quello di EH\*, ed è EH uguale a DC. Dunque sarà il quadrato di AD uguale a quello di EF; e perciò AD pareggerà EF. Per la qual cosa le KE, KF, KG, EF, FG, GE essendo tutte uguali, i triangoli EFG, EKF, FKG, GKE saranno tutti equilateri, ed uguali: e quindi il solido FG EK sarà un tetraedo\*. C. B. F.

\*d.3.XI.

\* 22.VI.

\* 1. 3.

\*d.26.XI.

PROP. II. PROBL. (PROP. 14. LIB. XIII. EUCL.)

*Constituire un ottaedro.*

Si esponga il quadrato EFGH, nel quale si tirino le diagonali EG, FH, che si divideranno in parti uguali in K, e ad angoli retti\*: indi dal punto K si tiri al piano EFGH la perpendicolare

\*d.9.IV.



\* 12.XI.  $MKL$  \*, che si prolunghi dall'una, e dall'altra parte del piano in  $L$ ,  $M$ , e tagliate da essa le  $KL$ ,  $KM$  uguali ad una delle  $KE$ ,  $KF$ ,  $KG$ ,  $KH$ , si uniscano le  $LE$ ,  $LF$ ,  $LG$ ,  $LH$ ,  $MF$ ,  $ME$ ,  $MG$ ,  $MH$ : dico che il solido contenuto dagli otto triangoli  $ELF$ ,  $FLG$ ,  $GLH$ ,  $HLE$ ,  $EMF$ ,  $FMG$ ,  $GMH$ ,  $HME$  sia un ottaedro. .

Imperocchè essendo  $EK$  uguale a  $KH$ , e l'angolo in  $K$  retto; sarà il quadrato di  $EH$  doppio di quello di  $EK$ : e di nuovo essendo  $EK$  uguale a  $KL$ , e l'angolo in  $K$  retto; sarà il quadrato di  $EL$  doppio di quello di  $EK$ . Laonde sarà il quadrato di  $EL$  uguale a quello di  $EH$ , ed  $EL$  uguale ad  $EH$ . Similmente si dimostra che  $LH$  sia uguale ad  $HE$ ; quindi il triangolo  $ELH$  è equilatero. E nel modo stesso dimostrandosi, che sieno equilateri gli altri triangoli, che hanno per basi i lati del quadrato  $EFGH$ , e per vertici i punti  $L$ ,  $M$ ; ne segue, che si è in tal modo costituito un ottaedro \*. C. B. F.

PROP. III. PROBL. ( PROP. 15. LIB. XIII. EUCL. )

*Costituire un cubo.*

fig. 8. N. Si esponga il quadrato  $FGML$ , e poi dai vertici  $F$ ,  $G$ ,  $M$ ,  $L$  de' suoi angoli si elevino al piano di esso le perpendicolari  $FE$ ,  $GH$ ,  $MN$ ,  $LK$ , ciascuna delle quali si tagli uguale ad un lato del quadrato proposto. Finalmente si uniscano le  $EK$ ,  $KN$ ,  $NH$ ,  $HE$ ; si verrà in tal modo a costituire il solido  $GK$  terminato da sei quadrati  $GL$ ,  $LE$ ,  $EN$ ,  $NG$ ,  $GE$ ,  $MK$ , che per-

\*d.25.XI. ciò è un cubo \*. C. B. F.

PROP. IV. PROBL. ( PROP. 16 LIB. XIII. EUCL. )

*Constituire un icosaedro.*

Si esponga la linea retta AB dalla quale se ne *fig. 9 V.* tagli la quinta parte \* : e descritto su di essa AB \* *9. VI.* il semicerchio ADB , si tiri in questo la CD perpendicolare alla AB , e si unisca DB . Ciò posto si esponga il cerchio EFGHK , il cui raggio VE sia uguale a DB , e descritto in esso il pentagono regolare EFGHK , si biseghino gli archi FG , GH , HK , KE , EF , in M , N , X , O , L , e si uniscano le EL , LF , FM , MG , GN , NH , HX , XK , KO , OE , e le altre LM , MN , NX , XO , OL ; sarà LMNXO un altro pentagono regolare iscritto nel cerchio stesso , ed ELFMGNHXKO sarà il decagono . Dopo ciò dai punti E , F , G , H , K si elevino al piano del cerchio le perpendicolari EP , FR , GS , HT , KY , ciascuna delle quali sia uguale al raggio EV , e si uniscano le PR , RS , ST , TY , YP , PL , LR , RM , MS , SN , NT , TX , XY , YO , OP .

E poichè le EP , KY sono ambedue perpendicolari al piano stesso , saranno parallele tra loro ; ma sono di più uguali ; perciò anche la PY è uguale e parallela alla EK , cioè al lato del pentagono regolare iscritto nel cerchio EFGHK . E dimostrando nel modo stesso , che ciascuna delle PR , RS , ST , TY sia quant' il lato del pentagono iscritto nel medesimo cerchio , ne segue che il rettilineo PRSTY sia identico a questo pentagono . È poi PE quanto il lato dell' esagono iscrivibile nel

- cerchio stesso, EO è quello del decagono, e l'angolo PEO è retto; quindi PO sarà anche quanto il lato del pentagono \*. Similmente si dimostra, che lo sia OY; perciò POY è un triangolo equilatero: e nel modo stesso si rileverà, che sieno triangoli equilateri gli altri PLR, MRS, SNT, TXY. E poichè si è dimostrato, che si PL, che PO sia quanto il lato del pentagono, cioè uguale ad LO; perciò il triangolo LPO sarà equilatero: e triangoli equilateri pur saranno LRM, MSN, NTX, XYO.

- Or dal punto V, ch' è centro del cerchio EFGHK si elevi al piano di un tal cerchio la perpendicolare  $\psi V\Omega$ , che si produca dall' una, e dall' altra parte in  $\psi$ ,  $\Omega$ , e si tagli la VQ uguale al raggio del cerchio, e poi le  $V\psi$ ,  $Q\Omega$ , ciascuna uguale al lato del decagono: finalmente si uniscano le  $P\Omega$ ,  $PQ$ ,  $Y\Omega$ ,  $EV$ ,  $LV$ ,  $L\psi$ ,  $\psi M$ . E poichè ciascuna delle VQ, PE è perpendicolare al piano del cerchio EFGHK, saranno esse parallele; ma sono anche uguali; quindi EV sarà uguale, e parallela a PQ; e perciò PQ al pari di EV è quant' il lato dell' esagono. Ma è poi  $Q\Omega$  quanto quello del decagono; dunque  $P\Omega$  il cui quadrato pareggia quelli di PQ, e di  $Q\Omega$  sarà quant' il lato del pentagono \*. Similmente si dimostra, che  $Y\Omega$  sia quanto il lato del pentagono, cioè quanto PY; adunque il triangolo  $P\Omega Y$  sarà equilatero. E collo stesso ragionamento si proverà, che sia equilatero ciascuno de' rimanenti triangoli, che hanno per basi le PR, RS, ST, TY, e per vertice il punto  $\Omega$ . Di nuovo, poichè il quadrato di  $\psi L$  è uguale ai quadrati di VL, lato dell' esagono, e di  $V\psi$ , ch' è lato del decagono, sa-

rà  $L\Psi$  quant' il lato del pentagono  $\ast$  : e dimostrano  $\ast$  1. 5. do che anche  $M\Psi$  sia quanto un tal lato , cioè uguale ad  $LM$  , sarà  $L\Psi M$  un triangolo equilatero. E nella stessa guisa si dimostrerà , che sieno triangoli equilateri quelli altri , che hanno per basi le  $MN$  ,  $NX$  ,  $XO$  ,  $OL$  , e per vertice il punto  $\Psi$ . Si è dunque costituito un solido compreso da venti triangoli equilateri , che perciò è un icosaedro  $\ast$ .  $\ast$ d. 29. XI. C. B. F.

PROP. V. PROBL. ( PROP. 17. LIB. XIII. EUCL. )

*Costituire un dodecaedro .*

Si espongano due piani di un cubo perpendicolari tra loro , e sieno questi  $ABCD$  ,  $EBCF$  ; e poi si dividano per metà tutt' i loro lati in  $G$  ,  $H$  ,  $K$  ,  $L$  ,  $M$  ,  $N$  ,  $X$  , e si uniscano le  $GPK$  ,  $HPL$  ,  $MOH$  ,  $NOX$  . Indi si dividano le  $NO$  ,  $OX$  ,  $HP$  in estrema , e media ragione ne' punti  $R$  ,  $S$  ,  $T$  , e sieno  $OR$  ,  $OS$  ,  $PT$  i segmenti maggiori ; e da questi punti  $R$  ,  $S$  ,  $T$  si elevino ai piani  $BF$  ,  $BD$  e dalla parte esterna del cubo le perpendicolari  $RY$  ,  $SV$  ,  $TQ$  uguali a ciascuna delle  $OR$  ,  $OS$  ,  $TP$  : finalmente si uniscano le  $BY$  ,  $YV$  ,  $VC$  ,  $CQ$  ,  $QB$  . Dico che il pentagono  $BYVCQ$  sia equilatero , equiangolo , ed in un solo piano ; e che quindi sia uno di quei dodici , che terminano il dodecaedro da costituirsi .

Si uniscano le  $RB$  ,  $SB$  ,  $VB$  . E poichè la linea retta  $NO$  è divisa in estrema , e media ragione in  $R$  , saranno i quadrati di  $ON$  e di  $NR$  tripli di quello di  $OR$   $\ast$  ; cioè i quadrati di  $BN$  e di  $NR$  ,  $\ast$  1. 2.

o sia il quadrato di BR sarà triplo del quadrato di RO, cioè dell'altro di RY. Laonde sarà il quadrato di BY, ch'è uguale a quelli di BR, RY quadruplo del quadrato di RY; e quindi BY dupla di RY. Ma VY è pur dupla di YR; poichè RS è dupla di RO, o sia di RY; perciò BY è uguale ad VY. Similmente si dimostrerà che ciascuna delle BQ, QC, CV sia uguale a BY, o ad YV; quindi il pentagono BYVCQ è equilatero.

Dico ora, che esso sia in un piano. Si tiri dal punto O la OZ parallela ad RY, o ad SV, dalla parte esterna del cubo, e si uniscano le ZH, HQ; queste ZH, HQ dovranno stare per dritto. Imperocchè essendo la HP divisa in T in estrema, e media ragione, sarà HP a PT, come PT ad HT; ma HP è uguale ad HO, e PT è uguale a TQ, ossia ad OZ; dunque sarà HO ad OZ, come QT a TH; ed è HO parallela a TQ, perchè sono entrambe perpendicolari al piano BD; come pure TH è parallela ad OZ, perchè ciascuna è perpendicolare al piano BF. Adunque dovrà esser ZH in diretto con

\* 3a. VI. HQ\*: e perciò il piano BQC in cui esiste la parte HQ della linea retta QHZ dovrà essere in diretto col piano BYVC in cui si trova l'altra parte HZ della stessa retta QHZ: vale a dire, che il pentagono BQCVY si troverà in un piano.

Bisogna adesso dimostrare, che sia equiangolo. E poichè la linea retta NO è divisa in R in estrema, e media ragione, e gli si è aggiunta per dritto la OS, ch'è uguale al suo maggior segmento OR; perciò anchè la NS sarà divisa in O in estrema, e media ragione, ed ON sarà il segmento

\* 1. 2. maggiore\*. Laonde i quadrati di NS e di SQ,

o sia di NS e di SV sono il triplo di quello di ON, o pure di NB \*. Adunque aggiuntovi di comune il quadrato di NB, saranno i quadrati di SV, SN, NB uguali a quattro quadrati di NB. Ma i quadrati di SN, NB sono uguali a quello di BS; perciò i quadrati di BS e di SV, cioè il quadrato di BV è quadruplo di quello di BN; e quindi BV doppia di BN, o sia uguale a BC. E poichè le due BY, YV sono uguali alle due BQ, QC, ciascuna a ciascuna, e la base VB è uguale alla base BC; sarà l'angolo BYV uguale all'angolo BQC. Similmente dimostreremo, che l'angolo YVC sia uguale all'angolo BQC: quindi i tre angoli BQC, BYV, YVC sono tra loro uguali; e perciò il pentagono BQCVY è equiangolo\*; ed era anche equilatero. Dunque è un pentagono equilatero ed equiangolo. \* l. 1. \* l. 4.

Che se si espongono gli altri due piani del cubo perpendicolari ad AC, e contigui a CE, cioè  $D\alpha\beta C$ , ed  $A\lambda\delta B$ ; e che poi si biseghino anche i loro lati, e si faccia la stessa costruzione, che si è fatta precedentemente, prendendo da una parte il piano  $D\alpha\beta C$  in cambio del piano AC, e questo invece di BF; e dall'altra prendendo il piano  $A\lambda\delta B$  invece di BD, e questo in luogo di CE: si dimostrerà similmente, che i pentagoni  $QC\delta D\theta$ ,  $Q\Gamma\gamma\Lambda\theta$  sieno equilateri, equiangoli, ed uguali al primo BQCVY, per aver con esso comuni i lati QB, QC,  $Q\theta$ . Si sono dunque costituiti tre pentagoni tangenti i tre lati  $BC^*$ , DC, AB del cubo; e coeurenti l'uno all'altro per mezzo dei lati BQ, QC,  $Q\theta$ , che gli sono comuni. Se dunque col metodo stesso si costituiscano altri nove pentagoni tangenti rispettivamente gli altri nove lati del cubo,

\*d.28.XI.si sarà costituito il dodecaedro.\*. C.B.F.

### SCOLIO GENERALE.

Posta questa general costituzione delle cinque figure solide regolari, sarà facile adesso il descrivere uno di essi, che abbia un lato dato, o iscrivere in una data sfera. E questa seconda condizione è stata sempre da Euclide aggiunta, come seconda parte a ciascuno de' summentovati Problemi; poichè essa in effetto si deriva quasi come immediata conseguenza dalla prima ricerca. Euclide da questa ha di più ricavato il rapporto, che serba il diametro della sfera al lato del poliedro regolare in essa iscritto; e quindi ha rapportati tra loro i lati di questi cinque poliedri iscritti in una stessa sfera (*Veg. la Prop. 18. Lib. 13.*). Ma noi siamo già andati molto innanzi in tale argomento, avendo in questa nota compreso quasi tutto il Lib. 13. degli Elementi, che se conveniva da una parte tralasciare, per la poca importanza dell'argomento, come in quasi tutte le istituzioni si trova praticato, non dovevasi altronde omettere di rapportarne in qualche modo i principali Probl. da noi esposti; sì perchè eran questi necessarj a stabilire la possibilità delle definizioni 25, 26, 27, 28, e 29 del lib. XI; sì anche perchè le costruzioni di essi non dovevano, per la loro eleganza, restar obbliate.

### ALLE PROPP. XXII., e XXIII. DEL LIB. XI.

Nella Prop. 22. Euclide dimostra, che: *Se vi sieno tre angoli piani due de' quali sono maggiori*

*del terzo , comunque si prendano , ed essi abbiano lati uguali ; si potrà costituire un triangolo dalle congiungenti gli estremi de' lati uguali : ed una tal Proposizione gli serve di Lemma alla costruzione della 23 . Or avendo noi mutata la soluzione di questo Problema , abbiamo dovuto anche cambiare quel Lemma Euclideo in un' altro , ch' e quello , che trovasi ne' nostri Elementi .*

Intanto siccome la soluzione Euclidea della Prop. 23 , che ha il difetto di essere un po' troppo lunga , non manca nè di rigore , nè di geometrica eleganza ; si potrà , da chi amasse conoscerla , riscontrare nell' Euclide del Simson , ove si trova esposta con maggior brevità , e più semplicemente , che nel Testo Greco .

#### ALLE PROPP. A , E B DEL LIB. XI.

Nella Prop. 26 di questo Libro Euclide assume la prima volta , che due solidi terminati da piani simili , ed uguali sieno uguali , e simili . Adunque era necessario , che tal proposizione si dimostrasse prima della 26 . E siccome i solidi di cui trattasi nella 26. sono parallelepipedi ; e che in generale negli Elementi non si tratta d' identità , che tra figure solide i cui angoli solidi sono compresi da tre soli angoli piani ; perciò era sufficiente , che la dimostrazione poc' anzi detta si limitasse a questo caso , niente importando se essa si verificchi , o no per gli altri . Or per questa dimostrazione si esigeva , com' è chiaro , e come si è detto anche nella Nota alla def. 10 , che si fosse prima dimostrato , che due angoli solidi contenuti da tre an-



goli piani rispettivamente uguali, e similmente posti sono uguali: che perciò noi abbiamo dovuto premetterlo alla 26, come due lemmi, le Prop. A, e B, dalle quali l'uguaglianza degli angoli solidi contenuti da tre angoli piani, e l'uguaglianza, e similitudine delle figure solide, che hanno le condizioni espresse nel principio di questa nota, resta geometricamente stabilita. Vale a dire, che per mezzo di questi lemmi restau rigorosamente dimostrate le Prop. 25, 26, e 28 del Lib. XI.; e quindi le altre, che su di esse sono fondate; cioè le Prop. 27, 31, 32, 33, 34, 36, 37, e 40 del Libro stesso; l'8 del Lib. 12, ed il Cor. della 17 di questo Libro, come si ha ora in Euclide.

Il Simson per dimostrare la Prop. A vi ha premesso l'altro lemma, cioè che: *Se vi sieno due angoli solidi, ognun de' quali sia contenuto da tre angoli piani uguali tra loro, ciascuno a ciascuno; i piani ne quali esistono gli angoli uguali saranno similmente inclinati*: la qual verità, come ben si vede trovasi al contrario compresa nell'uguaglianza degli angoli solidi proposti, quando questa si dimostrasse indipendentemente da quella. Or ritrovandosi in Euclide stesso, e nel medesimo Lib. 11. una dimostrazione, che pare ordita piuttosto a quest'oggetto, che all'altro cui è destinata, quella cioè della Prop. 35, noi l'abbiamo preferita alla dimostrazione del Simson; molto più perchè da tal dimostrazione se ne ricava per immediata conseguenza una verità della quale si ha bisogno nella 40. del Lib. 11, e che Euclide, e Simson erano obbligati a dimostrare precisamente con quel ragionamento, che a noi è servito per dimostrare l'uguaglianza degli

angoli solidi di cui trattasi nella Prop. A ( *Veggasi la Nota alla Prop. 35 di questo Lib.* )

Che poi non si verifichi generalmente, che gli angoli solidi contenuti da angoli piani in numero maggiore di tre, i quali sieno rispettivamente uguali, e similmente posti, debbano coincidere; la qual cosa si è già accennata nella Nota alla def. 10 di questo Lib., si può dimostrare nel seguente modo.

## P R O P.      T E O R.

*Con quattro angoli piani, disponendoli collo stesso ordine, si può costituire una moltitudine di angoli solidi disuguali.*

Sieno M, N, P, Q i quattro angoli piani proposti, e da essi si supponga già costituito l'angolo solido in A, in modo, che BAC sia uguale ad M, CAD ad N, DAE a P, EAB a Q. Si supponga in primo luogo, che i due angoli M ed N sieno maggiori dei rimanenti P e Q; che perciò questi due ultimi non potranno, insieme presi, pareggiar due retti \*. Or poichè i due angoli M ed N, cioè BAC e CAD sono maggiori dell'angolo BAD \*, e che M, cioè BAC, insieme con BAD è maggiore di CAD, o sia di N; ed al contrario N, cioè CAD insieme con BAD è maggiore di CAB o sia di M: perciò dev'essere M insieme con P e Q, maggiore di N; ed N, insieme cogli stessi angoli P e Q maggiore di M. Laonde dai tre angoli piani M, N, e P insieme con Q, i quali hanno le condizioni delle Propp. 20, e 21 Lib. XI. si potrà costituire un angolo solido. Sia questo l'an-

\* 21. XI.

\* 29. XI.

golo solido in  $a$  compreso dai tre angoli piani  $bac$  uguale ad  $M$ ,  $cad$  uguale ad  $N$ , e  $bad$  uguale a  $P$  e  $Q$ . Ciò posto sieno similmente gli angoli  $M$ ,  $Q$  maggiori dei rimanenti due  $N$ ,  $P$ ; che perciò nè meno questi potranno essere uguali a due retti. Si dimostrerà come poc' anzi, che dai tre angoli piani  $M$ ,  $Q$ , ed  $N$  insieme con  $P$  si possa costituire un angolo solido. Si costituisca dunque quest' altro angolo

- \* 26.XI. solido nel punto  $a$  della  $ab$  \*, e sia quello, ch' è contenuto dall' angolo  $bac$  uguale ad  $M$ , dall' angolo  $bae$  uguale a  $Q$ ; e dall' altro  $cae$  uguale ad  $N$  e  $P$ . Or è evidente, che se il piano dell' angolo  $cad$  s' intenda rivolgersi un poco intorno alla  $ca$ , e verso la  $ba$ ; minorandosi l' angolo  $bad$ , e divenendo  $baf$ ; si potrà costituire al punto  $a$  della  $ab$  un angolo solido compreso dai tre angoli piani  $baf$ ,  $bae$ , ch' è uguale a  $Q$ , ed  $eaf$ , ch' è lo stesso che  $ead$ , o sia  $P$ : quindi si sarà già costituito al punto  $a$  della  $ab$  un angolo solido contenuto dai quattro angoli piani  $bac$ ,  $caf$ ,  $fae$ ,  $eab$ , che sono rispettivamente uguali ai proposti  $M$ ,  $N$ ,  $P$ ,  $Q$ . E siccome l' artificio poc' anzi adoperato potrà sempre aver luogo, fintantochè il lato  $ad$  non cada nel piano dell' angolo  $eac$ , nel qual caso svanisce di nuovo l' angolo solido in  $a$  compreso dai quattro angoli piani  $bac$ ,  $caf$ ,  $fae$ ,  $eab$ , e ne risulta quello che si contiene dai tre  $bac$ ,  $bae$ ,  $eac$ ; è chiaro perciò, che tra i limiti  $bad$ ,  $cae$  si potranno costituire moltissimi angoli solidi compresi dai medesimi quattro angoli piani  $M$ ,  $N$ ,  $P$ ,  $Q$  disposti coll' ordine stesso.

Che se gli angoli  $M$  ed  $N$  insieme presi risultino uguali agli altri  $P$  e  $Q$  presi insieme; ritro-

vandosi, o no anche gli angoli  $N$  e  $P$  uguali agli angoli  $M$  e  $Q$ : è chiaro, che la dimostrazione procederà nel modo stesso, sol che gli angoli *bad*, *cae* suppongansi per poco minori, il primo di questi de' due  $P$ ,  $Q$ , e l' altro degli altri due  $N$ ,  $P$ ; e di più compresi tra i limiti dinotati per lo primo dalla somma degli angoli  $P$ ,  $Q$ , e dalla differenza degli altri  $M$ ,  $N$ ; e per l' altro dalla somma degli angoli  $N$ ,  $P$ , e dalla differenza degli altri  $M$ ,  $Q$ . E perciò è chiaro, che anche in questo caso, si potranno costituire moltissimi angoli solidi dai quattro angoli piani proposti. C. B., D.

Or dalla dimostrazione rapportata si rileva chiaramente, che questa varietà di angoli solidi compresi da quattro angoli piani dipende dalla diversità dell' angolo *bad*, o pur da quella dell' angolo *cae*, ciascun de' quali vien costituito da due lati opposti dell' angolo solido in  $\alpha$ : che perciò sarebbero uguali i due angoli solidi in  $A$ , ed  $\alpha$ , ciascuno compreso da quattro angoli piani uguali, e similmente posti, se mai gli angoli  $BAD$ , *bad* fossero uguali, nel quale caso lo dovrebbero esser pure gli angoli  $CAE$ , *cae*; o al contrario. Vale a dire che saranno uguali gli angoli solidi di cui si parla, se essi dividonsi in due altri angoli solidi, ciascuno compreso da tre angoli piani uguali, e similmente disposti: ed in generale sarebbe facile il dimostrare, che sono uguali due angoli solidi, ciascuno compreso dallo stesso numero di angoli piani quanti si vogliano, se mai essi si dividono in angoli solidi contenuti da tre angoli piani similmente posti, ed uguali rispettivamente. Ha avuto dunque torto il Clavio di soggiugnere dopo la definizione dell' ang-

lo solido . *Ex his vero perspicuum cuivis erit , illos angulos solidos inter se esse aequales , qui continentur angulis planis et multitudine , et magnitudine aequalibus . Nam huiusmodi anguli sibi mutuo congruent , si se se penetrare intelligantur .*

ALLA PROP. XXXI. DEL LIB. XI.

Nel Testo Greco questa Prop. ha due casi ; il primo in cui supponesi , che i lati dei parallelepipedi , che insistono alle basi sieno a queste perpendicolari , e l' altro , ch'essi v'insistano obbliquamente . Noi intanto avendo dimostrato nel Cor. della Prop. prcc. , che ogni parallelepipedo a lati insistenti obbliquamente alla base , può rappresentarsi con un altro a lati insistenti perpendicolarmente alla base stessa , abbiamo perciò ridotta la presente dimostrazione al solo primo caso . Di più il Simson vorrebbe , che il primo di questi casi si distinguesse in due parti , in una delle quali si supponessero le basi equiangole , e nell' altro no ; ed egli si duole , che ciò non si trovi praticato nel Testo Greco , e crede che qualche editore antico abbia intessuta la dimostrazione della prima di queste parti a quella della seconda . Or siccome una tal seconda parte è la più generale , ch' essa comprende la prima , e che volendo adattare a due parallelepipedi , che hanno le condizioni della prima parte l' apparecchio della seconda , si vede chiaramente , che il parallelepipedo ICVN risultante dalla costruzione deve confondersi coll' altro CDFN , ch' è un de' proposti , sicchè la dimostrazione ne resta da se modificata :

fig. 30.

perciò noi non abbiamo creduto di dover rapportare , che la sola seconda parte del caso primo .

ALLA PROP. XXXII. DEL LIB. XI.

L' editore del Testo Greco nell' apparecchio di questa dimostrazione omise di dire , che il parallelogrammo FH si debba applicare alla retta FG nell'angolo FGH uguale all'angolo LCG ; il che è necessario : che perciò molto a proposito vi hanno supplito Clavio , e Simson . fig. 31.

Inoltre ricercandosi in tale apparecchio , che sulla base FH si costituisca un parallelepipedo della stess' altezza , che l' altro CD , ed avente con questo di comune il lato FD insistente al piano delle basi ; l' editore Greco aveva erroneamente tralasciata quest' ultima circostanza , ch' è stata dal Simson , e da noi supplita . E la stessa correzione deve praticarsi nella Prop. 33.

ALLA PROP. C DEL LIB. XI.

È da credere , ch' Euclide avesse posta ne' suoi Elementi una tal proposizione , ch' è simile a quella , che aveva già data de' parallelogrammi equiangoli nella 23. del Lib. 6.

ALLA PROP. XXXV. DEL LIB. XI.

In questa Prop. si vuol dimostrare , che » *Se vi sieno due angoli piani uguali , e ne' loro vertici si adattino due linee rette sublimi , le quali contengano angoli uguali co' lati degli angoli proposti ,*

ciascuno a ciascuno ; che poi in queste linee rette sublimi si prendano due punti , e da essi si abbassino le perpendicolari ai piani ne' quali sono i primi angoli , e dai punti dove queste perpendicolari incontrano tali piani si tirino le rette ai vertici di essi : queste congiungenti comprenderanno angoli uguali colle rette sublimi . Da una tal dimostrazione poi se ne deduce per Corollario : che se mai le linee rette sublimi erano uguali ; le perpendicolari dovevano essere anche uguali .

Or chi mai potrà sostenere , che tutto questo artificio sia di Euclide ; e che questo Geometra , che altronde riconosciamo dotato di una grandissima sagacia , e penetrazione geometrica , si fosse così ingannato in questo luogo ? Imperocchè o egli suppose , che gli angoli solidi contenuti da tre angoli piani uguali , e similmente posti sono uguali , o non lo suppose . Se lo suppose ; perchè poi usar tanto artificio per dimostrare una verità , che ne risultava intuitivamente ? Ed ecco in qual modo .

fig. 26. Sieno BAC , bac gli angoli proposti , ed AD , ad le linee rette sublimi , che formano l' angolo BAD uguale all' angolo bad , e l' angolo DAC uguale all' angolo dac : dovranno essere uguali gli

\* A. XI. angoli solidi in A, a \* ; e perciò posti l' uno nell' altro dovrà l' angolo BAC combaciare coll' altro bac , e la AD adattarsi sulla ad . Adunque si prendano nelle AD , ad i punti D , d , e da essi si abbassino su i piani BAC , bac le perpendicolari DE , de : è chiaro , che queste , quando gli angoli solidi si suppongono coincidere , sono parallele , ed esistono colle AE , ae in un medesimo piano ; che

perciò le comuni sezioni di questi piani cogli altri di  $BAC$ , *bac* dovranno coincidere; e quindi essere uguali gli angoli  $DAE$ , *dae*.

Che se poi Euclide non volle assumere; ma dimostrare, che gli angoli solidi contenuti da tre angoli piani uguali, ciascuno a ciascuno, e similmente posti, sieno uguali, dovè certamente farlo prima della 25: ed in un tal caso la dimostrazione della presente Proposizione avrebbe potuto anche congegnarsi nel modo poc' anzi detto. Adunque nell'uno, e nell' altro caso la dimostrazione della 35. del Libro 11. non è corrispondente all' oggetto che vuol dimostrarsi: che perciò è da credere, ch' essa sia stata ordita da Euclide per dimostrare precisamente l'uguaglianza di due angoli solidi, i quali avessero le condizioni poc' anzi dette; e che quelli editori antichi, che credettero di poter assumere senza dimostrazione questa verità, si sieno di un tal ragionamento avvaluti per dimostrare la 35. Che anzi per convincersi, che questa Proposizione 35. non sia di Euclide, oltre a ciò che si è detto, basta riflettere, che la verità che in essa vuol dimostrarsi non è di nessun uso negli Elementi; e che al contrario vi bisogna per la dimostrazione della Proposizione 40. il Corollario, che se ne deduce. Perchè dunque Euclide avrebbe usata in questo luogo una bizzarria geometrica, della quale non ve n'ha altro esempio negli Elementi, e che non è certamente senza taccia? E poi un tal Corollario si poteva anche dimostrare indipendentemente dalla Prop. da cui si fa dipendere, come può vedersi presso del Simson: che perciò non



sappiamo persuaderci, perchè mai questo Geometra abbia ritenuta nel suo Euclide la Prop. 35., che poteva comodamente supprimere, come noi abbiamo fatto; deducendo quel Cor. dalla sua Prop. B, ove aveva dimostrato, che due angoli solidi contenuti da tre angoli piani rispettivamente uguali, e similmente posti possousi far coincidere; del qual principio egli in effetto si serve per dimostrare un tal Corollario indipendentemente dalla 35.

#### ALLA PROP. XXXVI. DEL LIB. XI.

Questa proposizione conferma ciò, che abbiamo detto nella nota precedente: imperocchè si vede chiaro, ch' essa può dimostrarsi senza aver bisogno di quella; e così ha fatto il Tacquet, supponendo che gli angoli solidi contenuti da tre angoli piani rispettivamente uguali fossero uguali; la qual cosa nel Libro 11. già altre volte si era assunta. Ciascun vede però, che tal dimostrazione del Tacquet, sia, per ciò che più volte si è detto, erronea; giacchè questa proprietà degli angoli solidi doveva dimostrarsi, e non assumersi. Inoltre in una tal dimostrazione il Tacquet suppone, che i solidi sieno già fatti, e non dimostra in qual modo si debbano costruire, come si trovava eseguito nel Testo Greco. Il Simson poi avendo dimostrato il Corollario della Prop. 35. indipendentemente da una tal Prop., come si è detto nella nota precedente, ha perciò dimostrata la 36, senza aver bisogno della 35.

## ALLA PROP. XXXVII. DEL LIB. XI.

In questa Proposizione si trova assunto, che le ragioni triplicate di due ragioni uguali sieno pure tra loro uguali. Ma se Euclide non volle assumere nella Prop. 22. del Lib. 6., che le ragioni duplicate di ragioni uguali sono uguali; il che per altro si può dedurre facilmente dalla Prop. 22. del Lib. 5.; come mai poté poi suppor ciò vero senza dimostrazione per le triplicate? È per questa ragione, che noi, seguendo Clavio, e Simson, abbiamo dimostrata la presente proposizione in una maniera diversa dal Testo Greco, ed analoga all'altra, che Euclide tenne per la Prop. 26. del Lib. 6.

## ALLA PROP. XXXVIII. DEL LIB. XI.

Questa Prop., sebbene non abbia alcun uso negli Elementi; pure trovandosi adoperata, da Apollonio, e da altri Geometri, l'abbiamo ritenuta; nè pensiamo come il Simson ch'essa sia affatto inutile.

## ALLA PROP. XXXIX. DEL LIB. XI.

Questa Prop. par che sia stata stabilita da Euclide negli Elementi come Lemma alla Prop. 17. del Lib. 13. mentre di essa non se ne trova giammai fatto alcun uso. Or noi non avendone bisogno per un tal Libro, abbiamo perciò creduto conveniente di tralasciarla.

## LIBRO XII.

## AL LEMMA I. DEL LIB. XII.

Questa verità di cui si ha bisogno nella dimostrazione della Prop. 5. del presente Libro, è la Prop. 1. del Lib. 10. di Euclide.

## AL LEMMA II. DEL LIB. XII.

Euclide aveva preposto il Problema di cui si tratta in questo Lemma alla Propos. 17. del presente Libro, nella quale ne aveva bisogno. E questa 17, e la 16<sup>a</sup> di cui si parla dovevano poi formare gl'incidenti per la dimostrazione della Propos. 18, nella quale egli per dimostrare, che *le sfere sono in triplicata ragione de' loro diametri*, si serve di un elegante, e comodo ripiego geometrico. Or avendo noi in questi Elementi adottata una tal maniera di dimostrare in diverse Proposizioni, tra le quali la seconda del Lib. XII., abbiamo dovuto trasportare la 16. nel principio di un tal Libro. Abbiamo poi aggiunto a questo Lemma un Corollario, del quale avevamo bisogno nelle Propp. 27, e 28 de' Teoremi di Archimede.

## ALLA PROP. II. DEL LIB. XII.

Gli antichi Geometri tutte le volte, che vollero paragonare le figure curvilinee tra di loro, le considerarono come il limite di figure rettili-

nee; e dal rapporto di queste vennero in cognizione del rapporto di quelle. Euclide, per esempio, avendo dimostrato indipendentemente dal numero dei lati, che due poligoni simili iscritti in due cerchi erano tra loro in duplicata ragione de' diametri, si spinse a dimostrar lo stesso per gli cerchi, che considerò come i limiti de' poligoni in essi continuamente iscritti: ma l'idea di considerare il cerchio come un poligono d'infiniti lati era poco geometrica, perchè ripugnante alla definizione di una tal curva; e perciò egli, dopo essersene servito per la scoperta di tal verità, si ricusò giustamente di adottarla per la dimostrazione di essa. Archimede pervenne nel modo stesso a determinare le superficie del cilindro, del cono, e della sfera, ed i rapporti delle loro solidità, la quadratura della parabola, e le proprietà delle spirali; nè poi volle adottar l'idea di limiti in dimostrare queste sue importanti scoperte. Ed ecco un altro fortissimo argomento, col quale resta convalidata la necessità delle dimostrazioni indirette. I Geometri antichi, che amavano certamente assai più che noi la purità, ed il rigor geometrico, vi sono spesse volte ricorsi, quando hanno dovuto nascondere le nozioni dell'infinito, per mezzo delle quali erano pervenuti alla scoperta di qualche verità. E chi ardirà mai sostenere, che sia forse meglio il fondar la conoscenza di una verità importante su di una teoria metafisica, e paradossa, piuttosto che ricorrere ad un ragionamento indiretto convincentissimo? È vero, che l'uso de' metodi moderni ci ha resi più arditi a maneggiar le teorie dell'infinito; ma non

bisogna però negare gli sforzi, che i più sommi analisti hanno fatti per evitarle, ben persuasi della loro durezza. Qual necessità vi sarà dunque d'introdurre queste nozioni negli Elementi di Geometria, quando si può fare altrimenti, e bene?

Intanto faremo qui avvertire, che questa Proposizione 2. del Lib. 12. si trova da noi dimostrata in una maniera indiretta diversa dall'Euclidea, e con un ripiego, del quale questo stesso Geometra si avvale nella dimostrazione della Prop. 18. di un tal Libro; sicchè i troppo Euclidei nè pure avranno che ridirci. E con questo stesso ripiego semplicissimo si troveranno da noi anche dimostrate le Propp. 11, 12, 13 del Lib. 12; e le Propp. 3, 9, 11, 14, 24, 25, 27, 28 del nostro Libro sulla sfera, e sul cilindro; il che ha data a queste dimostrazioni tale uniformità, che il giovine, avendone imparata una, è nel caso di conoscerle tutte, senza stento alcuno: e di più per gli Teoremi di Archimedè ci ha risparmiati molti lemmi, che il Geometra Siracusano vi premette, per dimostrarli alla sua maniera; ed ha presentate ai giovani delle dimostrazioni assai più brevi, e meno complicate, che le Archimedee.

#### ALLE PROPP. III., E IV., DEL LIB. XII.

fig. 43. Nella Prop. 3. Dopo di essersi dimostrato il triangolo  $EHG$  uguale, e simile al triangolo  $KDL$ , si soggiunge: *Eodem ratione et  $EAG$  triangulum est aequale et simile triangulo  $HKL$* ; mentre si poteva conchiudere, che questi due triangoli sieno uguali e simili per l'8. del Lib. 1. Di più

una volta , che si è conchiuso , che il triangolo EAG sia uguale e simile all' altro KHL , è assolutamente superfluo il dimostrare , che l' angolo BAC pareggi l' angolo KHL ; il che trovasi eseguito nel Testo Greco , quando si vuol provare , che i triangoli BAC , KHL sono simili . Nella Prop. 4. si è poi reso qualche passaggio più esplicitamente , che nel Testo di Euclide .

ALLA PROP. VI. DEL LIB. XII.

Il modo , come da noi si è dimostrata questa Proposizione , ch' è analogo a quello del Simson , ha resa una tal dimostrazione un poço più breve dell' Euclidea .

AL COR. DELLA PROP. VIII. DEL LIB. XII.

A questa Prop. vi si trova nel Testo aggiunto un Corollario , la cui dimostrazione era imperfetta ; poichè si tralasciava di dimostrare ; che le piramidi triangolari in cui si dividono due piramidi poligone simili , sieno anche simili ; il che necessariamente doveva dimostrarsi : e lo stesso Euclide così ha praticato in un caso simile nella 12 del presente Libro . Noi abbiamo perciò supplita una tal mancanza , e per non presentare in questi Elementi un Corollario corredato di una dimostrazione alquanto lunga , abbiamo esibita la stessa verità come Scolio .

ALLA PROP. XIII. DEL LIB. XII.

In questa Prop. si trovava assunto, e non già dimostrato, che la comune sezione di un cilindro con un piano parallelo alle sue basi, sia un cerchio; e noi abbiamo ciò supplito.

ALLA PROP. XV. DEL LIB. XII.

Il primo caso della seconda parte di questa dimostrazione non si trova nel Testo Greco, ed inoltre vi sono alcune cose mancanti anche nel secondo caso di una tal parte. E sì a quello, che a questo ci si è supplito in questi nostri Elementi.

ALLA PROP. XVII. DEL LIB. XII.

In questa Prop. si tratta di *descrivere nell'esteriore di due sfere concentriche un solido poliedro, il qual non tocchi la sfera interiore*; e nella dimostrazione di essa vi erano, nel Testo di Euclide, molte cose depravate, e mutilate, che il Simson ha corrette. Or poichè una tal Proposizione non è che un lemma della 18., noi abbiamo trovato opportuno di sostituirvi l'altra, che trovasi ne' nostri Elementi; e ciò per due motivi: il primo, per evitare una lunga, e complicata soluzione, e dimostrazione, qual'è quella che dà Euclide di un tal Problema; e l'altro, perchè il Lemma da noi stabilito espone a dirittura il rapporto di due solidi iscritti in due sfere, e generati in quel modo, che da noi si è  
 \* 17.XI. supposto \*; mentre che un tal rapporto, sul quale

è fondata la dimostrazione della Prop. 18. , non forma presso di Euclide, che un Cor. della sua 17<sup>a</sup> .

## A V V E R T I M E N T O .

L'esserci in questi Libri XI., e XII. molto allontanati da una semplice versione, ci ha impedito di far notare minutamente i guasti prodotti nel Testo Greco dagli antichi espositori, de' quali si potrà esserne pienamente informato dalle Note del Simson . Noi intanto conchiuderemo queste nostre Note a' primi sei Libri, ed all' XI<sup>o</sup> e XII<sup>o</sup> di Euclide, dicendo col Simpson, che dalle cose fin qui esposte apparisce abbastanza quanto sieno stati corrotti, e mutilati dagl' ignoranti editori gl' Elementi dell' accuratissimo Geometra Euclide; e quindi, che l' opinione ch' ebbero molti sommi uomini dell' edizione Greca, che ora abbiamo, cioè ch' essa poco, o niente si differisca dalla vera opera di Euclide, gl' ingannò senza dubbio, e gli rese perciò meno accurati in esaminare una tale edizione; donde è avvenuto, che da' tempi di Tcone fin ora, non abbiano avvertiti in essa alcuni errori di non poco momento . Che perciò ci giova sperare, che l' impegno, che ci abbiamo preso in restituire, e librerare da nei questi Libri, non debba dispiacere ai giusti estimatori delle cose, i quali sapranno ben discernere le legittime definizioni, e dimostrazioni da quelle, che non lo sono . E coloro i quali hanno tentato di mutare l' ordine, ed il metodo Euclideo potranno anche convincersi, che sia tale il merito degli Elementi di Geometria composti da questo Geometra, che quantunque si oltremo-



ilo con tutto ciò hanno formata l'ammirazione di tutti i Geometri sommi d' ogni tempo ; e per la loro eccellenza sono stati insegnati in tutte le Scuole , tradotti , e comentati in tutte le lingue . E quindi si vede , che con molta ragione a' facitori delle ordinarie Istituzioni Geometriche , che non cessano a folla di comparire a di nostri , per aver poi un' efimera durata , si può rinfacciare ciò che dice il celebre Giuseppe Torelli nella Prefazione al suo Archimede : *Nqn sum nescius , quæ antiqui pertractarunt , eadem a recentioribus pertractata esse , et quotidie pertractari ; sed , absit dicto invidia , labore prorsus irritò . Si enim Euclides , ut de hoc uno loquer , aliqua in parte peccat , cur non redarguis ? Sin autem in omnibus sibi constat , cur eadem mihi aliis verbis proponis ? At quædam scilicet recentiores detorquent , invertunt , immutant . Ita quidem existimo : sed tamen dum hoc faciunt , quid , quæso , aliud agunt , quam ut sarcinatores initentur , qui foeminarum vestes quovannis refingunt , ut eas ad sæculi mores accommodent ? De brevitate autem , quam tantopere jactant , quod dicunt , id nihil est ; cum breve nihil dici valeat , quod sine explicatione aliqua intelligi nequit , et minus perspicue traditur . Quæ cum ita sint , optime illi mihi de Geometria meriti esse videntur , qui in antiquis auctoribus emendandis illustrandisque operam posuerunt .*

## N. O T E

## AL LIBRO SULLA SFERA, E SUL CILINDRO

## ALLE DEFF.

Archimede non aveva definito il segmento sferico, nè tampoco aveva ciò fatto Euclide; e noi abbiamo supplita una tal definizione. E poi si questa che le altre del settore, e del rombo conico le abbiamo fatte per gensi, a fin di mettere una certa uniformità tra esse, e quelle del cono del cilindro, e della sfera, date da Euclide nel Libro XI.; ed anche perchè così facendo ci si è facilitata la loro applicazione a quelle proposizioni in cui se ne fa uso. Intanto si alla definizione del settore, che a quella del rombo conico vi abbiamo aggiunta una seconda parte, che contiene la definizione di Archimede.

## AI PRINCIPI.

Archimede ha stabilite nel principio di questo suo Libro alcune Proposizioni, che la maggior parte degli espositori ha prese per assiomi; ma che a rigor geometrico non sono tutte tali: noi ritenendole con qualche modificazione, per renderle più chiare, e di una più facile applicazione, le abbiamo dato il nome, che loro era conveniente, di *Principj*.

## ALLA PROP. III.

Questa Prop. 3. non si appartiene, presso Archimede, al Libro presente; ma all' altro della *Misura del cerchio*. Essa però era necessaria in questo luogo, per la nostra maniera di esporre le verità, che in un tal Lib. si contengono: e nello Scol. vi abbiamo recato il rapporto delle circonferenze di due cerchi, che conveniva esporre esplicitamente negli Elementi di Geometria.

## ALLA PROP. V.

fig. 6o. In questa Prop. Archimede divide l' arco ABC per metà in B, ed unite le corde AB, BC, DB, dice che i due triangoli ABD, BCD sieno maggiori del triangolo ADC: e ad un uomo che inventava, ciò poteva permettersi. Eutocio nel suo dotto Comentario ai Libri sulla sfera, e sul cilindro volle dimostrar questo passaggio; e della sua dimostrazione tutti i Geometri ne sono restati paghi, eccettò il celebre Giuseppe Torelli, il quale nel suo bellissimo Archimede, a piede di pagina dice: *hæc demonstratio Eutocii non valet*. Ed in effetto essa non è sufficiente a provare l' assunto, che nel solo caso, che formandosi al punto D della AD, e nel piano dell'angolo ADC, un altro angolo uguale ad ADB, o a BDC, e preso nell' altro lato di quest' angolo una parte uguale alla AD, l' estremo di un tal lato cada al di sotto della AC: poichè se ciò non avviene, e che questo estremo cada al contrario al di sopra del-

la  $AC$ , come si verifica sempre che l'angolo  $ADB$  è maggiore di  $ADC$ ; la dimostrazione di Eutocio non è soddisfacente. ( *Si riscontri una tal dimostrazione ne' Comentarj ad Archimede* ). Noi abbiamo perciò supplita diversamente questa dimostrazione, come potrà vedersi nella Nota, che trovasi inserita nella Prop. 5.

## ALLA PROP. XIV.

Archimede riduce tutte le superficie curve de' solidi, che considera in questo suo Libro I., al cerchio; e tutte le loro solidità al cono. Or avendo egli in seguito dimostrato a qual triangolo sia uguale un cerchio ( *Circuli Dimensio* Prop. 1. ), ha in tal modo ridotte tutte quelle esibizioni di superficie curve ad una figura rettilinea; il che era importante, non solo per la pratica, in cui spesso si ha bisogno di valutarle; ma anche in molte ricerche geometriche. Era dunque necessario, che egli stabilisse anche un rapporto tra un cono, ed una piramide, affinchè que' solidi da lui ridotti al cono, potessero similmente esser valutati in pratica. La qual cosa non trovandosi da questo sommo Geometra antico eseguita, nè altri avendola ancora esposta con quel rigore, che convenivasi; noi abbiamo creduto opportuno di occuparcene in questa Propos. 14., che abbiamo dimostrata per mezzo di quello stesso principio ricavato dall'ultima Propos. del Lib. XII. di Euclide.

## ALLE PROPP. XV., XVI., XVII., E XVIII.

Le dimostrazioni di queste Propp sono identiche a quelle di Archimede. Noi abbiamo però aggiunto alla 16., ed alla 17. un Corollario, del quale avevamo bisogno in alcune dimostrazioni seguenti.

## ALLE PROPP. XX., XXI., XXII., E XXIII.

Queste Proposizioni sono tanti lemmi per l'esibizione della superficie della sfera, e di quella del segmento sferico.

## ALLA PROP. XXIX.

L'esibizione di un segmento sferico viene da Archimede recata nel Libro secondo della sfera, e del cilindro, insieme ad alcune altre ricerche, come quella di: 1. *Rinvenire una sfera uguale ad un cono, o ad un cilindro dato*: 2. *Dividere una sfera con un piano in modo, che le due parti della sua superficie sieno in data ragione*: 3. *O pur sieno in data ragione i due segmenti sferici ne' quali un piano divide la sfera*. 4. *Costituire una porzione sferica simile ad una porzione sferica data, ed uguale ad un'altra data*: 5. *Date due porzioni sferiche, che sieno di una stessa sfera, o pur di sfere diverse; costituirne una terza simile ad una, e che abbia la sua superficie uguale all'altra*: 6. *Troncare da una sfera una porzione sferica, che serbi ragione data al cono, che ha la stessa base, e la stessa altezza della porzione*. Egli poi vi dimostra che: 7. *Se una sfera si seghi con un piano,*

che non passa per lo centro ; la porzione maggiore serba alla minore , minor ragione della duplicata della superficie di quella alla superficie di questa :  
8. Che la mezza sfera è la massima di tutte le porzioni sferiche contenute da superficie uguali .

Or siccome niuna di queste verità era necessaria a recarsi negli Elementi , per cui un tal Libro destinato ad *abbundantiorē scientiam* poteva benissimo tralasciarsi ; e perciò che noi abbiamo trasportata l'esibizione del segmento sferico a far parte del 1. Libro .

#### AL LIBRO DELLA MISURA DEL CERCHIO.

I principj su i quali abbiamo fondata la presente ricerca sono presi da Giacomo Gregory ; ma non perciò gli si deve attribuire la maniera come noi gli abbiamo applicati a dimostrare le diverse verità comprese nel Libro *de Dimensione Circuli* di Archimede : che anzi la stessa esposizione di tali principj ne' due Lemmi , è molto più semplice di quella datane dal loro inventore . Intanto siccome a ridurre in pratica le verità in questo libro comprese è necessario esibire aritmeticamente un quadrato ; e che per gli usi pratici ai quali frequentemente servono i Teoremi della sfera , e del cilindro , spesso occorre di valutare la superficie , e la solidità di que' corpi ; non sarà perciò fuor di proposito , che io qui rechi in due Teoremi la maniera di valutare uno spazio rettangolare , e la solidità di un parallelepipedo rettangolo , alle quali due figure , le altre tutte , come si sa dagli Elementi , facilmente si riducono .

## P R O P O S I Z I O N E I.

## T E O R E M A.

*Se i due lati che contengono un rettangolo , sieno espressi con qualsivogliano numeri rapportati ad una stessa unità ; il prodotto di questi dovrà dinotare in quadrati dell' unità stessa il rettangolo proposto .*

Sieno A , B i lati di un rettangolo espressi in numeri , come si è detto : sarà un tal rettangolo a quello di B nell'unità comune ad A , e B , come  
 \* 1. VI. A ad 1 \* ; e perciò quel rettangolo conterrà que-  
 c. 15. V. sto tante volte , quante volte A contiene 1 \* , cioè  
 quel numero di volte , ch'è dinotato da A . Similmente il rettangolo di B nell' unità sta al quadrato di questa , come B ad 1 ; e perciò quel rettangolo conterrà questo quadrato il numero di volte , ch'è rappresentato da B . Laonde il rettangolo di A in B dovrà contenere il quadrato dell' unità tante volte , quante n' esprime il prodotto delle unità di A per quelle di B .

## S C O L I O .

Perchè tutte le figure rettilinee possonsi ridurre a rettangoli ; dalla misura di questo , se ne potranno facilmente rilevare le regole per la misura di quelle . Il che sarebbe superfluo di qui esporre a disteso .

## P R O P O S I Z I O N E II.

## T E O R E M A.

*Se i tre lati intorno ad un angolo di un parallelepipedo rettangolo sieno espressi in numeri rapportati ad una stessa unità; il prodotto di questi dinoterà il numero de' cubi di quell' unità, che si contengono in un tal parallelepipedo.*


Sieno A, B, C i tre lati di un parallelepipedo rettangolo espressi in numeri, come si è detto. Ed essendosi dimostrato \*, che il prodotto de' due \*p.prec. numeri, che rappresentano A, e B esprima in quadrati dell' unità assunta quel rettangolo terminatore del parallelepipedo, il quale è contenuto da A, e B: è chiaro, che se un tal piano si prenda per base del parallelepipedo, e che perciò sia C l' altezza di questo solido; dovrà esso stare a quell' altro parallelepipedo della base stessa, e che ha per altezza l' unità, come C ad 1 \*; \* 32.XI. cioè quel parallelepipedo conterrà questo il numero di volte espresso da C. Similmente si dimostra che questo parallelepipedo contiene il cubo dell' unità tante volte, quante volte il rettangolo di A in B contiene il quadrato dell' unità, cioè quel numero di volte, che viene espresso dal prodotto de' numeri, che rappresentano A, e B \*. \*p.prec. Adunque il parallelepipedo proposto dovrà contenere il cubo dell' unità quel numero di volte, che si otterrà prendendo il prodotto di A, per B, e per C. C. B. D.



## S C O L I O .

Potendosi tutte le figure solide considerate negli Elementi ridurre al parallelepipedo ; si potrà per mezzo del precedente Teorema valutare ciascuna di quelle figure solide : che perciò noi abbiamo creduto inutile d'intrattenerci su questo assunto ;

606936




10

11

12

13



57

58

59

60

